

Sugeruje się przerwanie leczenia produktem leczniczym Anapran EC na 48 godzin przed badaniem czynności nadnerczy, gdyż może ono zaburzać oznaczanie 17-ketosteroidów. Naproksen może także utrudniać oznaczanie kwasu 5-hydroksyindoliloctowego w moczu.

#### **4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację**

##### Ciąża

Odnotowano wrodzone nieprawidłowości w związku z podawaniem leków z grupy NLPZ u ludzi; jednak ich częstość jest niska i nie wydają się one występować według żadnego wyraźnego schematu.

Od 20. tygodnia ciąży stosowanie naproksenu może powodować małowodzie spowodowane zaburzeniami czynności nerek płodu. Może ono wystąpić krótko po rozpoczęciu leczenia i zwykle ustępuje po jego przerwaniu. Ponadto zgłaszano przypadki zwężenia przewodu tętniczego podczas leczenia w drugim trymestrze ciąży, które w większości przypadków ustąpiły po jego zaprzestaniu. Dlatego w pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy podawać naproksenu, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli naproksen stosuje kobieta starającą się zajść w ciążę lub podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, należy zastosować dawkę jak najmniejszą, a czas trwania leczenia jak najkrótszy. Kilka dni po 20. tygodniu ciąży należy rozważyć przedporodową obserwację w celu wykrycia małowodzia i zwężenia przewodu tętniczego po narażeniu na naproksen. W razie stwierdzenia małowodzia lub zwężenia przewodu tętniczego należy zaprzestać stosowania naproksenu.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą działać na płód w następujący sposób:

- toksyczne działanie dotyczące płuc i serca (przedwczesne zwężenie/zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne);
- zaburzenia czynności nerek (patrz powyżej).

U matki i noworodka pod koniec ciąży może dojść do:

- wydłużenia czasu krwawienia w wyniku działania antyagregacyjnego, które może wystąpić nawet po zastosowaniu bardzo małych dawek;
- hamowania czynności skurczowej macicy powodującego opóźnienie lub przedłużanie się porodu.

W związku z tym naproksen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 5.3).

##### Poród

Produkty lecznicze zawierające naproksen nie są zalecane w okresie porodu, ponieważ z uwagi na swoje właściwości hamowania syntezy prostaglandyn, naproksen może wywierać negatywny wpływ na układ krążenia płodu, zmniejszać czynność skurczową macicy oraz zwiększać skłonność do wystąpienia krwawienia u matki i dziecka.

##### Karmienie piersią

Stwierdzono obecność naproksenu w mleku kobiet karmiących piersią, z tego względu nie należy stosować produktu leczniczego Anapran EC u kobiet karmiących piersią.

##### Płodność

Stosowanie naproksenu, podobnie jak innych leków, o których wiadomo, że hamują syntezę cyklooksygenazy/prostaglandyn, może upośledzać płodność i nie jest zalecane u kobiet, które planują zajście w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć odstawienie naproksenu.

#### **4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn**

U niektórych pacjentów po zastosowaniu produktu leczniczego Anapran EC mogą występować: senność, zawroty głowy, bezsenność, zmęczenie, zaburzenia widzenia lub depresja. Jeśli pacjent stwierdzi wystąpienie tych lub podobnych objawów, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

#### 4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono w kolejności zgodnej z MedRA System Organ Class i uszeregowano wg częstości ich występowania: bardzo często ( $\geq 1/10$ ), często ( $\geq 1/100$  do  $< 1/10$ ), niezbyt często ( $\geq 1/1000$  do  $< 1/100$ ), rzadko ( $\geq 1/10\ 000$  do  $< 1/1000$ ), bardzo rzadko ( $< 1/10\ 000$ ), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

| MedDRA SOC                                        | Działania niepożądane                                                                                                                                 | Częstość występowania           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>Zaburzenia krwi i układu chłonnego</u></b>  | Neutropenia, małopłytkowość, granulocytopenia, w tym agranulocytoza, eozynofilia, leukopenia, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna | <b><u>Rzadko</u></b>            |
| <b><u>Zaburzenia układu immunologicznego</u></b>  | Reakcje nadwrażliwości, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy                                                                                | <b><u>Rzadko</u></b>            |
| <b><u>Zaburzenia metabolizmu i odżywiania</u></b> | Hiperkaliemia                                                                                                                                         | <b><u>Rzadko</u></b>            |
| <b><u>Zaburzenia psychiczne</u></b>               | Bezsennność                                                                                                                                           | <b><u>Niezbyt często</u></b>    |
|                                                   | Nietypowe sny, depresja, stan splątania, halucynacje, zaburzenia funkcji poznawczych                                                                  | <b><u>Rzadko</u></b>            |
| <b><u>Zaburzenia układu nerwowego</u></b>         | Zawroty głowy, ból głowy, oszołomienie, senność                                                                                                       | <b><u>Często</u></b>            |
|                                                   | Zaburzenia koncentracji i funkcji poznawczych, senność                                                                                                | <b><u>Niezbyt często</u></b>    |
|                                                   | Drgawki, parestezje, pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, aseptyczne zapalenie opon mózgowych                                                      | <b><u>Częstość nieznana</u></b> |
| <b><u>Zaburzenia oka</u></b>                      | Zaburzenia widzenia                                                                                                                                   | <b><u>Często</u></b>            |
|                                                   | Zmętnienia rogówki, zapalenie i obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego                | <b><u>Bardzo rzadko</u></b>     |
| <b><u>Zaburzenia ucha i błędnika</u></b>          | Szumy uszne                                                                                                                                           | <b><u>Często</u></b>            |
|                                                   | Utrata słuchu                                                                                                                                         | <b><u>Niezbyt często</u></b>    |
|                                                   | Zaburzenia słuchu, w tym niedosłuch, zawroty głowy                                                                                                    | <b><u>Bardzo rzadko</u></b>     |
| <b><u>Zaburzenia serca</u></b>                    | Kołatanie serca                                                                                                                                       | <b><u>Niezbyt często</u></b>    |
|                                                   | Niewydolność serca, zastoinowa niewydolność serca                                                                                                     | <b><u>Rzadko</u></b>            |
| <b><u>Zaburzenia naczyniowe</u></b>               | Nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń                                                                                                               | <b><u>Rzadko</u></b>            |
| <b><u>Zaburzenia układu oddechowego,</u></b>      | Duszność, astma oskrzelowa                                                                                                                            | <b><u>Niezbyt często</u></b>    |
|                                                   | Eozynofilowe zapalenie płuc, obrzęk płuc                                                                                                              | <b><u>Rzadko</u></b>            |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b><u>klatki piersiowej i śródpiersia</u></b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| <b><u>Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych</u></b>              | Żółtaczka, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby                                                                                                                                                                                         | <b><u>Rzadko</u></b>            |
| <b><u>Zaburzenia żołądka i jelit</u></b>                        | Zgaga, niestrawność, nudności, biegunka, zaparcia, dyskomfort w jamie brzusznej, zapalenie jamy ustnej                                                                                                                                                             | <b><u>Często</u></b>            |
|                                                                 | Krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody żołądka, dyskomfort w nadbrzuszu                                                                                                                                                       | <b><u>Niezbyt często</u></b>    |
|                                                                 | Zapalenie jelita grubego, perforacja, wymioty, zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, hematemeza, wzdęcia, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, niedrożność górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, smółka | <b><u>Rzadko</u></b>            |
| <b><u>Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej</u></b>              | Świąd, wybroczyny, plamica, wzmożona potliwość                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>Często</u></b>            |
|                                                                 | Pokrzywka, wysypka skórna, w tym utrwalona wysypka polekowa, nadwrażliwość na światło, w tym psuedoporfiria                                                                                                                                                        | <b><u>Niezbyt często</u></b>    |
|                                                                 | Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, rumień guzowaty, liszaj płaski, reakcje pęcherzowe, toczén rumieniowaty układowy, martwica naskórka, toksyczne martwice oddzielanie się naskórka, pęcherzowe oddzielenie się naskórka                            | <b><u>Bardzo rzadko</u></b>     |
|                                                                 | Reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS) (patrz punkt 4.4), utrwalona wysypka polekowa                                                                                                                                                    | <b><u>Częstość nieznana</u></b> |
| <b><u>Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej</u></b> | Bóle, osłabienie mięśni                                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>Bardzo rzadko</u></b>     |
| <b><u>Zaburzenia nerek i dróg moczowych</u></b>                 | Niewydolność nerek                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>Niezbyt często</u></b>    |
|                                                                 | Krwimocz                                                                                                                                                                                                                                                           | <b><u>Rzadko</u></b>            |
|                                                                 | Kłębuszkowe zapalenie nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy, martwica brodawek nerkowych                                                                                                              | <b><u>Bardzo rzadko</u></b>     |
| <b><u>Zaburzenia układu rozrodczego</u></b>                     | Zaburzenia płodności u kobiet                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>Częstość nieznana</u></b> |
| <b><u>Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania</u></b>       | Wzmożone pragnienie, gorączka, uczucie zmęczenia, złe samopoczucie                                                                                                                                                                                                 | <b><u>Bardzo rzadko</u></b>     |

#### Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:  
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>.  
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

## **4.9 Przedawkowanie**

### Objawy

Objawy obejmują: ból głowy, zgagę, nudności, wymioty, ból nadbrzuszy, krwawienie z przewodu pokarmowego, rzadko biegunka, dezorientacja, pobudzenie, senność, zawroty głowy, szum w uszach, omdlenia. W przypadku znacznego przedawkowania możliwe jest wystąpienie ostrej niewydolności nerek i uszkodzenia wątroby.

Objawy depresji oddechowej lub śpiączka mogą wystąpić po zażyciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ale są rzadkie.

W jednym przypadku przedawkowania naproksenu stwierdzono przemijające wydłużenie czasu protrombinowego z powodu hipoprotrombinemii wywołanej prawdopodobnie selektywnym hamowaniem syntezy zależnych od witaminy K czynników krzepnięcia.

W kilku przypadkach stwierdzono u pacjentów wystąpienie drgawek, nie potwierdzono jednak, czy było ono zależne od podania naproksenu. Nie ustalono zagrażającej życiu dawki naproksenu.

### Leczenie

Jeśli jest to konieczne pacjenci powinni być leczeni objawowo. W czasie jednej godziny po przyjęciu potencjalnie toksycznej ilości naproksenu należy rozważyć zastosowanie węgla aktywowanego. Alternatywnie, u pacjentów dorosłych należy rozważyć płukanie żołądka w czasie jednej godziny od potencjalnie zagrażającego życiu przedawkowania.

Należy zapewnić prawidłową ilość moczu wydalonego w jednostce czasu.

Należy ściśle monitorować czynność nerek i wątroby.

Należy monitorować pacjentów przez co najmniej cztery godziny po przyjęciu potencjalnie toksycznej ilości naproksenu.

Inne środki mogą być wskazane w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

Hemodializa nie zmniejsza stężenia naproksenu w osoczu ze względu na jego wysoki stopień wiązania z białkami osocza. Hemodializa może być jednak korzystna u pacjentów z niewydolnością nerek, którzy zażyli naproksen.

## **5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE**

### **5.1 Właściwości farmakodynamiczne**

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego. Kod ATC: M 01 AE 02

W klasycznym modelu badań na zwierzętach wykazano właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe naproksenu. Wykazuje on swoje działanie przeciwzapalne, nawet u zwierząt z chirurgicznie usuniętym nadnerczem, co wskazuje, że działanie naproksenu nie wynika z działania