

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Penicillinum Procainicum L TZF, 1 200 000 j.m., proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Penicillinum Procainicum L TZF, 2 400 000 j.m., proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Penicillinum Procainicum L TZF, 1 200 000 j.m.,
Jedna fiolka zawiera 1 200 000 j.m. benzylopenicyliny prokainowej lecytynowanej (*Benzylopenicillinum procainicum*)
Penicillinum Procainicum L TZF, 2 400 000 j.m.
Jedna fiolka zawiera 2 400 000 j.m. benzylopenicyliny prokainowej lecytynowanej (*Benzylopenicillinum procainicum*)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.
Krystaliczny proszek barwy białej lub prawie białej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Penicylina prokainowa jest wskazana w leczeniu zakażeń o umiarkowanie ciężkim przebiegu, wywołanych przez wrażliwe szczepy bakterii.

- Zakażenia wywołane przez paciorkowce grupy A, C, H, G, L i M, pneumokoki, przebiegające bez bakteriemii, np.:
 - zakażenia górnych dróg oddechowych;
 - zakażenia dolnych dróg oddechowych, np. zapalenie płuc (tylko wywołane przez szczepy *Streptococcus pneumoniae* wrażliwe i umiarkowanie wrażliwe na penicylinę);
 - zapalenie wsierdza (wywołane przez *Streptococcus* sp. grupy *viridans*);
 - zapalenie osierdza;
 - płonica;
 - paciorkowcowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej (róża).
- Kiła nabyta lub wrodzona (wywołana przez *Treponema pallidum*).
- Krętkowice endemiczne wywołane przez *Treponema pallidum endemicum* (kiła endemiczna, bejel), *Treponema pallidum pertenue* (malinica, frambezja), *Treponema pallidum carateum* (pinta).
- Rzeżączka przebiegająca bez bakteriemii (wywołana przez *Neisseria gonorrhoeae* - szczepy β -laktamazo-ujemne).
- Mieszane zakażenia gardła (angina Vincenta), dolnych dróg oddechowych, narządów płciowych, wywołane przez wrzecionowce i krętki (np. *Fusobacterium* spp., *Spirochetes* spp.).
- Różycy (wywołana przez *Erysipelothrix rhusiopathiae*).
- Zapobieganie błonicy (wywołanej przez *Corynebacterium diphtheriae*) w skojarzeniu z antytoksyną.