

3.9 Droga podania i dawkowanie

Podanie w wodzie do picia.

Bydło (cielęta z nierozwiniętą funkcją przedżołądków)

5 mg doksycykliny hyklanu/kg masy ciała, co odpowiada 10 mg produktu na kg masy ciała dwa razy dziennie przez 3-5 dni.

Na podstawie zalecanej dawki oraz masy ciała leczonych cieląt, należy obliczyć dokładne stężenie weterynaryjnego produktu leczniczego na dany dzień według poniższego wzoru:

$$\frac{10 \text{ mg weterynaryjnego produktu leczniczego/kg masy ciała} \times \text{Masa ciała (kg) leczonego cielęcia}}{\text{Średnie spożycie wody (l) przez cielę w godzinach rannych lub wieczornych}} = \dots \text{ mg weterynaryjnego produktu leczniczego na l wody do picia}$$

Świnie

10 mg doksycykliny hyklanu /kg masy ciała, co odpowiada 20 mg produktu na kg masy ciała dziennie przez 3-5 dni.

Na podstawie zalecanej dawki oraz liczby i masy świń, które mają być leczone, należy obliczyć dokładne stężenie weterynaryjnego produktu leczniczego na dany dzień według poniższego wzoru:

$$\frac{20 \text{ mg weterynaryjnego produktu leczniczego /kg masy ciała/dobę} \times \text{Średnia masa ciała (kg) leczonych świń}}{\text{Średnie dziennie spożycie wody (l) na świnię}} = \dots \text{ mg weterynaryjnego produktu leczniczego na l wody do picia}$$

Kury

25 mg doksycykliny hyklanu /kg masy ciała/dobę, co odpowiada 50 mg produktu na kg masy ciała przez 3-5 kolejnych dni.

Na podstawie zalecanej dawki oraz liczby i masy ptaków, które mają być leczone, należy obliczyć dokładne stężenie weterynaryjnego produktu leczniczego na dany dzień według poniższego wzoru:

$$\frac{50 \text{ mg weterynaryjnego produktu leczniczego /kg masy ciała/dobę} \times \text{Średnia masa ciała (kg) leczonych ptaków}}{\text{Średnie dziennie spożycie wody (l) na ptaka}} = \dots \text{ mg weterynaryjnego produktu leczniczego na l wody do picia}$$

Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie, należy jak najdokładniej ocenić masę ciała zwierzęcia.

Spożycie wody zawierającej produkt leczniczy zależy od stanu klinicznego zwierzęcia. Aby uzyskać właściwą dawkę, może istnieć potrzeba dostosowania stężenia produktu w wodzie do picia.

W przypadku użycia części zawartości opakowania należy korzystać z odpowiednio skalibrowanych przyrządów mierniczych.

U świń i kur, dawkę dobową należy dodać do wody do picia w taki sposób, aby cała ilość produktu została spożyta w ciągu 24 godzin. Wodę do picia zawierającą produkt leczniczy należy przygotować na świeżo co 24 godziny.

U cieląt, obliczoną dawkę produktu należy dodać do wody do picia w taki sposób, aby cała ilość produktu została spożyta od razu. Wodę do picia zawierającą produkt leczniczy należy przygotować na świeżo przed podaniem.