

El Niño 2026/2027

Jačina događaja, putanja do proljeća 2027, globalne posljedice i račun koji za njim ide

Predmet: razvoj i očekivani ishod El Niño događaja 2026/2027, sa težištem na mjerljivim veličinama i na posljedicama po hranu, ekonomiju i ekosisteme. Datum izrade: 20. avgust 2026. Stanje sistema opisano je zaključno sa dijagnostičkom raspravom NOAA CPC od 13. avgusta 2026. i pregledom IRI Columbia za avgust 2026. Uticaj na zimu nad Jadranom obrađen je u posebnom dokumentu o zimi 2026/2027. i ovdje se ne ponavlja. Prozor revizije: sredina novembra 2026, kada se očekuje vrhunac događaja.

Izvršni sažetak

El Niño 2026/2027. je na putu da bude najjači zabilježen. Julska anomalija u regionu Niño 3.4 iznosila je +1,4 °C, u regionu Niño 1+2 čak +2,9 °C, a podpovršinske anomalije dosežale su +10 °C. NOAA daje preko 90 % izgleda za vrlo jak događaj tokom jeseni i zime i 69 % izgleda da tromjesečje oktobar-decembar pređe +2,5 °C po relativnom indeksu, čime bi nadmašilo sve događaje od 1950. godine. Od 26 modela u pregledu IRI, njih 15 daje vrhunac na +3,0 °C ili više, izvan najviše definisane kategorije jačine.

Tri stvari slijede iz toga skoro sigurno. Prva: 2027. će biti toplija od 2026. i najvjerovatnije najtoplija godina u historiji mjerenja, jer globalna temperatura kasni za Pacifikom oko tri mjeseca. Druga: peto globalno izbjeljivanje koralnih grebena postaje vjerovatno, jer je svaki jak El Niño od 1998. bio praćen jednim. Treća: cijene hrane rastu sa zadržkom od dva do četiri tromjesečja, jer se gubitak prinosa u Australiji, Indoneziji i Indiji ne vidi odmah na berzama.

Ono što ne slijedi, a najčešće se tvrdi, jeste jednostavna posljedica po evropsko vrijeme. Veza tropskog Pacifika i Evrope je posredna, prolazi kroz stratosferu i mijenja se od decenije do decenije. Sve konkretno što se o tome može reći za naše krajeve stoji u odvojenom dokumentu o zimi 2026/2027.

Račun na kraju ne stiže onima koji su ga napravili. Zemlje sa najjačom vezom prema El Niñu su tropske zemlje niskog i srednjeg dohotka — Ekvador, Peru, Indonezija, Malezija — i njihov gubitak se mjeri u procentima domaćeg proizvoda, a ne u promilima.

Mehanizam i mjerne veličine

U normalnim godinama pasati guraju toplu površinsku vodu ka zapadnom Pacifiku, gdje se gomila u toplotni bazen, dok se uz obalu Južne Amerike diže hladna voda iz dubine. U El Niñu pasati slabe ili se u epizodama okreću, topla voda se u vidu Kelvinovog talasa vraća na istok, termoklina uz Južnu Ameriku tone i uzdizanje hladne vode prestaje. Kiša ide za toplom vodom, pa se tropski pojas oborina pomjera hiljadama kilometara na istok, a s njim i položaj mlaznih struja koje raspoređuju vrijeme na obje hemisfere.

Jačina se prati preko nekoliko veličina. ONI je tromjesečni prosek anomalije temperature mora u regionu Niño 3.4, sa referentnom osnovom koja se pomjera svakih pet godina. RONI je isti indeks umanjen za prosečno zagrijavanje cijelog tropskog pojasa i zato pošteno poredi događaje kroz decenije: u zagrijanom okeanu današnji ONI precjenjuje atmosferski odgovor, jer atmosfera reaguje na razliku u odnosu na okolinu, a ne na apsolutnu temperaturu. Uz njih se prate indeksi južne oscilacije, koji mjere razliku pritiska između Tahitija i Darvina, i toplotni sadržaj gornjih 300 m okeana, koji daje najranije upozorenje.

Stanje u avgustu 2026

Veličina	Vrijednost	Značenje
Niño 3.4, jul 2026	+1,4 °C	prag za jak događaj je +1,5 °C, prag za vrlo jak +2,0 °C
Niño 3, jul 2026	+1,7 °C	težište zagrijavanja u istočnom Pacifiku
Niño 1+2, jul 2026	+2,9 °C	uz obalu Perua i Ekvadora, tip događaja kao 1982. i 1997.
Podpovršinska anomalija	do +10 °C	rezervoar toplote koji tek izlazi na površinu
Indeksi južne oscilacije	oko –2 standardne devijacije	atmosfera je već u punom odgovoru
Sedmični Niño 3.4, sredina avgusta	+2,2 do +2,7 °C zavisno od proizvoda	događaj je već u kategoriji vrlo jakog
RONI, medijana okt-dec 2026	+2,66 °C	sredina raspodjele +2,37 do +2,95 °C
RONI, medijana dec-feb 2026/27	+2,23 °C	vrhunac u kasnu jesen, zatim polagano opadanje
Izgledi za rekordan događaj ($\geq +2,5$ °C, okt-dec)	69 %	jače od svega od 1950. godine
Modeli sa vrhuncem $\geq +3,0$ °C	15 od 26	izvan najviše definisane kategorije IRI
Vjerovatnoća trajanja kroz feb-apr 2027	100 %	raspad tek u proljeće 2027.
Indeks dipola Indijskog okeana, 9.8.2026	+0,41 °C	pozitivna faza pojačava tropsko forsiranje

Tabela 1. Stanje ENSO sistema i projekcija, prema dijagnostičkoj raspravi NOAA CPC od 13. avgusta 2026, pregledu IRI Columbia za avgust 2026. i biltenu australijskog biroa od 11. avgusta 2026. Sedmične vrijednosti indeksa razlikuju se između proizvoda zbog različite referentne osnove i različite obrade satelitskih podataka.

Uz El Niño se razvija i pozitivan dipol u Indijskom okeanu, sa indeksom koji je 9. avgusta treću sedmicu zaredom bio iznad praga. Kombinacija ta dva obrasca istorijski daje suvlje i toplije uslove nad Australijom i jugoistočnom Azijom nego bilo koji od njih zasebno, i pojačava odgovor cirkulacije ševerne hemisfere.

Koliko je jak u poređenju sa prethodnim događajima

Događaj	Vrhunac ONI	Zapamćeno po
1972/73	+2,1 °C	kolaps ribolova inćuna u Peruu
1982/83	+2,2 °C	poplave u Ekvadoru i Peruu, suša i požari u Australiji
1997/98	+2,4 °C	prvo globalno izbjeljivanje koralnih grebena, rekordno topla 1998.
2015/16	+2,6 °C	najjači u nizu od 1950; suša u Etiopiji, rekordno topla 2016.
2026/27	projekcija $\geq +2,5$ °C (RONI)	69 % izgleda da nadmaši sve prethodne

Tabela 2. Vrhunci indeksa ONI kod najjačih zabilježenih događaja, prema NOAA CPC. Podatak za 2026/27. je projekcija, a ne izmjerena vrijednost, i dat je preko relativnog indeksa RONI zato što se preko njega jedino i može porediti sa događajima iz prošlog vijeka.

Poređenje traži jedan oprez. Apsolutne temperature mora danas su više nego 1997. ili 2015. godine za oko pola stepena, zbog opšteg zagrijavanja okeana, pa svaki novi događaj lakše obori apsolutni rekord nego što obori rekord u atmosferskom odgovoru. Zato NOAA i naglašava relativni indeks. Ono što ostaje nesporno jeste da je toplotni sadržaj koji je u avgustu 2026. bio uskladišten ispod površine među najvećima ikad izmjerenim, i da taj rezervoar tek treba da se isprazni u atmosferu.

Putanja do proljeća 2027. i nesigurnost

Vrhunac se očekuje između novembra 2026. i januara 2027, što je tipično: El Niño se sinhronizuje sa godišnjim ciklusom i skoro uvijek kulminira oko zimskog solsticija sjeverne hemisfere. Raspad počinje u proljeće, a IRI daje 97 % vjerovatnoće za nastavak događaja u mart-maj 2027. i 78 % u april-jun 2027. Poslije jakog događaja često, ali ne uvijek, slijedi La Niña: tako je bilo 1983, 1998. i 2016. godine.

Glavna nesigurnost nije da li će događaj biti jak, nego koliko će atmosfera na njega odgovoriti i koliko će brzo popustiti. Modeli od maja do jula griješe najviše — prolječna prognostička barijera — ali avgustovske inicijalizacije su znatno pouzdanije, pa je današnja slika stabilnija od onoga što se moglo reći u maju. Druga nesigurnost je odnos sa dipolom Indijskog okeana, koji se obično raspada u decembru; ako se raspadne ranije, dio suvog signala nad Australijom slabi prije sezone požara.

Globalna temperatura 2026. i 2027.

Globalna temperatura kasni za Pacifikom oko tri mjeseca, pa se najveći dio ovog događaja neće vidjeti u 2026. nego u 2027. godini. Jul 2026. bio je zajedno drugi najtopliji jul u zapisu, sa 16,90 °C i 1,47 °C iznad predindustrijskog nivoa, a vanpolarni okean imao je najtopliji jul ikad, 20,96 °C. Carbon Brief daje za 2027. centralnu procjenu od oko 1,71 °C iznad predindustrijskog nivoa, sa 90-postotnim rasponom 1,49 do 1,93 °C, što bi bio ubjedljiv novi rekord. WMO u petogodišnjoj najavi za period 2026–2030. daje 91 % izgleda da bar jedna godina privremeno pređe 1,5 °C, 75 % da to učini i petogodišnji prosjek, i 86 % da bar jedna godina nadmaši rekordnu 2024.

Prekoračenje od jedne godine nije isto što i probijanje Pariskog cilja, koji se odnosi na dugoročni prosjek. Razlika je stvarna, ali se smanjuje: petogodišnji prosjek koji sa tri četvrtine vjerovatnoće prelazi 1,5 °C znači da se razgovor pomjera sa toga hoće li se granica preći na to koliko će je se preći.

Regionalne posljedice

Područje	Očekivano	Sektor pod udarom
Australija (istok i jug)	toplije i suvlje; prolječna temperatura oko 2 °C iznad osnove 1961–1990	pšenica, stočarstvo, sezona požara
Indonezija, Malezija, Filipini	toplije i suvlje, prazne akumulacije	pirinač, palmino ulje, kafa, hidroelektrane
Indija i Šri Lanka	slabiji monsun, deficit u centralnom i sjevernom dijelu	pirinač, šećer, cijene osnovnih namirnica
Južna Afrika i Sahel	suša u južnom dijelu kontinenta	kukuruz, stočarstvo, snabdijevanje vodom
Istočna Afrika	obilne padavine i poplave	raseljavanja, kolera, saobraćaj
Zapadna obala Južne Amerike	obilne padavine u Peru i Ekvadoru; kraj uzdizanja hladne vode	poplave, klizišta, ribolov inćuna
Amazonija	suša i požari; u 2015/16. i 2023/24. izgorjelo preko 2,3 miliona ha godišnje, četiri puta iznad prosjeka 2001–2025	šume, kvalitet vazduha, plovnost rijeka
Sjeverna Amerika	vlažniji jug SAD-a, blaži sjever	poplave u Kaliforniji, niža potrošnja za grijanje
Atlantik	pojačano smicanje vjetrova guši razvoj uragana; NOAA je 6. avgusta 2026. spustila prognozu na 7–13 imenovanih oluja i podigla izgleda za ispodprosječnu sezonu sa 55 na 75 %	osiguranje, obalna infrastruktura
Koralni grebeni	NOAA Coral Reef Watch 21. jula 2026. daje visok rizik od izbjeljivanja od avgusta do novembra	ribarstvo, turizam, zaštita obale

Tabela 3. Očekivane regionalne posljedice događaja 2026/2027, prema analizi Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije iz juna 2026, pregledu World Resources Institute i sezonskim najavama nacionalnih službi.

Raspored je tipičan za jak El Niño; jačina odgovora varira od događaja do događaja.

Hrana i tržišta

Udar na hranu ne dolazi odjednom nego u talasima, jer se sjetve i žetve na južnoj i sjevernoj hemisferi ne poklapaju. Prvi talas ide preko australijske pšenice i jugoistočnoazijskog pirinča i palminog ulja u sezoni 2026/27, drugi preko indijskog pirinča i šećera, treći preko južnoameričke soje i kafe. Analiza Zajedničkog istraživačkog centra iz juna 2026. očekuje oštar rast cijene durum pšenice, blag rast kukuruza, pad soje i tvrde crvene zimske pšenice, i za pirinač prvo pad pa rast u kasnijoj fazi.

Glavni ekonomista Organizacije za hranu i poljoprivredu izdvojio je durum pšenicu i pirinač kao najosjetljivije, zbog spoja El Niña sa smanjenom upotrebom vještačkog đubriva. Pojedine industrijske analize pominju rast globalne inflacije cijena hrane do 9 %, ali te brojke treba čitati kao gornji scenario zainteresovane strane, ne kao prognozu. Ono što je u istoriji dosljedno jeste da rast svjetskih cijena osnovnih namirnica najbrže pogađa domaćinstva koja žive od dnevne nadnice, jer je hrana jedina stavka njihovog budžeta koja se ne može odložiti.

Ekonomski račun

Callahan i Mankin (2023, Science) pokazali su da se ekonomski trag El Niña ne zaustavlja na godini događaja: rast ostaje potisnut najmanje pet godina, a u nekim slučajevima i duže od decenije. Njihova procjena globalnog gubitka dohotka pripisanog događaju 1982/83. iznosi 4,1 bilion dolara, a događaju 1997/98. čak 5,7 biliona. Za dvadeset prvi vijek, uz pojačanje događaja klimatskim promjenama, projektuju kumulativni gubitak od 84 biliona dolara.

Primjena istih elastičnosti na događaj 2026/27, koju je u 2026. objavio Peterson Institute for International Economics, daje gubitak prve godine od oko 990 milijardi dolara, blizu 0,8 % svjetskog proizvoda, i šestogodišnji kumulativ u vrlo širokom rasponu od 7 do 28 biliona. Raspon je toliko širok jer se množi pretpostavkama o trajanju potisnutog rasta; korisniji je podatak da za 51 zemlju sa jakom vezom prema Pacifiku, čiji zajednički proizvod iznosi 9,9 biliona dolara, gubitak dostiže 3,6 % njihovog proizvoda.

Prevedeno: događaj koji u razvijenim zemljama izgleda kao statistička nijansa, u Ekvadoru, Peruu, Indoneziji ili Maleziji izgleda kao izgubljena godina rasta.

Humanitarne posljedice

Zajednički istraživački centar je u junu 2026. objavio analizu koja spaja sezonske najave sa podacima o ranjivosti stanovništva. Najviši rizik nose Centralna Afrika, Sudan, Somalija, Južni Sudan, Čad, Ekvador, Venecuela i Haiti — zemlje u kojima se klimatski šok slaže na sukob, raseljenost ili slabu državu. Vrhunac toplotnog opterećenja u tropima i subtropima očekuje se od decembra 2026. do februara 2027, sa nastavkom u proljeće.

Procjene broja ljudi koji bi zbog ovog događaja ušli u akutnu nesigurnost u ishrani do kraja 2027. kreću se oko 50 miliona. Takve brojke su po prirodi neizvjesne i zavise od toga koliko će se rano djelovati. Za razliku od zemljotresa, El Niño je najavljen mjesecima unaprijed, pa svaki propušteni mjesec priprema jeste odluka, a ne nesreća.

Ekosistemi

Koralni grebeni su najosjetljiviji pokazatelj. Od januara 2023. do septembra 2025. toplotni stres dovoljan za izbjeljivanje pogodio je oko 84 % površine svjetskih grebena u okviru četvrtog globalnog događaja izbjeljivanja. Prognoza NOAA Coral Reef Watch od 21. jula 2026. daje visok rizik od izbjeljivanja od avgusta do novembra, sa težištem na sjevernom Pacifiku, Havajima, Floridi i Karibima. Peti globalni događaj bio bi peti otkad se prati, a prvi je bio 1998, poslije istog ovakvog El Niña.

Uz grebene ide i ribarstvo. Prestanak uzdizanja hladne vode uz Peru raseljava i prorjeđuje inćuna, čime se pogađa najveći svjetski ribolov i lanac hrane za akvakulturu i stočarstvo širom svijeta. Taj efekt je bio vidljiv u svakom jakom događaju od 1972. naovamo.

Šta ovo znači za Crnu Goru

Ne mnogo direktno, i to je poštena rečenica koju sezonske najave rijetko izgovore. Uticaj na vrijeme nad Jadranom ide preko stratosfere i Sjevernog Atlantika, slab je i neuredan, i razrađen je u dokumentu o zimi 2026/2027. Indirektni uticaji su izvjesniji od direktnih:

- cijene hrane, naročito uvoznih žitarica, ulja i kafe, sa zadržkom od dva do četiri tromjesečja;
- topla 2027. godina, koja će u ljetnjoj sezoni značiti još jedno ljeto na gornjem kraju raspodjele, sa svime što ide uz njega — požari, potrošnja vode, toplotni stres;
- more koje ni u jesen 2027. neće imati priliku da se ohladi na nekadašnje vrijednosti, jer toplotni sadržaj Sredozemlja ne prati godišnji ciklus Pacifika;
- turizam, kroz cijene avio-goriva i kroz percepciju juga Evrope kao pretople destinacije u julu i avgustu.

Šta bi promijenilo ovu sliku

Tri stvari. Prvo, brz prestanak zapadnih anomalija vjetra u ekvatorijalnom Pacifiku tokom septembra, koji bi zaustavio dalje jačanje i zadržao vrhunac oko +2,0 °C umjesto preko +2,5 °C. Drugo, raniji raspad dipola u Indijskom okeanu, koji bi ublažio suvi signal nad Australijom i jugoistočnom Azijom, a time i najveći dio poljoprivrednog udara. Treće, brz raspad događaja u januaru umjesto u proljeće, koji bi smanjio zaostali efekt na globalnu temperaturu u 2027. i na cijene u 2028.

Naredni kontrolni datumi su 10. septembar i 8. oktobar 2026, kada izlaze dijagnostičke rasprave NOAA, i sredina novembra, kada se očekuje sam vrhunac.

Zaključak

Ovo je događaj koji će se pamtiti po broju: preko 90 % izgleda za vrlo jak El Niño, 69 % izgleda da bude najjači od 1950. godine, 15 od 26 modela iznad +3,0 °C. Za većinu svijeta on neće izgledati kao jedan događaj nego kao niz naizgled nepovezanih nevolja — suša u Australiji, poplave u Keniji, izbijeljeni grebeni na Havajima, skuplji pirinač u Manili, najtoplija godina u istoriji mjerenja u 2027.

Za Crnu Goru posljedice će stići posredno i sporo. Viđeće se kao skuplja hrana, kao još jedno vrlo toplo ljeto i kao more koje u novembru ostaje toplije nego što bi trebalo.

Izvori

- NOAA Climate Prediction Center, ENSO Diagnostic Discussion, 13. avgust 2026.
- IRI Columbia, ENSO Quick Look i model plume, avgust 2026.
- Bureau of Meteorology (Australija), Climate Driver Update, 11. avgust 2026.
- NOAA, ažurirana najava sezone uragana u Atlantiku, 6. avgust 2026.
- NOAA Coral Reef Watch, četvoromjesečna prognoza izbjeljivanja, 21. jul 2026.
- Zajednički istraživački centar Evropske komisije, analiza humanitarnih posljedica El Niña, 15. jun 2026.
- World Resources Institute, pregled posljedica super El Niña, 2026.
- Copernicus Climate Change Service, bilten o površinskoj temperaturi za jul 2026.
- Carbon Brief, procjena globalne temperature za 2026. i 2027. godinu.
- WMO, Global Annual to Decadal Climate Update 2026–2030.
- Callahan, C. W. i Mankin, J. S. (2023), Persistent effect of El Niño on global economic growth, Science 380, 1064–1070.

- Peterson Institute for International Economics, procjena ekonomskih gubitaka od El Niña, 2026.