

Zima 2026/2027 nad Budvom i crnogorskim primorjem

Sezonska procjena temperature, padavina, mora i rizika, uz vrlo jak El Niño u pozadini

Referentna tačka: Budva (42,28° SGŠ, 18,84° IGD), sa primjenjivošću na pojas Herceg Novi — Ulcinj i njegovo zaleđe. Period pokrivenosti: decembar 2026 — februar 2027 (DJF), sa osvrtom na mart 2027. Datum izrade: 20. avgust 2026. Referentna klimatologija: 1991–2020, računata iz ERA5 reanalize za navedenu tačku. Ovo je prva verzija dokumenta za zimu 2026/2027; prozor revizije je 15. oktobar 2026, kada izlaze sezone najave inicijalizovane 1. oktobra i kada se vidi vrhunac El Niña.

Izvršni sažetak

Zima 2026/2027. dolazi sa najjačim El Niñom otkad se mjeri i sa Sredozemljem koje je u julu 2026. imalo najtopliju površinu mora u istoriji zapisa. Ta dva podatka ne daju istu poruku. El Niño je snažan signal koji se u Evropi slabo i neuredno prevodi, a toplo more je slab signal koji djeluje neprekidno i lokalno. Za primorje Crne Gore, najizgledniji ishod je zima toplija od proseka za $+1,0 \pm 0,8$ °C u odnosu na razdoblje 1991–2020, sa padavinama u rasponu 110 ± 30 % normale i sa težistem na jugu i sredozemnim ciklonama, a ne na hladnim upadima.

Konkretno se očekuje: DJF srednja temperatura oko 9,5 °C na tački Budve umjesto klimatoloških 8,5 °C; ukupne padavine 720 ± 200 mm umjesto 656 mm; snijeg na samoj obali vrlo malo vjerovatan; u planinskom zaleđu iznad 1200 m snijega oko ili iznad proseka, ali sa kasnim početkom sezone i sa granicom snijega koja u svakom prolasku ciklone ide visoko. Najveći pojedinačni rizik nije temperatura nego voda: vjerovatnoća bar jednog dana sa preko 100 mm kiše u 24 h na primorju procijenjena je na 25 %, prema klimatoloških 10 %.

Drugi rizik je suprotan prvom i ne isključuje ga. Sve tri dosad zabilježene zime sa vrlo jakim El Niñom imale su u januaru ili februaru nagli prelazak severnoatlantske oscilacije u negativnu fazu. U ovdašnjim uslovima to znači kratak, oštar prodor hladnog vazduha, mraz u zaleđu i mogućnost snijega do obale u trajanju od dva do četiri dana. Takav događaj se ne može zakazati mjesecima unaprijed, a u sezonskom proseku se jedva vidi.

Pouzdanost. Temperaturni dio ove najave je umjereno pouzdan i naslanja se na trend, na toplo more i na saglasnost modela. Padavinski dio je slab i treba ga čitati kao tendenciju. Evropa je, po vještini sezone prognoze, najgori kontinent na svijetu, a zima je sezona u kojoj se ta slabost najviše vidi.

Podaci, metodologija i ograničenja

Klimatologija i istorijski nizovi u ovom dokumentu računati su iz ERA5 reanalize za tačku 42,28° SGŠ, 18,84° IGD, preko Open-Meteo archive, za period 1950–2026. ERA5 je mreža rezolucije oko 9 km i miješa more i kopno, pa su noćni minimumi na ovoj tački viši, a padavine veće nego na stanici Bar. Godišnji zbir padavina na ovoj tački iznosi 2108 mm za 1991–2020, što je orografski uvećana vrijednost i ne treba je porediti sa stanicom. Poređenja unutar samog niza (anomalije, rangovi, odnosi prema normali) su korektna, jer ista pristrasnost pogađa i klimatologiju i pojedinačnu godinu.

Sezonski signal je uzet iz sezone najave službe Copernicus (C3S) izdate u avgustu 2026, iz dijagnostičke rasprave o ENSO-u Centra za prognozu klime NOAA od 13. avgusta 2026, iz pregleda IRI Columbia za avgust 2026, iz biltena o okeanu Mercator Ocean International i iz biltena o suši i požarima Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije. Analogne zime izabrane su po jednom kriterijumu — vrhunac ONI iznad +2,0 °C — i njihove lokalne vrijednosti su izračunate, a ne prepričane.

Ograničenja su ozbiljna i navode se prije zaključaka, ne poslije njih. Prvo, veza između tropskog Pacifika i evropske zime je posredna, ide preko stratosfere i preko Ševernog Atlantika, i nije stacionarna — ista jačina El Niña davala je različit evropski odgovor u različitim decenijama. Drugo, vještina sezone prognoze padavina nad jugoistočnim Sredozemljem je tek neznatno iznad klimatologije. Treće, uzorak vrlo jakih El Niño zima broji tri slučaja, što je premalo za statistiku i dovoljno samo za ilustraciju. Četvrto, sve brojke u mjesečnim tabelama su rasponi, jer sezonska najava koja daje jednu decimalu za pojedinačni mjesec obmanjuje korisnika.

Polazno stanje: ljeto koje prethodi

Zima se ne nasljeđuje na praznom. Jul 2026. bio je najtopliji jul u zapisu za Sredozemno more, sa prosečnom temperaturom površine $27,07 \pm 0,27$ °C, iznad rekorda iz jula 2025. ($26,68 \pm 0,11$ °C). Vanpolarni okean između 60° JGŠ i 60° SGŠ imao je 20,96 °C, najviše ikad za taj mjesec, iznad 20,89 °C iz 2023. Globalna prizemna temperatura u julu 2026. iznosila je 16,90 °C, 0,67 °C iznad proseka 1991–2020 i 1,47 °C iznad procijenjenog predindustrijskog nivoa.

Na kopnu, Evropa je ljeto 2026. dočekala i ispratila u suši. Sredinom avgusta 50 % teritorije Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva bilo je u nekoj od kategorija suše, a 9 % u kategoriji „alarm”. Loara, Po, Rajna i Dunav zabilježili su rekordno niske vodostaje; Rajna je kod Kelna pala na 74 cm, a Dunav do granice plovnosti, zbog čega je rafinerija u Pančevu 4. avgusta prepolovila preradu. Do 5. avgusta u Evropi je izgorjelo 505 683 ha, prema 379 392 ha do istog datuma 2025. Crna Gora je, mjereno udjelom izgorjele u ukupnoj teritoriji, prošla gore od Španije i Portugala.

Za zimu su iz ovoga važne dvije stvari. Tlo u zaleđu ulazi u kišnu sezonu isušeno i sa oštećenim biljnim pokrivačem na požarištima, što znači brže oticanje i veći rizik od bujica i klizišta pri prvim jakim kišama. I more je toplije nego ikad u ovo doba godine, pa svaka ciklona koja se u jesen i ranu zimu formira nad južnim Jadranom raspolaže većom količinom vodene pare — po Klauzijus-Klapejronovoj relaciji oko 7 % više vlage po stepenu zagrijavanja.

El Niño: stanje sistema u avgustu 2026

Događaj je već sada vrlo jak i još jača. Julske vrijednosti indeksa bile su +1,4 °C u regionu Niño 3.4, +1,7 °C u regionu Niño 3 i +2,9 °C u regionu Niño 1+2, dakle sa naglaskom na istočni Pacifik, što odgovara tipu iz 1982/83. i 1997/98. Podpovršinske anomalije dosezale su +10 °C, a oba indeksa južne oscilacije bila su oko dvije standardne devijacije ispod nule tokom jula. Sedmične vrijednosti u avgustu razlikuju se po proizvodu: +2,7 °C prema proizvodu koji koristi NOAA i +2,20 °C prema relativnom indeksu australijskog biroa za sedmicu koja se završila 9. avgusta. Razlika nije greška nego posljedica različite osnove i različite obrade; smjer je isti.

Veličina	Vrijednost	Izvor i datum
Niño 3.4, jul 2026	+1,4 °C	NOAA CPC, 13.8.2026
Niño 3, jul 2026	+1,7 °C	NOAA CPC, 13.8.2026
Niño 1+2, jul 2026	+2,9 °C	NOAA CPC, 13.8.2026
Podpovršinska anomalija	do +10 °C	NOAA CPC, 13.8.2026
RONI, medijana za okt-dec 2026	+2,66 °C (sredina raspodjele +2,37 do +2,95)	NOAA CPC, 13.8.2026
RONI, medijana za dec-feb	+2,23 °C	NOAA CPC, 13.8.2026
Izgledi za istorijski događaj ($\geq +2,5$ °C, okt-dec)	69 %	NOAA CPC, 13.8.2026
Izgledi za vrlo jak događaj u jesen i zimu	preko 90 %	NOAA CPC, 13.8.2026
Vjerovatnoća da El Niño traje kroz feb-apr 2027	100 %	IRI, avgust 2026

Veličina	Vrijednost	Izvor i datum
Modeli koji daju vrhunac $\geq +3,0$ °C	15 od 26	IRI plume, avgust 2026
Indeks dipola Indijskog okeana	+0,41 °C, treća sedmica iznad praga	BoM, 9.8.2026

Tabela 1. Stanje i projekcija ENSO sistema, prema dijagnostičkoj raspravi NOAA CPC od 13. avgusta 2026. i pregledu IRI Columbia za avgust 2026. RONI je relativni indeks, koji od anomalije u regionu Niño 3.4 oduzima zagrijavanje cijelog tropskog pojasa i zato je uporediviji kroz decenije od klasičnog ONI.

Uz El Niño se razvija i pozitivan dipol u Indijskom okeanu. Ta dva obrasca zajedno pojačavaju tropsko forsiranje cirkulacije ševerne hemisfere i, u praksi, znače da će atmosferski odgovor biti jači nego što bi sama vrijednost u Pacifiku sugerisala. Kvazidvogodišnja oscilacija u stratosferi je u zapadnoj fazi, sa zapadnim vjetrovima koji se spuštaju kroz nivo 15–30 hPa i koji bi do zime trebalo da se ustale na 30–50 hPa. Zapadna faza smanjuje izgleda za naglo zagrijavanje stratosfere u odnosu na istočnu, pa se dvije sklonosti — El Niño koji povećava rizik i zapadna kvazidvogodišnja faza koja ga smanjuje — djelimično poništavaju.

Kako El Niño uopšte stigne do Jadrana

Put je dug i na svakom koraku gubi na jačini. Pomjeranje tropskih oborina na istok mijenja raspored uzlaznih strujanja, iz njih se dižu planetarni Rosbijeve talasi, ti talasi se šire ka polu i navise, dio energije ulazi u stratosferu i slabi polarni vrtlog, a oslabljeni vrtlog se mjesec do dva kasnije spusti u troposferu kao negativna faza arktičke i ševernoatlantske oscilacije. Tek na tom kraju lanca stoji naše vrijeme.

Zbog te dužine, evropski odgovor na El Niño ima dvije faze i one su suprotne. U ranoj zimi, decembru i prvoj polovini januara, prevlađuje pojačan zapadni tok, blaga i vlažna klima nad zapadnom i južnom Evropom i natprošecne padavine u ševernom Sredozemlju. U kasnoj zimi, februaru i martu, češće se javlja negativna faza ševernoatlantske oscilacije, blokada nad ševernom Evropom i prodori hladnog vazduha ka jugu. Taj kasnozimski obrazac opisao je Brönnimann (2007, Reviews of Geophysics) na osnovu petovjekovnih rekonstrukcija, a stratosferski mehanizam koji ga nosi razradili su Ineson i Scaife (2009, Nature Geoscience) i Ayarzagüena i saradnici (2018, Climate Dynamics). Noviji radovi pokazuju da jačina te veze varira od decenije do decenije, što je razlog zašto je operativno koristiti je kao rizik, a ne kao prognozu.

Za jugoistočni Jadran, obje faze imaju istu praktičnu posljedicu na padavine, a suprotnu na temperaturu. Rani zimski zapadni tok donosi kišu preko fronta; kasnozimska blokada donosi sredozemne ciklone koje se sporo kreću i koje na dinarsku barijeru izlijevaju velike količine vode uz istovremeno zahlađenje. Godina sa jakim El Niňom u ovim krajevima rijetko je suva zima. Rijetko je i mirna.

Multi-modelska slika za DJF 2026/2027

Sezonska najava službe Copernicus izdata u avgustu 2026. stavlja veći dio Evrope iznad 80. percentila istorijske raspodjele temperature, uz izuzetak najistočnijih i najševernijih djelova kontinenta, i daje signal za vlažniju jesen na jugu i zapadu, uz izričitu napomenu da je nesigurnost tu veća a vještina niža nego u tropima. Raspored pritiska koji modeli daju za zimu je greben visokog pritiska sa juga i ciklonalna aktivnost nad ševerozapadom kontinenta, dakle pojačan zapadni tok, sa vlagom i natprošecnim padavinama.

Izvor	Temperatura DJF	Padavine (% normale)	Pouzdanost
C3S multi-model (avgust 2026)	iznad 80. percentila	iznad prošeka na jugu i zapadu	srednja (T) / niska (P)
ECMWF SEAS5	+0,8 do +1,8 °C	100 do 130 %	srednja
UKMO GloSea6	+0,5 do +1,5 °C	100 do 125 %	srednja

Izvor	Temperatura DJF	Padavine (% normale)	Pouzdanost
Météo-France System 9	+0,8 do +1,6 °C	105 do 135 %	srednja
DWD GCFS, CMCC SPS, NCEP CFSv2	+0,5 do +1,5 °C	95 do 130 %	srednja-niska
Analogni kompozit (4 zime)	−0,1 do +1,8 °C	92 do 194 %	ilustrativna
Konsolidovana procjena	+1,0 ± 0,8 °C	110 ± 30 %	srednja (T) / niska (P)

Tabela 2. Konsolidacija sezonskog signala za DJF 2026/2027 nad jugoistočnim Jadranom. Vrijednosti su ekspertiska sinteza objavljenih kartografskih i tekstualnih proizvoda, a ne numerički izlaz pojedinačnog modela; tamo gdje pojedinačni sistemi ne objavljuju brojke za tačku, dat je raspon konzistentan sa objavljenim tercilnim kartama.

Raspon analognog kompozita je namjerno ostavljen širok. On pokriva zimu koja je dala 91 % normale i zimu koja je dala 194 % normale, i upravo ta širina je poštena mjera onoga što se o padavinama zna unaprijed.

Analogne zime

Postoje tri zime sa vrhuncem indeksa ONI iznad +2,0 °C: 1982/83, 1997/98. i 2015/16. Uz njih se posmatra i 2009/10, umjeren El Niño sa izrazito negativnom severnoatlantskom oscilacijom, jer je to lokalno najvlažnija zima u cijelom nizu. Vrijednosti su izračunate iz ERA5 za tačku Budve i date su kao odstupanje od klimatologije 1991–2020.

Zima	ONI vrhunac	decembar	januar	februar	DJF ukupno
1982/83	+2,2 °C	+0,8 °C / 144 %	+0,7 °C / 41 %	−2,2 °C / 130 %	−0,1 °C / 112 %
1997/98	+2,4 °C	+0,2 °C / 127 %	+1,2 °C / 78 %	+1,6 °C / 54 %	+1,0 °C / 92 %
2009/10	+1,6 °C	+1,0 °C / 175 %	−0,1 °C / 185 %	+0,1 °C / 219 %	+0,4 °C / 194 %
2015/16	+2,6 °C	+1,4 °C / 1 %	+0,5 °C / 157 %	+3,3 °C / 155 %	+1,8 °C / 94 %

Tabela 3. Analogne zime na tački Budve, ERA5, odstupanje srednje temperature i procenat normale padavina po mjesecima. Zima je označena godinom januara. Zima 2009/10 je najvlažnija u nizu 1950–2026 sa 1271 mm, a zima 2015/16 sadrži gotovo suv decembar (1 % normale) praćen vrlo vlažnim februarom.

Iz tabele se vidi ono što prošek krije. Nijedna od četiri zime nije bila ravna: svaka je imala bar jedan mjesec sa manje od 60 % ili više od 150 % normale, a dvije su imale i jedno i drugo. Februar 1983. bio je 2,2 °C hladniji od današnje klimatologije, februar 2016. bio je 3,3 °C topliji. Ista pojava u Pacifiku, obrnut ishod na Jadranu. Zato se ovaj dokument bavi rasporedom vjerovatnoća, a ne rasporedom dana.

Vrijedi dodati i kontekst zagrijavanja. Trend srednje zimske temperature na tački Budve iznosi +0,19 °C po deceniji za period 1951–2026, a godišnji +0,21 °C. Šest od osam najtoplijih zima u nizu od 1950. dogodilo se poslije 2014. godine; najtoplija je 2023/24. sa +2,0 °C iznad klimatologije. Za zimu 2026/2027. to znači da je „iznad prošeka” danas skoro osnovno stanje, a ne prognostička hrabrost.

Mjesečni pregled

Klimatologija u tabeli je izračunata iz ERA5 za tačku Budve, period 1991–2020. Centralna procjena i raspon odnose se na zimu 2026/2027. Raspon pokriva 80 % ishoda, dakle jedan od pet mjeseci će po definiciji izaći iz njega.

Mjesec	Tmax klima	Tmin klima	Padavine klima	Procjena 2026/27
decembar	11,8 °C	6,9 °C	269 mm	srednja T +0,5 do +1,5 °C; padavine 220–380 mm; jugo često
januar	10,6 °C	5,3 °C	191 mm	srednja T 0 do +1,5 °C; padavine 150–330 mm; najveći rizik od preokreta
februar	11,4 °C	5,4 °C	205 mm	srednja T +0,5 do +2,0 °C; padavine 160–340 mm; blokade i sredozemne ciklone
mart	14,1 °C	7,6 °C	193 mm	srednja T +0,5 do +2,0 °C; padavine 140–280 mm; rana vegetacija, rizik od mraza

Tabela 4. Klimatologija 1991–2020 i procjena za zimu 2026/2027, tačka Budve, ERA5. Padavine su date kao raspon jer je mjesečni zbir na ovoj obali određen sa dva do četiri pojedinačna događaja, pa mu je varijansa velika i u klimatologiji.

Decembar 2026. najvjerovatnije počinje blago i vlažno, sa zapadnim tokom i sa prvim sredozemnim ciklonama koje se hrane rekordno toplim morem. Snijeg u planinskom zaleđu kasni; granica snijega pri prolascima fronta ide iznad 1400 m, pa se u Kolašinu i na Žabljaku prvi stabilan pokrivač očekuje kasnije nego obično. Januar 2027. nosi najveću neizvjesnost: polovina analognih zima ima u tom mjesecu preokret u negativnu fazu oscilacije, a druga polovina nastavak blagog toka. Februar 2027. je mjesec u kojem se, po istorijskom obrascu, najčešće javlja kasnozimska blokada, pa uz visoku srednju temperaturu treba računati i na mogućnost kratkog oštrog zahlađenja. Mart 2027. najvjerovatnije donosi ranu i toplu vegetacionu sezonu, sa rizikom da kasni mraz pogodi već probuđene voćke u Crmnici i Zeti.

Vjerovatnoće prekoračenja pragova

Klimatološka osnova je udio zima u periodu 1991–2020. u kojima se događaj javio bar jednom, izračunat iz ERA5 za tačku Budve. Procjena za 2026/2027. je konsolidacija te osnove, sezonskog signala i analognog kompozita.

Prag ili događaj	Klimatološka osnova	Procjena za DJF 2026/27
Srednja zimska temperatura iznad +1 °C od normale	23 % zima	55 %
Srednja zimska temperatura iznad +1,5 °C od normale	7 % zima	30 %
Bar jedan dan sa ≥ 50 mm kiše	83 % zima	90 %
Tri ili više dana sa ≥ 50 mm kiše	37 % zima	50 %
Bar jedan dan sa ≥ 100 mm kiše	10 % zima	25 %
Ukupne padavine iznad 120 % normale	23 % zima	40 %
Ukupne padavine iznad 150 % normale	10 % zima	20 %
Ukupne padavine ispod 80 % normale	20 % zima	12 %
Bar jedan mraz na obali ($T_{min} < 0$ °C)	73 % zima	60 %
Deset ili više mraznih dana	3 % zima	5 %
Snijeg koji se zadrži na obali	oko 10 % zima	12 %
Prodor hladnog vazduha sa negativnom fazom NAO u jan-feb	oko 40 % zima	55 %

Tabela 5. Vjerovatnoće prekoračenja pragova za zimu 2026/2027, primorje Crne Gore. Klimatološka osnova je izračunata, a procjena je ekspertiska. Pragovi za padavine odnose se na ERA5 tačku i sistematski su viši nego što bi bili na stanicima; odnos između klimatologije i procjene ostaje valjan.

Dva reda iz tabele nose gotovo cijelu operativnu poruku. Vjerovatnoća dana sa preko 100 mm kiše podignuta je sa 10 na 25 % zato što se toplo more, pojačan zapadni tok i sklonost ka sporim sredozemnim ciklonama sabiraju u istom smjeru. Vjerovatnoća hladnog prodora podignuta je sa 40 na 55 % zbog obrasca kasne zime u analognim godinama, uprkos tome što je sezonski prosek

topao.

Sektorski rizici

Bujice, klizišta i kanalizacija

Ovo je glavni rizik sezone. Zaleđe primorja ulazi u kišni dio godine sa isušenim tлом i sa požarištima iz ljeta 2026, na kojima nema vegetacije koja bi zadržala vodu. Prva jaka kiša na takvoj podlozi daje veći i brži oticaj nego ista kiša na neoštećenom terenu. Kritične tačke su poznate: Grbaljsko polje, bujični tokovi iznad Budve i Bečića, Petrovac i Buljarica, spustovi prema Sutomoru. Sistemi za odvođenje kišnice u Budvi dimenzionisani su za drugačiju raspodjelu padavina i u epizodama preko 60 mm/h redovno se preplavljuju.

Vodosnabdijevanje i akumulacije

Vlažna zima je za primorje dobra vijest, ali sa odloženim dejstvom. Izvorišta se pune sporo i prazne brzo, a ljeto 2027. zavisi od toga koliko će padavina pasti između novembra i marta. Ako se ostvari donji dio raspona, dakle oko 80 % normale, ulazi se u naredno ljeto sa deficitom, a ljeto poslije jakog El Niña obično je toplo. To je scenario koji zaslužuje praćenje već od januara.

More, talasi i obala

Češće i jače jugo znači duže epizode visokog talasa u Budvanskom zalivu i pojačanu eroziju plaža u Bečićima, Rafailovićima i Sutomoru, gdje je pijesak već pod pritiskom. Uz to ide i podignut nivo mora u epizodama niskog pritiska i juga, koji sa astronomskom plimom daje plavljenje niskih dijelova obale, najizraženije u Boki.

Snijeg i planinski turizam

Signal za planine je podijeljen. Ukupna količina padavina iznad proseka pomaže, temperatura iznad proseka odmaže. Rezultat je sezona sa dobrim snijegom iznad 1500 m i nesigurnim snijegom između 1000 i 1400 m, dakle upravo tamo gdje se nalazi većina crnogorskih staza. Vjerovatan je kasan početak sezone i oslanjanje na vještački snijeg u decembru, uz mogućnost velikih sniježnih količina u pojedinačnim epizodama u januaru i februaru. Isti obrazac važi za veći dio Alpa, gdje se signal za snijeg pomjera ka severu i ka većim visinama.

Poljoprivreda

Blaga zima znači nedovoljan broj sati hlađenja za koštičave voćke, ranije kretanje vegetacije i veći rizik od mraza u martu i aprilu. Maslina i citrusi prolaze dobro u toploj zimi, ali maslinina muva i druge štetočine prezimljavaju u većem broju, pa raste pritisak na zaštitu. Vlažna zima pogoduje gljivičnim oboljenjima.

Energetika i saobraćaj

Potrošnja za grijanje biće ispod proseka, ali su epizode juga sa udarima vjetra glavni uzrok kvarova na distributivnoj mreži u primorju. Jadranska magistrala je u epizodama obilne kiše izložena odronima, a u kratkim hladnim prodorima poledici na dionicama u zaleđu.

Regionalna slika

Područje	Temperatura	Padavine i snijeg
Crnogorsko primorje	iznad proseka	iznad proseka; snijeg na obali malo vjerovatan
Crnogorske planine	iznad proseka	padavine iznad proseka; snijeg dobar iznad 1500 m
Dalmacija i Hercegovina	iznad proseka	iznad proseka, sa težištem na jugu
Panonski dio (Vojvodina, severna Srbija)	blago iznad proseka	oko proseka; magla i inverzije
Alpi	iznad proseka	snijeg ispod proseka na nižim visinama

Područje	Temperatura	Padavine i snijeg
Skandinavija i Škotska	blizu prosjeka do blago iznad	vlažno, snijeg iznad prosjeka na sjeveru
Istočna Evropa	blizu prosjeka	veći rizik od blokade i hladnih upada

Tabela 6. Regionalizacija signala za zimu 2026/2027. Poređenja su izvedena iz sezone najave službe Copernicus i iz obrasca cirkulacije koji modeli daju, a ne iz nacionalnih sezonskih biltena, koji za zimu 2026/2027. u trenutku izrade još nijesu izdati.

Šta bi opovrglo ovu najavu

Sezonska najava koja ne kaže kako bi se pokazala pogrešnom nije upotrebljiva. Ova bi bila opovrgnuta u tri slučaja. Prvi: ako se El Niño u septembru i oktobru zaustavi ispod +2,0 °C u regionu Niño 3.4, čime bi otpao dio pretpostavke o jakom tropskom forsiranju. Drugi: ako se polarni vrtlog krajem novembra pokaže izrazito jakim i stabilnim, jer bi tada zima krenula u trajno pozitivnu fazu oscilacije, sa suvljim i vjetrovitijim jugom Evrope nego što je ovdje opisano. Treći: ako se do kraja decembra ostvari manje od 60 % normalnih padavina, čime bi pretpostavka o vlažnoj zimi izgubila osnov, po uzoru na decembar 2015. sa 1 % normale.

Prvi kontrolni datum je 10. septembar 2026, kada izlazi naredna dijagnostička rasprava NOAA. Drugi je početak oktobra, kada izlaze sezone najave inicijalizovane 1. oktobra i kada se prvi put vidi zimski obrazac u modelima sa razumnim vremenom najave. Treći je sredina novembra, kada se stanje polarnog vrtloga može pratiti direktno.

Zaključak

Zima 2026/2027. na crnogorskom primorju najvjerovatnije će biti toplija i vlažnija od klimatološke, sa jugom kao vodećim vremenskim tipom, malo snijega na obali i dobrim snijegom samo na većim visinama. Iza tog prosjeka stoje dvije stvari koje prosjek ne pokazuje: povišen rizik od obilne kiše u kratkom vremenu, na tlu koje je poslije ljetnjih požara i suše manje sposobno da je primi, i realna mogućnost kratkog oštrog zahlađenja u januaru ili februaru, po obrascu koji su imale sve tri zime sa vrlo jakim El Niñom.

El Niño ove jačine je globalno rijedak događaj i biće vidljiv na mnogo mjesta. Na Jadranu neće biti vidljiv kao katastrofa nego kao raspored: više kiše u nekoliko epizoda, više juga, manje mraza i more koje ni u februaru neće biti hladno kao nekad.

Izvori

- NOAA Climate Prediction Center, ENSO Diagnostic Discussion, 13. avgust 2026.
- IRI Columbia, ENSO Quick Look i model plume, avgust 2026.
- Bureau of Meteorology (Australija), Climate Driver Update, 11. avgust 2026.
- Copernicus Climate Change Service, sezone najave i mjesečni bilteni, avgust 2026.
- Copernicus Climate Change Service, bilten o površinskoj temperaturi za jul 2026.
- Mercator Ocean International, bilteni o temperaturi okeana i morskim toplotnim talasima, jul i avgust 2026.
- Zajednički istraživački centar Evropske komisije, izvještaj o suši, vodostajima i požarima, 12. avgust 2026.
- EFFIS, statistika izgorjele površine za sezonu 2026.
- ERA5 reanaliza preko Open-Meteo archive, tačka 42,28° SGŠ 18,84° IGD, 1950–2026.
- Brönnimann, S. (2007), Impact of El Niño–Southern Oscillation on European climate, Reviews of Geophysics 45, RG3003.
- Ineson, S. i Scaife, A. A. (2009), The role of the stratosphere in the European climate response to El Niño, Nature Geoscience 2, 32–36.
- Ayarzagüena, B. i saradnici (2018), Stratospheric role in interdecadal changes of El Niño impacts over Europe, Climate Dynamics 51, 3985–3998.