

Detaljni vremenski outlook za Ljeto 2026 u Budvi

Sezonska procjena temperature, padavina, mora i rizika

Izvršni sažetak

Najrobustniji signal za Budvu u Ljeto 2026 je toplije od normale, uz toplije površinske temperature mora i veću vjerovatnoću toplih noći, dok je signal za ukupne padavine slabiji i nesigurniji, ali sa blagim nagibom ka normalno do sušnije od normale, posebno u srcu ljeta. To proizlazi iz kombinacije: aktuelnog globalnog i evropskog toplog klimatskog stanja, veoma toplog Mediterana u proljeće 2026, očekivanog razvoja El Niña tokom ljeta 2026, te činjenice da sezonski modeli nad Mediteranom tipično daju više korisnog signala za temperaturu nego za padavine.

U praktičnom smislu, to znači da je za Budvu najvjerovatniji scenarij toplo do vrlo toplo ljeto, sa tipičnim dnevnim maksimumima uglavnom u rasponu oko 27–31 °C u junu i 30–34 °C u julu i avgustu, uz povremene jače epizode koje mogu gurati temperaturu prema 35–38 °C, naročito kada se spoje vedrina, slab sinoptički gradijent i zagrijano more. Noćne temperature će vjerovatno češće ostajati iznad 20 °C, a tokom toplih epizoda i iznad 24–25 °C, što je važnije za zdravstveni rizik nego sami dnevni maksimumi.

Za padavine je glavni zaključak drugačiji: sezonski zbir vjerovatno neće biti visok, ali ljetni ukupan zbir na obali Jadrana može snažno zavisiti od jednog ili dva konvektivna događaja. Zato je vjerovatniji ishod manje kišnih dana i duži sušni intervali, ali bez isključivanja kratkih, lokalno vrlo jakih pljuskova i nepogoda. Drugim riječima, Budva može imati „sušnju“ sezonu po učestalosti kiše, a ipak dobiti jedan kratkotrajan, ali vrlo obilan događaj.

Kao radna procjena rizika: povjerenje je srednje-visoko za temperaturu, visoko za toplije more, srednje za toplotne valove i noćnu sparinu, srednje-nisko do srednje za padavine, te srednje-visoko za rast sušnog/požarnog rizika prema kraju jula i u avgustu. Početni uslovi u proljeće 2026 nijesu pokazivali ekstremnu, duboku sušu na cijelom Balkanu, ali toplije nego normalno ljeto bi i bez ekstremno suvog proljeća brzo isušilo fino gorivo i povećalo opasnost od požara na primorju i u zaleđu.

Podaci, metodologija i ograničenja

Osnovu ove procjene čine operativni i klimatološki materijali Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, sezonski proizvodi Copernicus Climate Change Service i ECMWF, ENSO dijagnostika WMO, Climate Prediction Center i International Research Institute for Climate and Society, regionalni okvir SEEVCCC / SEECOF, te okeanski i sušni indikatori koje objavljuju European Drought Observatory i Mercator Ocean International. Za savremeni službeni referentni period korišten je 1991–2020, jer je to baza koju ZHMS koristi u svojim recentnim klimatološkim biltenima, a ista baza se pojavljuje i u savremenim NOAA/CPC ENSO proizvodima.

Važno metodološko ograničenje je da potpuna, javno indeksirana službena tabela klimatoloških normala za Budvu po mjesecima nije bila lako dostupna iz jednog službenog izvora koji bi istovremeno

davao prosječne dnevne maksimume, minimume, vlažnost, kišne dane i temperaturu mora. Zato sam koristio službene ZHMS izvore za anomalije, recentne verifikacije, tropske noći i padavine, a za apsolutne „turistički korisne“ dnevne high/low i vlažnost dopunio sam sliku Budva/Tivat klimatografijama za Budvu i obližnji Tivat. To znači da su tabele sa „projektovanim rasponima“ sintetička ekspertna procjena, a ne jednostavno prepisan izlaz jednog modela.

Drugo ograničenje je regionalni modelski okvir: SEECOF/SEEVCCC je javno naveo da postoji SEECOF 35 za ljeta 2026, a SEEVCCC na svom operativnom portalu opisuje i regionalni dinamički downscaling ECMWF sezonskih prognoza sa 41 članom ansambla, ali puni tekst ljetnog 2026 konsenzusnog dokumenta nije bio pouzdano izvučiv u ovoj sesiji. Takođe, za „GFS“ u strogo sezonskom smislu nijesam našao Budva-specifičan, javno robustan proizvod; zato je američki sezonski signal predstavljen kroz CPC/IRI/NMME/CFS porodicu, što je operativno standardniji izbor za ovu vremensku skalu.

Klimatološka polazna osnova Budve

Budva ima izrazito maritimno-modifikovano mediteransko ljeto: vedrije nebo od juna do septembra, mali broj kišnih dana u jezgru sezone i snažan uticaj mora na noćne temperature. U javno dostupnim lokalnim klimatografijama prosječni ljetni maksimumi su približno 27 °C u junu, oko 30 °C u julu i oko 29–30 °C u avgustu, dok su prosječni ljetni minimumi približno 18–19 °C u junu i 21–22 °C u julu/avgustu; istovremeno, broj kišnih dana opada na oko 5 u junu i 4 u julu/avgustu, uz tipične mjesečne zbirove od približno 61 mm, 42 mm i 55 mm. Srednja relativna vlažnost se u ljetnim mjesecima kreće oko 71 % u junu, 68 % u julu i 67 % u avgustu, a more je tipično oko 22,9 °C u junu, 25,2 °C u julu i 25,6 °C u avgustu.

Službeni crnogorski izvori potvrđuju da je posljednjih godina Budva već radila na toplijoj osnovi. U ZHMS godišnjim izvještajima Budva je imala vrlo tople ljetne mjesece 2023. i 2025. godine; u 2023. su službeno navedeni Budva: jun 24,3 °C, jul 28,1 °C, avgust 27,3 °C, uz padavine 54,7 mm, 52,4 mm i 195,4 mm; u 2024. su navedeni jul 29,2 °C i avgust 29,0 °C, uz padavine 51,5 mm, 45,5 mm i 32,1 mm za jun–avgust; a u 2025. Budva je po godišnjem izvještaju imala 91 tropsku noć u godini, dok je jun 2025. sam donio 24 tropske noći u Budvi. To je snažan pokazatelj da je problem ljetne vrućine u Budvi sve manje samo pitanje dnevnog maksimuma, a sve više pitanje akumulacije toplote tokom noći.

U širem klimatskom kontekstu, peer-reviewed radovi za Crnu Goru i Mediteran pokazuju rast toplih temperaturnih indeksa, češće i intenzivnije tople ekstreme, te uopšte snažnije zagrijavanje Mediterana i Jadrana nego u mnogim drugim morskim područjima sjeverne hemisfere. Za Crnu Goru su u homogenizovanom nizu 1961–2020 utvrđeni značajni trendovi toplih percentilnih indeksa, dok starija nacionalna dokumentacija navodi da primorje nema jak rast godišnjih suma padavina i čak pokazuje blag signal smanjenja. Za Mediteran i Jadran literatura pokazuje izražen trend zagrijavanja površine mora, posebno ljeti.

Signal ljeta 2026 iz modela i telekonekcija

Na globalnom nivou, najvažniji sezonski signal za ljeta 2026 je očekivani razvoj El Niña. U aprilu 2026. IRI je davao oko 92 % vjerovatnoće El Niña za JJA 2026, dok je službeni NOAA/CPC proizvod za sezonu

JJA davao 79 % El Niño / 21 % neutralno / 0 % La Niña. WMO je krajem aprila 2026. saopštio da modeli sada pokazuju jasan pomak ka El Niñu od sredine 2026. i „skoro globalnu dominaciju iznadprosječnih kopnenih temperatura“ u narednom tromjesečju. To ne znači da El Niño „automatski“ određuje vrijeme u Budvi, ali znači da je pozadina za toplu sezonu dodatno pomaknuta prema toplijem ishodu.

Za Mediteran je važno da su sezonski modeli korisniji za temperaturu nego za padavine. U procjeni vještine C3S sistema za Mediteran, višemodelski ansambl i pojedini sistemi daju bolji signal za temperaturne anomalije nego za padavine, a dodatna studija o mediteranskim režimima pokazuje da se sezonska predvidivost poboljšava u godinama sa izraženijim ENSO signalom. U praksi to znači: ako modeli i telekonekcije zajedno guraju prema toplijem ljetu, taj signal je vrijedan ozbiljnog povjerenja; ako isto rade i za padavine, oprez mora ostati veći.

Uticaj NAO i šire sjeveroatlantske pozadine je važan, ali manje „čist“ na sezonskoj skali za Budvu nego ENSO. Literatura za Mediteran pokazuje da ljetni NAO i srodni obrasci mogu pojačati ili djelimično amortizovati ljetnu toplotu i sušu, a noviji radovi pokazuju i širenje distribucije ekstremnih stanja ljetnog NAO pod klimatskim promjenama. Međutim, za konkretno ljetno 2026. nijesam našao javno robustan, Budva-specifičan sezonski NAO signal koji bi zaslužio numeričku upotrebu; zato NAO tretiram kao sekundarni modulator, a ne kao glavnog nosioca outlooka. Za AMO/North Atlantic SST decenijska pozadina toplog sjevernog Atlantika i Mediterana više djeluje kao pojačivač toplog baznog stanja nego kao samostalni prediktor mjesečnih padavina u Budvi.

Vrlo važan dio signala za Budvu dolazi iz samog mora. U martu 2026. Mediteran je bio treći najtopliji mart od 1993. godine, a u aprilu 2026. unutar deset najtoplijih aprila u zadnje 34 godine prema Mercator Oceanu; Copernicus je istovremeno isticao da se temperature mora približavaju rekordnim nivoima. Za Budvanski zaliv i južni Jadran to pojačava vjerovatnoću toplijih noći, veće sparine i sporijeg noćnog hlađenja, čak i ako dnevni sinoptički maksimumi ne budu ekstremni svaki dan.

Mjesečni outlook za jun, jul i avgust

Na osnovu kombinacije službenog 1991–2020 anomalijskog okvira, recentnih ZHMS mjerenja, lokalne Budva/Tivat klimatologije i sezonskog toplog signala iz WMO–CPC–IRI–C3S/ECMWF okvira, centralna procjena za Budvu je sljedeća. Temperature su sintetički procijenjene kao rasponi, a ne kao jedna „tačna“ brojka, jer je to fizički poštenije za sezonski outlook.

Temperatura i toplotni komfor

Mjesec	Kompozitna klimatologija dnevni max/min	Projektovani prosječni max/min	Operativni očekivani dnevni raspon	Procijenjena anomalija
Jun	oko 27,2 / 18,2 °C	oko 28,4 / 19,4 °C	tipično 27–31 / 19–23 °C; u toplim epizodama 32–35 °C	+0,8 do +1,6 °C
Jul	oko 30,0 / 20,8 °C	oko 31,3 / 22,1 °C	tipično 30–34 / 22–26 °C; u jačim valovima 35–38 °C	+0,8 do +1,8 °C

Mjesec	Kompozitna klimatologija dnevni max/min	Projektovani prosječni max/min	Operativni očekivani dnevni raspon	Procijenjena anomalija
Avgust	oko 29,4 / 21,3 °C	oko 30,6 / 22,5 °C	tipično 30–34 / 22–26 °C; u jačim valovima 35–38 °C	+0,7 do +1,7 °C

Tabela 1. Klimatološki stupci za dnevne max/min su kompozit Budva/Tivat javnih klimatografija, a projektovani stupci su sinteza toplog sezonskog signala i lokalne obalne modulacije.

Napomena: klimatološki stupci za dnevne max/min su kompozit Budva/Tivat javnih klimatografija, a projektovani stupci su sinteza toplog sezonskog signala i lokalne obalne modulacije. Službeni ZHMS nizovi potvrđuju da su recentna ljeta u Budvi već vrlo topla i sa čestim tropskim noćima.

Pregled prosječnih dnevnih maksimuma — klimatologija u poređenju sa centralnom projekcijom

- **Jun:** klimatologija 27,2 °C → centralna projekcija 28,4 °C (razlika približno +1,2 °C).
- **Jul:** klimatologija 30,0 °C → centralna projekcija 31,3 °C (razlika približno +1,3 °C).
- **Avgust:** klimatologija 29,4 °C → centralna projekcija 30,6 °C (razlika približno +1,2 °C).

Ove vrijednosti predstavljaju kompozitnu lokalnu klimatologiju i centralnu sintetizovanu projekciju iz navedenih izvora; treba ih čitati kao najvjerovatniji centar raspodjele, a ne kao „tvrdu“ dnevnu prognozu.

Padavine, more, vlažnost i vjetar

Mjesec	Klimatološke padavine	Projektovane padavine	Kišni dani	Pros. RH	Klimatološki SST	Projektovani SST	Ocjena povjerenja
Jun	oko 61 mm	30–65 mm	3–6	oko 68–73 %	oko 22,9 °C	23,2–24,2 °C	srednje
Jul	oko 42 mm	15–45 mm	2–4	oko 64–70 %	oko 25,2 °C	25,5–26,5 °C	srednje-nisko za kišu; visoko za SST
Avgust	oko 55 mm	20–60 mm	2–5	oko 64–70 %	oko 25,6 °C	26,0–27,0 °C	srednje-nisko za kišu; visoko za SST

Tabela 2. Centralne procjene padavina, mora i vlažnosti za jun–avgust 2026.

Za padavine je centralna procjena blago suvlja u odnosu na klimatologiju, ali sa vrlo širokim rasponom, jer je upravo to fizička priroda ljetne obale. Za more je signal mnogo čistiji: proljetni Mediteran 2026. je već bio nenormalno topao, pa je vjerovatniji ishod toplije obalsko more i veći broj noći sa neugodnim temperaturama i visokom tačkom rose, posebno u julu i avgustu.

Pregled mjesečnih padavina — klimatologija u poređenju sa centralnom projekcijom

- **Jun:** klimatologija 61 mm → centralna projekcija približno 48 mm.
- **Jul:** klimatologija 42 mm → centralna projekcija približno 30 mm.

- **Avгуст:** klimatologija 55 mm → centralna projekcija približno 40 mm.

Padavinske vrijednosti treba čitati sa većim oprezom nego temperature: mediteranska sezonska vještina za padavine je ograničena, a jedan olujni događaj može promijeniti mjesečni zbir za 30–80 mm u svega nekoliko sati.

Tekstualna anomalijсka mapa

Područje	Signal temperature JJA 2026	Signal padavina JJA 2026	Komentar
Budvanska obala	iznad normale	normalno do ispod-normale	najjači i najpouzdaniji signal je toplota
Crnogorsko zaleđe	iznad normale	miješovito / konvektivno	lokalni pljuskovi mogu poništiti „sušni“ sezonski signal
Južni i centralni Jadran	toplije more nego normalno	—	povećava sparinu, noćnu nelagodu i potencijal za jače nevrijeme
Širi zapadni Balkan	iznad normale	heterogeno	prostorni kontrasti vjerovatni

Tabela 3. Tekstualna regionalizacija najjačег modelnog signala za JJA 2026.

Ova „mapa“ je tekstualna regionalizacija najjačег modelnog signala, jer puni grafički regionalni izlazi za SEECOF 35 nijesu bili pouzdano dohvatljivi u ovoj sesiji, iako je sam forum za ljeto 2026. javno naveden.

Rizici i praktične implikacije

Najveći vremenski rizik za Budvu u ljeto 2026 nije samo „jedan veoma vruć dan“, nego kombinacija više vrućih dana i toplih noći. Na osnovu toplog sezonskog signala, recentnih Budva/primorskih statistika tropskih noći i već toplog Mediterana, procjenjujem visoku vjerovatnoću najmanje jednog toplotnog vala od najmanje 3 uzastopna dana sa obalskim maksimumima preko 33 °C, te umjerenu vjerovatnoću jedne jače epizode koja lokalno dostiže ili prelazi 35 °C. Posebno je povišen rizik za starije osobe, malu djecu, hronične bolesnike i radnike na otvorenom kada noćno hlađenje oslabi.

Požarni i sušni rizik će vjerovatno rasti kroz sezonu. Evropski i crnogorski izvori naglašavaju da su toplotni valovi, suše i požari sve važniji klimatski rizik za Crnu Goru, a Evropska komisija je nakon ekstremne 2025. godine dodatno pojačala fokus na integrisano upravljanje rizikom od šumskih požara. Iako stanje na Balkanu u kasnom martu i sredinom aprila 2026. nije upućivalo na univerzalnu duboku sušu, dovoljno je 10–15 dana bez značajnije kiše uz visoke temperature da se rizik na primorju brzo podigne na visok, a u zaleđu lokalno i na vrlo visok.

Vjetar u Budvi će ljeti vjerovatno zadržati „poznatu“ jadransku dnevnu strukturu više nego što će imati jasan sezonski anomalijски potpis. Najtipičniji scenarij su slabiji jutarnji vjetrovi, zatim popodnevni maestral / sea breeze iz sektora W–NW, najčešće oko 4–8 m/s, lokalno više u kanalima i pri kanalisanju reljefom; peer-reviewed studije za jugoistočni Jadran pokazuju da termički pogonjene obalske

cirkulacije mogu biti složene i da kanalisani onshore tokovi mogu mjestimično dosežati oko 8 m/s, uz izražene zone konvergencije. Epizode bure (NE–E) i juga / široka (SE–S) neće nestati, ali su kao sezonska anomalija teško predvidive; njihov glavni značaj je za more, talase, nautičku sigurnost i nagle promjene osjećaja sparine.

Za turizam je ovo generalno povoljan outlook u smislu vrlo pouzdane toplote i tople vode, ali uz rastuću potrebu za prilagođavanjem. Za plaže i boravak na otvorenom najbolji termini su vjerovatno rano jutro i kasno popodne; za marine, jedrenje, SUP i izletničke brodove najvažnija će biti dnevna procjena maestrata, tamo gdje je more otvorenije i osjetljivo na lokalno jačanje vjetrova. Za hotelijere i ugostitelje najvažniji operativni rizik nije kiša, nego dugotrajna toplotna nelagoda, veća potrošnja električne energije i potreba za hlađenjem.

Praktične preporuke su kratke. Za javno zdravlje: planirati heat-health režim već od druge polovine juna, ne čekati jul. Za turizam i događaje: predvidjeti hlad, vodu, pomjeranje termina i rezervne „cool-down“ prostore. Za more i nautičke aktivnosti: pratiti dnevne i kratkoročne prognoze, jer će baš tu lokalni vjetrovi i izolovane oluje biti važniji od sezonskog srednjaka. Za požare: tretirati kraj jula i avgust kao period povišenog opreza i ograničiti aktivnosti koje mogu dati iskrpu u suvom rastinju.

Ljeto 2026 — ključni prozori signala i pouzdanosti

Period	Ključni signal i pouzdanost
Maj 2026	ENSO-neutralno stanje, ali El Niño watch i brzo zagrijavanje Pacifika.
Jun 2026	Najpouzdaniji signal je iznadprosječna toplota; početak brzog isušivanja goriva.
Jul 2026	Najveći rizik za toplotne valove, tropske noći i deficitarne padavine.
Avgust 2026	More najtoplije; i dalje vrlo toplo, uz mogućnost lokalnih konvektivnih oluja.
Septembar 2026	Veća varijabilnost i prva ozbiljnija šansa za promjenu režima.

Tabela 4. Vremenska osa prikazuje razvoj sezonskog rizika, a ne preciznu sinoptičku prognozu.

Vremenska osa prikazuje razvoj sezonskog rizika, a ne preciznu sinoptičku prognozu. U praksi će dnevne i sedmične oscilacije zavisiti od kratkoročnih obrazaca koji se ne mogu pouzdano zaključiti na početku maja.

Otvorena pitanja i ograničenja

Najvažnije otvoreno pitanje ostaje padavinski režim u avgustu. Budva je u recentnim službenim nizovima pokazala i vrlo suv avgust 2024., i vrlo moker avgust 2023., što jasno pokazuje koliko jedan ili dva događaja mogu promijeniti mjesečni bilans. Drugo ograničenje je da puni tekst SEECOF 35 ljetnog konsenzusa za 2026. nije bio pouzdano izvučiv, iako je forum javno naveden; zbog toga je ova analiza više oslonjena na globalno-regionalni skup službenih izvora nego na jedan jedini regionalni konsenzusni PDF. Treće, za Budvu ne postoji javno lako dostupna, jedinstvena službena tabela svih lokalnih normala, pa su apsolutni dnevni high/low, vlažnost i more procijenjeni kompozitno. Nijedno od tih ograničenja, međutim, ne mijenja glavni zaključak: Budva za ljetno 2026. ima vjerovatniji ishod

toplijeg nego normalnog, uz toplije more i povećan rizik od toplotnog stresa, dok je padavinski signal manje pouzdan i vjerovatno slabije sušan nego što je temperaturni signal topao.