

Terceira Lista de Exercícios: O Método de Monte Carlo

Exercício 1. Um dado equilibrado é lançado 2 vezes e os números obtidos nos dois lançamentos são registrados. Estime, via MC, a seguinte probabilidade: a soma dos dois resultados é 7 ou 11.

Exercício 2. Considere quatro urnas com as seguintes configurações: a urna I contém 8 bolas pretas, 3 brancas e 4 vermelhas; a urna II contém 3 bolas pretas, 5 brancas e 7 vermelhas; a urna III contém 4 bolas pretas, 3 brancas e 2 vermelhas; a urna IV contém 2 bolas pretas, 1 bola branca e 8 bolas vermelhas. Lançam-se dois dados equilibrados. Se a soma for menor do que 4, uma bola da urna I é retirada; se a soma for maior ou igual do que 4 e menor do que 7, então uma bola da urna II é retirada; se a soma for 7, então uma bola da urna III é retirada; caso contrário, uma bola da urna IV é retirada. Estime, via MC, a probabilidade da bola retirada ser vermelha.

Exercício 3. Vovó Juju e seu neto Jorel estão apostando num jogo de cara ou coroa. Uma moeda é lançada: se sair cara, Vovó Juju vence e recebe 1 real de Jorel; se sair coroa, Jorel vence e Vovó Juju paga 1 real para seu neto. No início do jogo, Vovó Juju tem 18 reais e Jorel tem 7 reais. O jogo termina quando algum dos jogadores perde todo o seu dinheiro. Estime, via Monte Carlo, a probabilidade de Vovó Juju terminar o jogo sem dinheiro.

Exercício 4. No jogo de *Craps* dois dados são lançados:

- se a soma for 7 ou 11, então você ganha o jogo;
- se a soma for 2,3 ou 12, então você perde o jogo;
- caso contrário, os dois dados são rolados novamente até obter-se 7 (você perde) ou até obter-se a soma inicial (você ganha).

Estime, via MC, a probabilidade de você vencer o jogo de Craps.

Exemplo: as seguintes sequências (cada entrada é a soma dos dois dados) resultam em vitória: (9), (11), (5, 4, 5), (4, 5, 6, 12, 4); as seguintes sequências resultam em derrota: (2), (4, 11, 7), (8, 5, 2, 3, 9, 7).

Exercício 5. Considere o seguinte jogo: Jim e Dwight escolherão, cada um, uma sequência de tamanho 3 em que cada entrada da sequência é cara ou coroa; logo em seguida, uma moeda será lançada até que apareça a sequência que um dos dois escolheu; se aparecer primeiro a sequência de Jim, ele ganha; se aparecer primeiro a sequência de Dwight, ele vence. Convencione que cara

seja 1 e que coroa seja zero. Supondo que Dwight escolheu a sequência (0, 1, 0) e que Jim escolheu a sequência (0, 0, 1), estime através do Método de Monte Carlo a probabilidade de Jim vencer.

Observação: as sequências (0, 1, 0), (1, 0, 1, 0) e (1, 1, 0, 1, 0) deixam Dwight vitorioso; as sequências (0, 0, 1), (0, 0, 0, 1) e (1, 0, 0, 0, 1) deixam Jim vitorioso.

Exercício 6. Luke Skywalker está na origem de uma reta. Um esboço da situação pode ser visto na Figura 1. Luke lança uma moeda honesta; se sair coroa, ele dá um passo para a esquerda (e termina na posição -1 da reta); se sair coraa, ele dá um passo para a direita (e termina na posição 1 da reta). Suponha que no primeiro lançamento tenha saído cara. Aí, agora na posição 1, ele lança novamente a moeda: se cara, um passo para a direita; se coroa um passo para a esquerda. Suponha que novamente tenha saído cara. Na posição 2 da reta ele irá jogar novamente a moeda e irá proceder da mesma forma que nos dois passos anteriores e assim sucessivamente. Estime via Monte Carlo a probabilidade de Luke retornar à origem depois de: (i) 4 passos; (ii) 6 passos; (iii) 10 passos; (iv) 20 passos.




Figura 1: Passeio aleatório simétrico na reta.

Exercício 7. Utilize o método de MC para estimar as seguintes integrais:

$$\int_{-1}^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \quad \text{e} \quad \int_0^{\pi} \cos^2(x) dx.$$