

Dr.ssa Patrizia Bigo

**Ex-Primario Medicina Interna II Ospedale Birago di Vische e
Medicina per Intensità di Cure Ospedale Maria Vittoria di Torino
Ex-Direttore Servizio Allergologia e Immunologia Clinica ASL Città
di Torino**

Ex-Coordinatore del Dipartimento Medico Ex ASLT02

Specialista in Medicina Interna

Specialista in Allergologia

Specialista in Immunologia Clinica

Studio: Studio: C.so Francia 212 Torino

Mail: patrizia.bigo@libero.it

Cell. 3498647654

Sig. De Bartolomeo Fabrizio

Nato a Agropoli (SA) il 18.07.1985

Residente a Torino Cso Montecucco 101 Tf. 3283285546

CF:DBRFRZ85L18A091I

Anamnesi Familiare:

- Patologia atopica: mamma atopica
- Patologia autoimmune: negativa

Anamnesi patologica remota:

Da età pediatrica oculorinite e asma per cui fa test con sensibilizzazione a acari e graminacee. Negli anni successivi miglioramento dei sintomi ed assenza di asma

2009 in seguito a reazione cutanea allergica tipo SOA a ingestione di mandorle e/o sesamo fa test allergologici per inalanti e mandorla: sensibilizzazione a acari graminacee e gatto. Fatto prick by prick con mandorle positivo non testato il sesamo

A età di circa 12 aa reazione cutanea dopo assunzione di zimox
Riferisce di tollerare zirtec che ha nei componenti macrogol:
PRESENTE NEL VACCINO PFIZER

Anamnesi patologica prossima:

Attualmente assume mandorle senza problemi ma non il sesamo. Non problemi con altri alimenti. Attualmente riferisce comparsa di asma solo sporadicamente in presenza di ambienti molto polverosi oppure di alcuni gatti particolari.

Utile eseguire i seguenti accertamenti a completamento:

- dosaggio IgE totali
- ALEX TEST x ricerca IgE specifiche (istituto Malpighi Chivasso)
- IgE specifiche per antibiotici betalattamici: (C1. C2 C5 C6 C7)

CONCLUSIONI:

**Rinocongiuntivite + asma sporadica atopica in polisensibilizzato
Progressa reazione allergica a amoxicillina mai indagata
Allergia alimentare da rivalutare con RAST**

Il paziente tollera zirtec co per cui può fare vaccino x COVID
Pfizer in ambiente ospedaliero e previa terapia anti allergica con
zirtec 1 co la sera 2-3 giorni prima e dopo la I e II dose di
vaccino

Cordiali saluti

Dr.ssa Patrizia Bigo

Torino 28.05.2021

