SST1 Übungsstunde 5

Matteo Dietz

October 2026

Themenüberblick

- **Graphische Faltung und Systemeigenschaften**
  Repetition

- **Verallgemeinerte Funktionen:**
  Funktionale
  $\delta-$Funktion und ihre Eigenschaften
  Ableitung verallgemeinerter Funktionen

Aufgaben für diese und nächste Woche

48, **49**, **50**, **51**, 52, 53, **54**, **55**

Die **fettgedruckten** Übungen empfehle ich, weil sie wesentlich zu eurem Verständnis der Theorie beitragen und/oder sehr prüfungsrelevant sind.

Graphische Faltung: Kochrezept

Ziel: Wir wollen $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau)h(\tau)\mathrm{d}\tau$ berechnen.

1) $x(\tau)$ spiegeln um $\tau = 0$, um $x(-\tau)$ zu erhalten.
2) Das gespiegelte $x(\tau)$ um t verschieben.
   - nach rechts für $t > 0$ $\implies x(t-\tau) = x(-(\tau - t))$
   - nach links für $t < 0$
3) Das gespiegelte & verschobene $x(\tau)$ mit $h(\tau)$ multiplizieren.
   $\implies x(t-\tau)h(\tau)$
4) Integrieren & den Wert von $y(t)$ bei t eintragen.
5) Zurück zu 2) mit neuem t.

Graphische Faltung: Hinweise

Hinweise: Vergesst nicht, dass die Faltung kommutativ ist, d.h.

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau)h(\tau)\mathrm{d}\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

Spiegelt und verschiebt das einfachere Signal und fixiert das kompliziertere!

Zusammenfassung: Eigenschaften der Impulsantwort

Kausalität

Das LTI-System ist kausal $\Leftrightarrow h(t) = 0$ für $t < 0$.

Gedächtnislosigkeit

Das LTI-System H ist gedächtnislos $\Leftrightarrow$

$$y(t) = (Hx)(t) = \alpha x(t), \quad \alpha \in \mathbb{C} \Leftrightarrow h(t) = \alpha\delta(t)$$


BIBO-Stabilität

Wenn $h \in L^1$, dann ist das LTI-System BIBO-stabil.

Aufgabe 45


Verallgemeinerte Funktionen: Funktionale

- **Definition:** Ein **Funktional** ist eine Funktion, deren Definitionsmenge eine Teilmenge eines linearen Raumes X ist und deren Zielmenge aus Skalaren besteht.



Funktionale

- $\varphi(t) \geq 0 \quad \forall t$
- $\varphi(t) = 0 \quad \forall t \notin [a, b]$
- $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\, dt = 1$




- **Mittelwertsatz** der Integration:

$$\exists \xi \in [a, b], \text{ sodass } \ell_x(\varphi) = \int_a^b \varphi(t)x(t)dt = x(\xi) \int_a^b \varphi(t)dt$$

Deltafolgen

- Eine Deltafolge $\delta_n(t)$ hat folgende Eigenschaften:


1. $\delta_n(t) \begin{cases} \geq 0, & \forall t \in I_n = [a_n, b_n] \\ = 0, & \forall t \notin I_n \end{cases}$



Deltafolgen


2. Die Intervalle I_n bilden eine **Intervallverschachtelung** für $t_0 \in \mathbb{R}$, d.h. die Intervalle, auf denen $\delta_n(t) \geq 0$ werden immer schmäler: $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq t_0 \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = t_0$$




Deltafolgen

3. **Normierung**: $\forall n$ gilt $\int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(t)\mathrm{d}t = \int_{a_n}^{b_n} \delta_n(t)\mathrm{d}t = 1$



Deltafolgen



Dirac-Delta

- Wir nehmen den Grenzwert für $n \to \infty$ und erhalten die **Dirac-Delta** "Funktion":

$$\delta_{t_0}(t) := \lim_{n\to\infty} \delta_n(t) \begin{cases} \to \infty, & t = t_0 \\ = 0, & t \neq t_0 \end{cases} = \delta(t - t_0)$$

- Eigenschaften: Breite 0, Höhe $\to \infty$ und Fläche 1

Deltafunktion


- Wir betrachten die Funktion:

$$\delta(t,\varepsilon) = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon} & |t| \leq \varepsilon \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- $\ell_x(\delta(t,\varepsilon)) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t,\varepsilon)\mathrm{d}t = x(\xi)\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(t,\varepsilon)\mathrm{d}t = x(\xi)$

- Wir lassen $\varepsilon \to 0$, dann $\xi \to 0$ und somit $\lim_{\varepsilon\to 0} \ell_x(\delta(t,\varepsilon)) = x(0)$. Man schreibt $\delta(t) = \lim_{\varepsilon\to 0} \delta(t,\varepsilon)$

Deltafunktion



$$\implies \delta(t)x(t) = \delta(t)x(0), \quad \text{dann}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} x(0)\delta(t)\mathrm{d}t = x(0)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\mathrm{d}t = x(0)$$

Eigenschaften der Deltafunktion

1. **Symmetrie**:
   $\delta(t) = \delta(-t)$
   $\delta(t - t_0) = \delta(t_0 - t)$

2. **Multiplikation mit einer Funktion**:
   $x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$
   $x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$

Eigenschaften der Deltafunktion

3. **Siebeigenschaft**:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)x(t)\mathrm{d}t = x(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)x(t)\mathrm{d}t = x(t_0)$$

Eigenschaften der Deltafunktion

4. **Verschiebung/Skalierung des Parameters**:

$$\delta(at + b) = \frac{1}{|a|}\delta\left(t + \frac{b}{a}\right)$$

Eigenschaften der Deltafunktion

5. **Die $\delta-$Funktion ist das Einselement der Faltung**:

$$(x * \delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-\tau)\delta(\tau)\mathrm{d}\tau = x(t)$$

$$(x * \delta(\cdot - t_0))(t) = x(t - t_0)$$

Eigenschaften der Deltafunktion

6. **Einheitssprungfunktion**:

$$\int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\mathrm{d}\tau = \sigma(t)$$

Ableitung verallgemeinerter Funktionen

- **Notation**:

  $D =$ Ableitungsoperator

  $x'(t) =$ konventionelle Definition der Ableitung einer stetigen, differenzierbaren Funktion (Vgl. Analysis 1)

  $t_0 =$ eine Sprungstelle von $x(t)$

$$(Dx)(t) = x'(t) + (x(t_0^+) - x(t_0^-))\delta(t - t_0)$$

Bemerkung

- Impulsantwort $h(t) := (H\delta)(t)$
- Sprungantwort $a(t) := (H\sigma)(t)$

Da $\dfrac{\mathrm{d}\sigma(t)}{\mathrm{d}t} = \delta(t)$ haben wir $\dfrac{\mathrm{d}a(t)}{\mathrm{d}t} = h(t)$

Aufgaben

- **Aufgabe 50**
- **Aufgabe 51**