

1. Теория чисел

1.1 Делимость и ее свойства:

В этом параграфе все числа целые, если иного не оговорено.

Definition 1. Число a делится на число $b \neq 0$ ($a : b$), если существует такое число c , что $a = b \cdot c$. В этом случае говорят, что b — делитель числа a .

Базовые факты, связанные с делимостью:

1. $a : m$ и $b \implies (a \pm b) : m, ab : m$.
2. $a : m$ и $b : m \implies \forall k, l \in \mathbb{Z} (ka \pm lb) : m$
3. $a : m$ и $b \not: m \Leftrightarrow (a \pm b) \not: m \implies (a \pm b) \not: m$
4. $a : m$ и $m : k \implies a : k$

Доказательство. Всё это доказывается как-то так:

$$a : m \Leftrightarrow a = q \cdot m, q \in \mathbb{Z}, b : m \Leftrightarrow b = p \cdot m, p \in \mathbb{Z} \Rightarrow a \pm b = q \cdot m \pm p \cdot m = m \cdot (p + q) \Leftrightarrow (a \pm b) : m$$

□

Example 1. Найдите все такие натуральные числа a , что $\frac{2a+1}{a-2}$ — целое число.

Решение: $\frac{2a+1}{a-2} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow (2a+1) : (a-2)$, а значит и разность этих чисел делится на $(a-2)$.

То есть, $((2a+1) - (a-2)) : (a-2) \Leftrightarrow (a+3) : (a-2)$.

Кроме того, разность этого числа и $(a-2)$ также должна делиться на $(a-2)$, то есть $((a+3) - (a-2)) : (a-2) \Leftrightarrow 5 : (a-2)$.

То есть, $(a-2)$ — делитель числа 5, а значит он может быть равен 1, -1, 5, -5. Переберем все случаи, так как их не так много:

1. $a - 2 = -1 \Leftrightarrow a = 1$. $\frac{2a+1}{a-2} = \frac{2+1}{1-2} = -3 \in \mathbb{Z}$, а значит $a = 1$ подходит.
2. $a - 2 = 1 \Leftrightarrow a = 3$. $\frac{2a+1}{a-2} = \frac{6+1}{3-2} = 7 \in \mathbb{Z}$, а значит $a = 3$ подходит.
3. $a - 2 = -5 \Leftrightarrow a = -3$, но $a \in \mathbb{N}$, а значит этот случай не подходит.
4. $a - 2 = 5 \Leftrightarrow a = 7$. $\frac{2a+1}{a-2} = \frac{14+1}{7-2} = 3 \in \mathbb{Z}$, а значит $a = 7$ подходит.

Ответ: $\{1, 3, 7\}$.

Свойства четных и нечетных чисел:

1. Сумма двух последовательных натуральных чисел — нечетное число.
2. Сумма четного и нечетного чисел — нечетное число.
3. Сумма любого количества четных чисел — четное число.
4. Сумма четного количества нечетных чисел — четное число, в то время как сумма нечетного количества нечетных чисел — нечетное число.
5. Произведение двух последовательных натуральных чисел — четное число.

Theorem 1. Произведение двух последовательных чисел делится на 2

Example 2. В ряд выписаны числа от 1 до 10. Можно ли расставить между ними знаки «+» и «-» так, чтоб значение полученного выражения было равно нулю?

Решение:

Среди чисел от 1 до 10 имеется ровно 5 нечетных чисел, а значит, их сумма, вне зависимости от того, с каким знаком их брать, будет нечетным числом, а значит и сумма всех чисел будет нечетным числом. То есть, нулем она быть не может, так как ноль - четное число.

Ответ: нет.

Definition 2. Число $p \in \mathbb{N}$ называется простым, если $p > 1$ и p не имеет положительных делителей, отличных от 1 и p .

Statement 1. Если p_1 и p_2 — простые числа и $p_1 \mid p_2$, то $p_1 = p_2$.

Theorem 2 (Евклид). Множество простых чисел счетно.

Доказательство. Будет добавлено. □

Definition 3. Натуральное число $n\mathbb{Z}$ называется составным, если оно имеет хоть один положительный делитель, отличный от 1 и n .

Remark 1. Число 1 не является ни простым, ни составным.

1.1.1 Деление с остатком

Definition 4. Пусть a и $b \neq 0$ — два целых числа. Разделить число a на число b с остатком — значит найти такие целые числа q и r , что выполнены следующие условия:

1. $a = bq + r$
2. $0 \leq r < |b|$

При этом число q называется неполным частным, а число r — остатком от деления числа a на b .

Theorem 3. Для любых $a, b \in \mathbb{Z}$ существуют единственные $q, r \in \mathbb{Z}$, $0 \leq r < |b|$, что $a = bq + r$.

Доказательство. Будет написано. □

Corollary 1. Пусть $m \in \mathbb{N}$, $m > 1$. Каждое целое число при делении на m даёт некоторый остаток, причем остатков ровно m . Это могут быть числа $0, 1, \dots, m-1$.

Рассмотрим некоторые элементарные методы вычисления остатка.

Theorem 4. Сумма (произведение) чисел a и b дает тот же остаток при делении на число m , что и сумма (произведение) остатков чисел a и b при делении на число m .

Example 3. Найдите остаток числа 2^{2012} при делении на 3.

Решение:

Заметим, что $2^{2012} = 4^{1006}$. Число 4 дает остаток 1 при делении на 3, а значит по теореме выше (о произведении остатков), 4^k даст остаток $1^k = 1$.

Ответ: 1.

1.1.2 Сравнения по модулю

Definition 5. Если целые числа a и b при делении на натуральное число m дают равные остатки, то говорят, что a сравнимо с b по модулю m и пишут $a \equiv b \pmod{m}$. Иначе говоря, такая запись означает, что $(a - b)$ делится на m .

При помощи таких обозначений громоздкое предложение « a дает остаток b при делении на c » теперь можно записать, как $a \equiv b \pmod{c}$.

На мой взгляд, работать с остатками в целом гораздо проще при помощи сравнений по модулю. У сравнений есть множество полезных свойств, рассмотрим самые основные:

Основные свойства сравнений по модулю:

1. Арифметические действия:

$$\begin{cases} a \equiv b \pmod{m} \\ c \equiv d \pmod{m} \end{cases} \implies \begin{cases} (a \pm c) \equiv (b \pm d) \pmod{m} \\ a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m} \end{cases}$$
2. Возведение в степень:

$$a \equiv b \pmod{m} \implies a^k \equiv b^k \pmod{m}$$
3. Перенос в другую часть равенства:

$$(a + b) \equiv c \pmod{m} \implies a \equiv (c - b) \pmod{m}$$
4. Транзитивность:

$$\begin{cases} a \equiv b \pmod{m} \\ b \equiv c \pmod{m} \end{cases} \implies a \equiv c \pmod{m}$$

Доказательство. Будет добавлено.

□

Statement 2. Сравнимость по модулю — отношение эквивалентности.

Доказательство. Будет добавлено.

□

1.2 Десятичная запись числа. Признаки делимости.

Definition 6. Любое натуральное число представимо в виде:

$$n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_0} = a_k \cdot 10^k + a_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \dots + a_0$$

Такая запись называется десятичной записью числа n .

Example 4. Двухзначное число умножили на произведение его цифр, в результате чего получилось трехзначное число, состоящее из одинаковых цифр, совпадающих с последней цифрой исходного числа. Найдите исходное число.

Решение: Обозначим исходное двухзначное число за \overline{ab} .

Теперь мы можем переписать условие задачи в виде уравнения:

$$\overline{ab} \cdot (ab) = \overline{bbb} \Leftrightarrow (10a + b) \cdot ab = 100b + 10b + b \Leftrightarrow 10a^2b + ab^2 = 111b$$

Ясно, что при $b = 0$ условие не выполняется. Если $b \neq 0$, то на него можно поделить обе части:

$$10a^2 + ab = 111 \Leftrightarrow ab = 111 - 10a^2$$

Так как $ab > 0$, $10a^2 < 111$, а значит a либо 1, либо 2, либо 3. Рассмотрим случаи по порядку.

- Если $a = 1$, $b = 101$, а это невозможно, так как b — цифра.
- Если $a = 2$, $b = \frac{71}{2}$, а это невозможно, так как b — цифра.
- Если $a = 3$, $b = 7$. Тогда, искомое число — 37.

Ответ: 37.

Example 5. Найдите все натуральные числа, являющиеся степенью двойки, при зачеркивании первой цифры у которых получается число, также являющееся степенью двойки.

Решение: Пусть мы зачеркнули первую цифру числа 2^n , состоящего из $k+1$ цифр. Тогда $10^k < 2^n < 10^{k+1}$, $10^{k-1} < 2^m < 10^k$, а значит $\frac{1}{10^k} < \frac{1}{2^m} < \frac{1}{10^{k-1}}$.

Если перемножить первое и третье неравенства, то получится, что $1 < 2^{n-m} < 10^2 \iff 0 < n-m < 8$.

Так как цифру заканчивали слева, 2^n и 2^m заканчиваются на одну и ту же цифру, а значит:

$$2^n - 2^m \equiv 0 \pmod{10} \Leftrightarrow 2^m(2^{n-m} - 1) \equiv 0 \pmod{10} \Leftrightarrow 2^{n-m} - 1 \equiv 0 \pmod{5} \Leftrightarrow 2^{n-m} \equiv 1 \pmod{5}$$

Рассмотрим таблицу остатков от деления 2^n на 5:

2^n	2	4	8	16	32	64	128	...
Остаток от деления 2^n на 5	2	4	3	1	2	4	3	...

Учитывая при этом $1 < n-m < 8$, $n-m=4 \Leftrightarrow m=n-4$.

Обозначим зачеркнутую цифру числа 2^n за a . Тогда

$$2^n - a \cdot 10^k = 2^{n-4} \Leftrightarrow 2^{n-4} \cdot (2^4 - 1) = a \cdot 10^k \Leftrightarrow 2^{n-4} \cdot 3 \cdot 5 = a \cdot 2^k \cdot 5^k$$

Так как в левой части всего одна пятерка, $k=1$, а значит, искомое число двузначное.

Перебирая все двузначные степени двойки, понимаем, что подходят числа 32 и 64.

Ответ: 32, 64.

Признаки делимости натуральных чисел:

Theorem 5. (Признак делимости на 5)

Число a делится на 5 тогда и только тогда, когда последние цифры десятичной записи числа a — это 0 или 5.

Доказательство. Будет добавлено. □

Theorem 6. (Признак делимости на 3 и на 9)

Число $a \in \mathbb{Z}$ даёт такой же остаток от деления на 3 (и на 9), что и сумма цифр числа a .

Доказательство. Пусть $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1}$ — десятичная запись данного числа a , то есть

$$a = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1} = a_n \cdot 10^{n-1} + a_{n-1} \cdot 10^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 10^0$$

Так как $10 \equiv 1 \pmod{3}$, $10^i \equiv 1^i \pmod{3} \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow a_i \cdot 10^{i-1} \equiv a_i \pmod{3}$.

Применим это к каждому слагаемому и сложим все, получим:

$$a_n \cdot 10^{n-1} + a_{n-1} \cdot 10^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 10^0 \equiv (a_n + a_{n-1} + \dots + a_2 + a_1) \pmod{3}$$

Так как $10 \equiv 1 \pmod{9}$, аналогичное доказательство проходит и для 9. □

Example 6. Два числа отличаются перестановкой цифр. Может ли их разность быть равной 20072008?

Решение:

Как мы помним, сумма цифр числа дает тот же остаток от деления на 9, что и само число. Значит, разность описанных в условии задачи чисел должна делиться на 9, так как у этих чисел одинаковая сумма цифр:

Пусть первое число - a , $a \equiv c \pmod{9}$, второе число b , $b \equiv c \pmod{9}$.

$$\begin{cases} a \equiv c \pmod{9} \\ b \equiv c \pmod{9} \end{cases} \implies a - b \equiv c - c \pmod{9} \iff a - b \equiv 0 \pmod{9} \iff (a - b) : 9.$$

Но, $20072008 \not\equiv 9$, а значит это невозможно.

Theorem 7. (Признаки делимости на 4 и на 8) Число делится на 4 тогда и только тогда, когда две его последние цифры составляют число, которое делится на 4. Число делится на 8 тогда и только тогда, когда три его последние цифры составляют число, которое делится на 8.

Доказательство. Будет дописано. □

Theorem 8. (Признак делимости на 11) Число делится на 11 тогда и только тогда, когда разность суммы цифр, стоящих на нечетных местах и суммы цифр, стоящих на четных местах, делится на 11.

Доказательство. Будет дописано. □

Example 7. Рассмотрим число 305792608. $(8 + 6 + 9 + 5 + 3) - (0 + 2 + 7 + 0) = 22 : 11$, а значит $305792608 : 11$.

Example 8. На доске написано такое число: $72x3y$, где x и y - некоторые цифры. Замените звездочки цифрами так, чтобы полученное число делилось на 45.

Решение: Так как число должно делиться на 45, оно должно делиться на 5 и на 9 соответственно. Так как оно делится на 5, его последняя цифра либо 0, либо 5, а значит либо $y = 0$, либо $y = 5$. Так как число делится на 9, сумма его цифр должна делиться на 9. Рассмотрим сумму цифр числа:

$$(7 + 2 + x + 3 + y) : 9 \iff (x + y + 12) : 9$$

$y = 5$: $(x + 17) : 9$, а значит $x = 1$.

$y = 0$ $(x + 12) : 9$, а значит $x = 6$.