

Hoffmann Referenzbereich-Analyse


Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

CK gesamt (CK) — weiblich, 9 Jahre – 14 Jahre (U/l) Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)

Gruppe: weiblich, 9 Jahre – 14 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:36:00 · n = 432 Messwerte

Hoffmann-Plot: CK gesamt (CK) — weiblich, 9 Jahre – 14 Jahre (U/l)



Ergebnisse: CK gesamt (CK) — weiblich, 9 Jahre – 14 Jahre (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	432
Minimum	22,00 U/l
Maximum	3.285,00 U/l
Median	101,50 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	103,06 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,600 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	10,13 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	99.5%
Verwendeter Bereich	360 von 432 Werten (5.3 % – 88.7 %)


Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

41,05 – 258,76
U/l

Regression: $z = 2,12904 \cdot x - 9,86869$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): CK gesamt (CK) — weiblich, 9 Jahre – 14 Jahre (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.