

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Gesamteiweiß (GES) — 18 Jahre – 65 Jahre (g/dl)

Gruppe: 18 Jahre – 65 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:38:22 · n = 2174 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Gesamteiweiß (GES) — 18 Jahre – 65 Jahre (g/dl)



Ergebnisse: Gesamteiweiß (GES) — 18 Jahre – 65 Jahre (g/dl)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	2174
Minimum	30,60 g/dl
Maximum	101,80 g/dl
Median	69,80 g/dl
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	72,23 g/dl
Geschätzte Standardabweichung (σ)	14,99 g/dl
Variationskoeffizient (CV%)	20,76 %
Anpassungsgüte (R^2)	99.9%
Verwendeter Bereich	706 von 2174 Werten (5.0 % – 37.4 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

42,84 – 101,61


g/dl

Regression: $z = 0,06670 \cdot x - 4,81726$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Gesamteiweiß (GES) — 18 Jahre – 65 Jahre (g/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.