

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Gamma - GT (GGT) — 15 Tage – 1 Jahre (U/l)

Gruppe: 15 Tage – 1 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:36:34 · n = 566 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Gamma - GT (GGT) — 15 Tage – 1 Jahre (U/l)



Ergebnisse: Gamma - GT (GGT) — 15 Tage – 1 Jahre (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	566 (2 ≤ 0 ausgeschlossen)
Minimum	1,00 U/l
Maximum	951,00 U/l
Median	33,00 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	37,18 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	3,432 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	34,11 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R²)	98.6%
Verwendeter Bereich	510 von 566 Werten (4.9 % – 95.1 %)


Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)
3,32 – 416,98
U/l

Regression: $z = 0,81087 \cdot x - 2,93200$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

R² < 0,99: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Gamma - GT (GGT) — 15 Tage — 1 Jahre (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.