

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Harnstoff (HST) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mg/dl)


Gruppe: weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:37:22 · n = 30748 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren
(1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Harnstoff (HST) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mg/dl)



Ergebnisse: Harnstoff (HST) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mg/dl)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	30748
Minimum	0,00 mg/dl
Maximum	502,00 mg/dl
Median	35,00 mg/dl
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	34,15 mg/dl
Geschätzte Standardabweichung (σ)	13,59 mg/dl
Variationskoeffizient (CV%)	39,80 %
Anpassungsgüte (R^2)	98.3%
Verwendeter Bereich	15823 von 30748 Werten (6.3 % – 57.8 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

7,51 – 60,79
mg/dl


Regression: $z = 0,07357 \cdot x - 2,51236$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Harnstoff (HST) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mg/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.