

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Gamma - GT (GGT) — 6 Jahre – 15 Jahre (U/l)

Gruppe: 6 Jahre – 15 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:30:21 · n = 5608 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Gamma - GT (GGT) — 6 Jahre – 15 Jahre (U/l)



Ergebnisse: Gamma - GT (GGT) — 6 Jahre – 15 Jahre (U/l)


Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	5608 (1 ≤ 0 ausgeschlossen)
Minimum	1,00 U/l
Maximum	725,00 U/l
Median	15,00 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	15,26 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,422 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	12,91 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R²)	99.1%
Verwendeter Bereich	4500 von 5608 Werten (5.9 % – 86.1 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)
7,66 – 30,41
U/l

Regression: $z = 2,84266 \cdot x - 7,74665$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Gamma - GT (GGT) — 6 Jahre – 15 Jahre (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.