

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Harnstoff (HST) — 1 Jahre – 10 Jahre (mg/dl)

Gruppe: 1 Jahre – 10 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:30:55 · n = 2614 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Harnstoff (HST) — 1 Jahre – 10 Jahre (mg/dl)




Ergebnisse: Harnstoff (HST) — 1 Jahre – 10 Jahre (mg/dl)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	2614
Minimum	2,00 mg/dl
Maximum	321,00 mg/dl
Median	29,00 mg/dl
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	29,13 mg/dl
Geschätzte Standardabweichung (σ)	9,20 mg/dl
Variationskoeffizient (CV%)	31,59 %
Anpassungsgüte (R^2)	99.1%
Verwendeter Bereich	1985 von 2614 Werten (5.0 % – 80.9 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)
11,09 – 47,17
mg/dl
Regression: $z = 0,10866 \cdot x - 3,16549$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Harnstoff (HST) — 1 Jahre – 10 Jahre (mg/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.