

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Alkalische Phosphatase (AP) — männlich, 3 Jahre – 6 Jahre (U/l)


Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Gruppe: männlich, 3 Jahre – 6 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:21:07 · n = 338 Messwerte

Hoffmann-Plot: Alkalische Phosphatase (AP) — männlich, 3 Jahre – 6 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Alkalische Phosphatase (AP)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	338
Minimum	67,80 U/l
Maximum	1.831,00 U/l
Median	242,15 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	239,61 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,324 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	5,13 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	99.7%
Verwendeter Bereich	294 von 338 Werten (6.8 % – 93.8 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

138,19 – 415,46

U/l

Regression: $z = 3,56120 \cdot x - 19,51190$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Alkalische Phosphatase (AP) — männlich, 3 Jahre – 6 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse
Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.