

Hoffmann Referenzbereich-Analyse


Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

CK gesamt (CK) — männlich, 9 Jahre – 14 Jahre (U/l)

Gruppe: männlich, 9 Jahre – 14 Jahre
Erstellt am 20.5.2026, 11:21:46 · n = 335 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: CK gesamt (CK) — männlich, 9 Jahre – 14 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Passwort

Anmelden

Ergebnisse: CK gesamt

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	335
Minimum	11,00 U/l
Maximum	13.565,00 U/l
Median	113,00 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	113,74 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,595 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	9,86 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	99.8%
Verwendeter Bereich	244 von 335 Werten (4.8 % – 77.6 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

45,55 – 284,03


U/l

Regression: $z = 2,14165 \cdot x - 10,13836$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_j = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): CK gesamt (CK) — männlich, 9 Jahre – 14 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression verwendete Bereich ist dargestellt. Die Referenzgrenzen liegen bei $\pm 1,96$ SD.