

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Ferritin (FERR) — 1 Jahre – 5 Jahre (µg/l)

Gruppe: 1 Jahre – 5 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:22:06 · n = 397 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Ferritin (FERR) — 1 Jahre – 5 Jahre (µg/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Ferritin (FERR)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	397
Minimum	1,60 µg/l
Maximum	854,80 µg/l
Median	31,80 µg/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (µ)	32,87 µg/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,777 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	29,25 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R²)	99.2%

Verwendeter Bereich 347 von 397 Werten (4.8 % – 92.2 %)

95. – 97.5. Perzentile)

4,44 – 243,42

µg/l

Regression: $z = 0,97891 \cdot x - 3,41888$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Ferritin (FERR) — 1 Jahre – 5 Jahre (µg/l)



Hoffmann Referenzanalyse
Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression verwendete Bereich ist dargestellt. Die Referenzgrenzen sind bei 1,96 SD.