

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Gamma - GT (GGT) — 15 Tage – 1 Jahre (U/l)

Gruppe: 15 Tage – 1 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:22:22 · n = 566 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Gamma - GT (GGT) — 15 Tage – 1 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Gamma - GT

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	566 (2 ≤ 0 ausgeschlossen)
Minimum	1,00 U/l
Maximum	951,00 U/l
Median	33,00 U/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	37,18 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	3,432 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	34,11 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	98.6%

Verwendeter Bereich 510 von 566 Werten (4.9 % – 95.1 %)

95. – 97.5. Perzentile)

3,32 – 416,98

U/l


Regression: $z = 0,81087 \cdot x - 2,93200$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzlinien ggf. nachkorrigieren.


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Gamma - GT (GGT) — 15 Tage — 1 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.