

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Gamma - GT (GGT) — 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)

Gruppe: 15 Jahre – 18 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:22:28 · n = 3186 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Gamma - GT (GGT) — 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)




Ergebnisse: Gamma - GT

Deskriptive Statistik (Rohdaten)		Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Anzahl Messwerte (n)	3186	Geschätzter Mittelwert (μ)	17,78 U/l (geom.)
Minimum	3,00 U/l	Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,461 (geom. SD, Faktor)
Maximum	518,00 U/l	Variationskoeffizient (CV%)	13,17 % (log-Skala)
Median	18,00 U/l	Anpassungsgüte (R^2)	99.2%
		Verwendeter Bereich	2390 von 3186 Werten (5.1 % – 80.1 %)


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Gamma - GT (GGT) — 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse
Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.