

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


GOT (AST) (GOT) — 1 Jahre – 6 Jahre (U/l)

Gruppe: 1 Jahre – 6 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:22:38 · n = 1928 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: GOT (AST) (GOT) — 1 Jahre – 6 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: GOT (AST) (GOT) — 1 Jahre – 6 Jahre (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)		Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Anzahl Messwerte (n)	1928	Geschätzter Mittelwert (μ)	34,81 U/l (geom.)
Minimum	2,90 U/l	Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,385 (geom. SD, Faktor)
Maximum	1.968,00 U/l	Variationskoeffizient (CV%)	9,17 % (log-Skala)
Median	34,50 U/l	Anpassungsgüte (R^2)	99.8%
Verwendeter Bereich		1401 von 1928 Werten (5.0 % – 77.6 %)	

5. – 97,5. Perzentile)

18,39 – 65,89


U/l

Regression: $z = 3,07122 \cdot x - 10,90228$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): GOT (AST) (GOT) — 1 Jahre — 6 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse
Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.