

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Harnsäure (HS) — 1 Jahre – 6 Jahre (mg/dl)

Gruppe: 1 Jahre – 6 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:22:49 · n = 482 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Harnsäure (HS) — 1 Jahre – 6 Jahre (mg/dl)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Passwort

Anmelden

Ergebnisse: Harnsäure (HS)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	482
Minimum	0,10 mg/dl
Maximum	10,10 mg/dl
Median	3,50 mg/dl

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	3,51 mg/dl (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,327 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	22,55 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	99.6%

Verwendeter Bereich	402 von 482 Werten (7.3 % – 90.7 %)
---------------------	-------------------------------------

95. – 97.5. Perzentile)


2,02 – 6,12

mg/dl

Regression: $z = 3,53159 \cdot x - 4,43535$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Harnsäure (HS) — 1 Jahre – 6 Jahre (mg/dl)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.