

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

LDH — 15 Tage – 1 Jahre (U/l)


Gruppe: 15 Tage – 1 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:23:26 · n = 150 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: LDH — 15 Tage – 1 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: LDH — 15 Tage – 1 Jahre (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)		Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Anzahl Messwerte (n)	150	Geschätzter Mittelwert (μ)	284,24 U/l (geom.)
Minimum	107,00 U/l	Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,278 (geom. SD, Faktor)
Maximum	669,00 U/l	Variationskoeffizient (CV%)	4,34 % (log-Skala)
Median	279,00 U/l	Anpassungsgüte (R^2)	98.5%
		Verwendeter Bereich	136 von 150 Werten (4.7 % – 95.3 %)

5. – 97.5. Perzentile)

175,71 – 459,80

U/l


Regression: $z = 4,07512 \cdot x - 23,02370$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzklinien ggf. nachkorrigieren.


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): LDH — 15 Tage – 1 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.