

Hoffmann Referenzbereich-Analyse


Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

LDH — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)

Gruppe: männlich, 15 Jahre – 18 Jahre
Erstellt am 20.5.2026, 11:23:32 · n = 687 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: LDH — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Passwort

Anmelden

Ergebnisse: LDH — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	687
Minimum	77,00 U/l
Maximum	716,00 U/l
Median	174,00 U/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	174,24 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,325 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	5,45 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	99.9%

Verwendeter Bereich	490 von 687 Werten (21.8 % – 93.2 %)
---------------------	--------------------------------------

95. – 97.5. Perzentile)


100,44 – 302,28

U/l

Regression: $z = 3,55772 \cdot x - 18,35938$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): LDH — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.