

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Magnesium (MG) — 15 Tage – 1 Jahre (mmol/l)

Gruppe: 15 Tage – 1 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:23:41 · n = 308 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Magnesium (MG) — 15 Tage – 1 Jahre (mmol/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Magnesium

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	308
Minimum	0,61 mmol/l
Maximum	1,37 mmol/l
Median	0,90 mmol/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	0,90 mmol/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,08 mmol/l
Variationskoeffizient (CV%)	8,98 %
Anpassungsgüte (R^2)	99.6%
Verwendeter Bereich	278 von 308 Werten (4.9 % – 95.1 %)


0,74 – 1,05

mmol/l

Regression: $z = 12,42146 \cdot x - 11,13776$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Magnesium (MG) — 15 Tage — 1 Jahre (mmol/l)



Hoffmann Referenzanalyse
Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression verwendete Bereich ist dargestellt. Die Referenzgrenzen liegen bei $\pm 1,96$ SD.