

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Transferrin (TRAF) — weiblich, 10 Jahre – 15 Jahre (g/l)


Gruppe: weiblich, 10 Jahre – 15 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:24:23 · n = 139 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren
(1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Transferrin (TRAF) — weiblich, 10 Jahre – 15 Jahre (g/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Transferrin

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	139
Minimum	1,60 g/l
Maximum	4,48 g/l
Median	2,90 g/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	2,88 g/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,51 g/l
Variationskoeffizient (CV%)	17,58 %
Anpassungsgüte (R^2)	99.5%

Verwendeter Bereich
127 von 139 Werten (4.3 %
– 95.7 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)


1,89 – 3,87

g/l

Regression: $z = 1,97591 \cdot x - 5,68799$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression verwendete Teil der Stichprobe ist dargestellt. $n = 1.000$; $M = 1,00$; $SD = 1,96$.