

Relation binaire entre deux ensembles

Définition

Soient deux ensembles E et F , une relation binaire R est une partie du produit cartésien $E \times F$.

On note $R \subseteq E \times F$.

Il s'agit aussi d'un ensemble de couples (e, f) avec $e \in E$ et $f \in F$.

On écrira $(e, f) \in R$ ou eRf .

Exemple (1. Associer une ville à un pays dont elle est la capitale)

$E_v = \{\text{Paris, Berlin, Rome, Montpellier}\}$

$F_p = \{\text{Allemagne, France, Italie, Espagne}\}$

$R_{vp} = \{(\text{Paris, France}), (\text{Berlin, Allemagne}), (\text{Rome, Italie})\}$

Exemple (2. Associer une variété de fleur à une couleur qu'elle peut avoir)

$E_f = \{\text{jasmin, muguet, petunia}\}$

$F_c = \{\text{blanc, jaune, rouge, rose, violet, vert}\}$



$R_{fc} = \{(\text{jasmin, blanc}), (\text{jasmin, jaune}), (\text{muguet, blanc}), (\text{petunia, blanc}), (\text{petunia, rouge}), (\text{petunia, rose}), (\text{petunia, violet})\}$

Représentation d'une relation binaire pour $E \neq F$ par un graphe

Définition

À une relation binaire $R \subseteq E \times F$, $E \neq F$, on associe un graphe orienté $G = (E \cup F, R)$. Ses sommets sont les éléments de E et les éléments de F et ses arcs sont les couples de la relation R .

Exemple (Graphes associés aux relations R_{vp} (gauche) et R_{fc} (droite))



Relation binaire sur un ensemble

Définition

Soit un ensemble E , une relation binaire R sur E est une partie du produit cartésien $E \times E$.

On note $R \subseteq E \times E$.

Il s'agit aussi d'un ensemble de couples (e_1, e_2) avec $e_1 \in E$ et $e_2 \in E$.

On écrira $(e_1, e_2) \in R$ ou $e_1 R e_2$.

Exemple (Relation binaire sur un ensemble)

$$E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$$

$$R = \{(e_1, e_1), (e_1, e_2), (e_1, e_3), (e_1, e_4), (e_3, e_5), (e_4, e_5), (e_5, e_4)\}$$

Représentation d'une relation binaire sur un ensemble par un graphe


Définition

À une relation binaire sur E , $R \subseteq E \times E$, on associe un graphe orienté $G = (E, R)$. Ses sommets sont les éléments de E et les éléments de F et ses arcs sont les couples de la relation R .

Exemple (Relation binaire sur un ensemble)

$$E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$$

$$R = \{(e_1, e_1), (e_1, e_2), (e_1, e_3), (e_1, e_4), (e_3, e_5), (e_4, e_5), (e_5, e_4)\}$$




Relation réflexive

Définition


Soient un ensemble E et une relation binaire R sur E , R est réflexive si :
 $\forall e \in E, (e, e) \in R$ (que l'on note aussi eRe)

Exemple

Une relation réflexive



Une relation non réflexive




Relation irréflexive

Définition


Soient un ensemble E et une relation binaire R sur E , R est irréflexive si : $\forall e \in E$, $(e, e) \notin R$

Exemple

Une relation irréflexive



Une relation non irréflexive




Relation symétrique

Définition


Soient un ensemble E et une relation binaire R sur E , R est symétrique si :
 $\forall e_1, e_2 \in E$, si $(e_1, e_2) \in R$, alors $(e_2, e_1) \in R$

Exemple

Une relation symétrique



Une relation non symétrique




Relation antisymétrique

Définition


Soient un ensemble E et une relation binaire R sur E , R est anti-symétrique si :
 $\forall e_1, e_2 \in E$, si $(e_1, e_2) \in R$ et $(e_2, e_1) \in R$, alors $e_2 = e_1$

Exemple

Une relation antisymétrique



Une relation non antisymétrique




Relation transitive

Définition


Soient un ensemble E et une relation binaire R sur E , R est une relation transitive si $\forall e_1, e_2, e_3 \in E, e_1 R e_2 \text{ et } e_2 R e_3 \implies e_1 R e_3$

Exemple

Une relation transitive



Une relation non transitive



Relation d'équivalence


Définition

Soient un ensemble E une relation binaire R sur E , R est une relation d'équivalence si :


- réflexive
- symétrique
- transitive

Exemple

Une relation d'équivalence



Une relation qui n'est pas une relation d'équivalence



Préordre


Définition

Soient un ensemble E une relation binaire R sur E est un pré-ordre si :


- réflexive
- transitive

Exemple

Un pré-ordre



Une relation qui n'est pas un préordre



Ordre

Définition


Soient un ensemble E une relation binaire R (notée \leq) sur E est un ordre si elle est :

- réflexive
- antisymétrique
- transitive

(E, \leq) est appelé un ensemble ordonné. On écrit $x \leq y$ plutôt que $(x, y) \in \leq$.


Exemple

Un ordre



$$e_1 \leq e_1, e_1 \leq e_2, e_1 \leq e_5$$

Une relation qui n'est pas un ordre



Vocabulaire

- y couvre x si $x \neq y$, $y \geq x$ et $\forall z$, si $y \geq z$ et $z \geq x$, on a $x = z$ ou $y = z$
- x est un minorant de y si $x \leq y$ (resp. majorant si $y \leq x$)
- x et y sont comparables si $x \leq y$ ou $y \leq x$
- x et y sont incomparables si $x \not\leq y$ et $y \not\leq x$ (notation $x \parallel y$)

Exemple

e_2 majore et couvre e_1 , e_5 majore mais ne couvre pas e_1 , e_2 et e_4 sont incomparables




Diagramme de Hasse


Définition

Soit un ensemble ordonné (E, \leq) son diagramme de Hasse est une représentation graphique de sa relation de couverture telle que chaque élément x de E est représenté par un point $p(x)$ du plan avec :


- si $x \leq y$, la droite horizontale passant par $p(x)$ est au-dessous de la droite horizontale passant par $p(y)$.
- lorsque y couvre x , un segment de droite joint $p(x)$ et $p(y)$.

Exemple

Un ordre



Son diagramme de Hasse



Relation d'ordre strict

Définition


Soit un ensemble E , une relation binaire R sur E est une relation d'ordre strict (notée $<$) si elle est :

- *irréflexive*
- *transitive*


Elle est alors asymétrique : quand xRy , on n'a pas yRx .

Exemple

Un ordre strict



Une relation qui n'est pas un ordre strict




Relation d'ordre total

Définition


Soit un ensemble ordonné (E, \leq) , \leq est un ordre total si $\forall x, y \in E$ on a $x \not\leq y \implies y \leq x$

Exemple

Un ordre total et son diagramme de Hasse



Un ordre qui n'est pas total



Isomorphismes et types d'ordre, Morphismes

Définition (isomorphisme d'ordre)


Deux ensembles ordonnés $P = (E_P, \leq_P)$ et $Q = (E_Q, \leq_Q)$ sont isomorphes (on dira aussi qu'ils sont du même type) lorsqu'il existe une bijection b de E_P and E_Q vérifiant : $\forall x, y \in E_P, x \leq_P y \Leftrightarrow b(x) \leq_Q b(y)$. b est appelée un isomorphisme d'ordre. b préserve l'ordre \leq_P et sa réciproque b^{-1} préserve l'ordre \leq_Q .

Définition (morphisme d'ordre)

Soient deux ensembles ordonnés $P = (E_P, \leq_P)$ et $Q = (E_Q, \leq_Q)$, une application a de E_P and E_Q vérifiant : $\forall x, y \in E_P, x \leq_P y \Rightarrow a(x) \leq_Q a(y)$. a est appelée un morphisme d'ordre. a préserve l'ordre \leq_P .

Exemple

Un isomorphisme d'ordre



Un morphisme d'ordre qui n'est pas un isomorphisme

