



Departamento de Matemática y Física
Curso: Matemática III
Código: 0826301

Producto de Matrices y Formas Escalonadas



Arelis Díaz

Celular: 04269129844

Email: jdiaz@unet.edu.ve


21 de junio del 2021

Producto de Matrices

- Sean $A = (a_{ij})$ una matriz de tamaño $m \times n$ y $B = (b_{ij})$ una matriz de tamaño $n \times p$, entonces podemos definir el producto de A y B como una matriz $C = (c_{ij})$ de tamaño $m \times p$ en donde para cada i y j :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

- Es decir, $c_{ij} = (\text{Renglon } i \text{ de } A) \cdot (\text{columna } j \text{ de } B)$



- Dos matrices A y B se dicen que son compatibles para la multiplicación A por B si el número de columnas de A es igual al número de renglones de B .

Ejemplo: Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 0 & -4 \\ -3 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. Calcule AB .

Solución: Como A tiene 3 columnas y B tiene 3 renglones entonces son compatibles para el producto AB . El producto $C = AB$ es una matriz que tiene el número de renglones de A y el número de columnas de B .

Es decir, C es de tamaño 2×4 . Entonces: $c_{11} = (2 \ 0 \ -3) \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = 2(7) + 0(2) + (-3)(-3) = 23$

$$c_{12} = (2 \ 0 \ -3) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} = 2(-1) + 0(5) + (-3)(1) = -5$$

$$c_{13} = (2 \ 0 \ -3) \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2(4) + 0(0) + (-3)(2) = 2$$

$$c_{14} = (2 \ 0 \ -3) \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} = 2(7) + 0(-4) + (-3)(3) = 5$$

$$c_{21} = (4 \quad 1 \quad 5) \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = 4(7) + 1(2) + 5(-3) = 15$$

$$c_{22} = (4 \quad 1 \quad 5) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} = 4(-1) + 1(5) + 5(1) = 6$$

$$c_{23} = (4 \quad 1 \quad 5) \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 4(4) + 1(0) + 5(2) = 26$$

$$c_{24} = (4 \quad 1 \quad 5) \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} = 4(7) + 1(-4) + 5(3) = 39$$

$$\text{Así, } AB = \begin{pmatrix} 23 & -5 & 2 & 5 \\ 15 & 6 & 26 & 39 \end{pmatrix}$$

Observe que el producto BA no está definido porque el número de columnas de B (cuatro columnas) no coincide con el número de renglones de A (dos renglones).

Propiedades del Producto

- En términos, los productos de matrices no son conmutativos; es decir, casi siempre ocurre que $AB \neq BA$.

- *Ley asociativa de la multiplicación de matrices*

Si A es una matriz de $n \times m$, B es de $m \times p$ y C es de $p \times q$, entonces

$$A(BC) = (AB)C$$

y tanto $A(BC)$ como $(AB)C$ son matrices de $n \times q$.

- *Leyes distributivas de la multiplicación de matrices*

Si todos los productos están definidos, entonces

$$A(B + C) = AB + AC \quad \text{y} \quad (A + B)C = AC + BC$$

Autoevaluación

- I) De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es cierta para la multiplicación de las matrices A y B ?
- a) Se puede realizar sólo si A y B son matrices cuadradas.
 - b) Cada elemento c_{ij} es el producto de a_{ij} y b_{ij} .
 - c) $AB = BA$.
 - d) Se puede realizar sólo si el número de columnas de A es igual al número de renglones de B .
- II) ¿Cuál de los siguientes sería el tamaño de la matriz producto AB si se multiplica la matriz A de 2×4 por la matriz B de 4×3 ?
- a) 2×3
 - b) 3×2
 - c) 4×4
 - d) Este producto no se puede calcular.

III) Indique cuál de los siguientes enunciados es correcto para las matrices A y B si AB es un vector columna.

- a) B es un vector columna.
- b) A es un vector renglón.
- c) A y B son matrices cuadradas.
- d) El número de renglones de A debe ser igual al número de columnas de B .

IV) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el producto AB es cierta si A es una matriz de 4×5 ?

- a) B debe tener cuatro renglones y el resultado tendrá cinco columnas.
- b) B debe tener cinco columnas y el resultado será una matriz cuadrada.
- c) B debe tener cuatro columnas y el resultado tendrá cinco renglones.
- d) B debe tener cinco renglones y el resultado tendrá cuatro renglones.

Respuestas a la autoevaluación

I) d) II) a) III) a) IV) d)

Ejercicios Propuestos

- Realice los productos indicados

$$1) \begin{pmatrix} 3 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \qquad 2) \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 4 \\ 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \qquad 3) \begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ -2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4) \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \\ 5 & 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad 5) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & -2 \\ -6 & 4 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad 6) \begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$7) \text{ Sea } A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 8 & -6 \end{pmatrix}, \text{ encuentre un vector no nulo } b = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ tal que } Ab = 6b.$$

$$8) \text{ Encuentre una matriz } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ tal que } A \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Forma Escalonada Reducida por Renglones

Una matriz se encuentra en la **forma escalonada reducida por renglones** si se cumplen las siguientes condiciones:

- i) Todos los renglones (si los hay) cuyos elementos son todos cero aparecen en la parte inferior de la matriz.
- ii) El primer número diferente de cero (comenzando por la izquierda) en cualquier renglón cuyos elementos no todos son cero es 1.
- iii) Si dos renglones sucesivos tienen elementos distintos de cero, entonces el primer 1 en el renglón de abajo está más hacia la derecha que el primer 1 en el renglón de arriba.
- iv) Cualquier columna que contiene el primer 1 en un renglón tiene ceros en el resto de sus elementos. El primer número diferente de cero en un renglón (si lo hay) se llama **pivote** para ese renglón.

Ejemplo

Las siguientes matrices están en la forma escalonada reducida por renglones:

$$\text{i)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{ii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{iii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{iv)} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{v)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Forma Escalonada por Renglones

- Una matriz está en la forma escalonada por renglones si cumple las condiciones i), ii) y iii) de la matriz en forma escalonada reducida por renglones.
- **Ejemplo:** Las siguientes matrices están en forma escalonada por renglones

$$\text{i)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{ii)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{iii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{iv)} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{v)} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operaciones Elementales por Renglones

Permiten transformar una matriz A a alguna de sus formas escalonadas por renglones, la matriz obtenida se llama la matriz escalonada por renglones asociada a la matriz A , las operaciones son las siguientes:

- i) Multiplicar (o dividir) un renglón por un número diferente de cero.
- ii) Sumar un múltiplo de un renglón a otro renglón.
- iii) Intercambiar dos renglones.

Notación

1. $R_i \rightarrow cR_i$ quiere decir “reemplaza el i -ésimo renglón por ese mismo renglón multiplicado por c ”. [Para multiplicar el i -ésimo renglón por c se multiplica cada número en el i -ésimo renglón por c .]
2. $R_j \rightarrow R_j + cR_i$ significa sustituye el j -ésimo renglón por la suma del renglón j más el renglón i multiplicado por c .
3. $R_i \rightleftharpoons R_j$ quiere decir “intercambiar los renglones i y j ”.

Rango de una matriz

Dada una matriz A el rango de una matriz denotado por $\rho(A)$ es el número de renglones distintos de cero de la matriz escalonada por renglones asociada a la matriz A .

Ejemplo: Reduzca la siguiente matriz a la forma escalonada y determine el rango de la matriz.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 18 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} &\xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{1}{2}R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 \rightarrow R_2 - 4R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{1}{3}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -11 & -23 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 + 5R_2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Matriz en forma
escalonada,
 $\rho(A) = 3$

Para mayor comprensión veamos los detalles de algunas operaciones:

- $R_1 \rightarrow \frac{1}{2}R_1$ consiste en reemplazar el renglón uno por $\frac{1}{2}R_1$

$$(2 \ 4 \ 6 \ 18) \rightarrow (2/2 \ 4/2 \ 6/2 \ 18/2) \rightarrow (1 \ 2 \ 3 \ 9)$$

- $R_2 \rightarrow R_2 - 4R_1$ reemplazamos el renglón dos por $R_2 - 4R_1$

$(4 \ 5 \ 6 \ 24)$	$\rightarrow (4 \ 5 \ 6 \ 24) - 4(1 \ 2 \ 3 \ 9)$ $\rightarrow (4 - 4 \ 5 - 8 \ 6 - 12 \ 24 - 36)$ $\rightarrow (0 \ -3 \ -6 \ -12)$
--------------------	--

- $R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1$ reemplazamos el renglón tres por $R_3 - 3R_1$

$(3 \ 1 \ -2 \ 4)$	$\rightarrow (3 \ 1 \ -2 \ 4) - 3(1 \ 2 \ 3 \ 9)$ $\rightarrow (3 - 3 \ 1 - 6 \ -2 - 9 \ 4 - 27)$ $\rightarrow (0 \ -5 \ -11 \ -23)$
--------------------	--

De modo similar se procede con el resto de renglones de acuerdo a las operaciones indicadas

Nota:

- En la siguiente clase se va a dar un método para conseguir la forma escalonada de una matriz.
- Primero se introducirá la relación entre matrices y sistemas de ecuaciones lineales y luego se darán los métodos Gaussiano y el de Gauss-Jordan que sugieren como encontrar la forma escalonada en el primer caso y la forma escalonada reducida por renglones en el segundo.

Hasta la próxima!