

Relatório – Observação e Dissecção de Oligoquetas (Minhocas)

Na aula da semana passada, foi estudado o grupo dos oligoquetas, pertencentes à subclasse Oligochaeta, dentro da classe Clitellata, que também inclui os hirudíneos. A parte teórica da aula abordou as principais características desses animais, como a presença de poucas cerdas (daí o nome: "oligo" significa poucas e "quetas" significa cerdas) e o clitelo, uma região composta por segmentos modificados, mais largos do que o restante do corpo. O clitelo é uma característica marcante dos clitelados e está envolvido no processo reprodutivo.

Os oligoquetas são hermafroditas, ou seja, cada indivíduo possui tanto órgãos sexuais masculinos quanto femininos. Durante a reprodução, ocorre uma cópula em que os clitelos dos dois indivíduos se alinham e há troca de gametas, caracterizando uma fecundação cruzada. Além disso, as minhocas, representantes mais comuns desse grupo, desempenham um papel ecológico fundamental, alimentando-se de sedimentos e excretando húmus, um material rico em nutrientes que melhora a qualidade do solo e favorece o crescimento das plantas. A locomoção desses animais ocorre por meio de movimentos peristálticos, auxiliados pelo esqueleto hidrostático, formado pelo líquido presente no celoma.

Na parte prática da aula, foram coletadas minhocas de jardim para observação. Inicialmente, foi feita a análise externa dos animais, identificando estruturas como o prostômio (primeiro segmento), o peristômio (segmento seguinte) e o pigídio (segmento final do corpo). Também foram observados os movimentos peristálticos das minhocas, tanto sobre vidro quanto sobre papel. Notou-se que a locomoção foi mais lenta sobre o papel, provavelmente devido ao atrito com o material.

Com o auxílio de uma lupa, foi possível visualizar as cerdas, estruturas responsáveis pela fixação do corpo ao substrato e importantes para a locomoção. Em seguida, foi realizada a anestesia das minhocas utilizando álcool, o que facilitou o manuseio durante a dissecção. Algumas minhocas apresentaram rompimento da membrana por choque osmótico, devido à diferença de concentração entre o álcool e o interior do corpo.

A dissecção foi realizada com o uso de bisturi, alfinetes e lupa. Durante o procedimento, foi possível observar diversas estruturas internas importantes, como a faringe, responsável pela sucção de alimento; a moela, envolvida na trituração do material ingerido; e as espermatídes, confirmando a condição hermafrodita do organismo.

Conclui-se que a atividade prática foi essencial para reforçar os conhecimentos teóricos

sobre os oligoquetas, permitindo observar diretamente sua anatomia externa e interna. Além disso, ficou evidente a importância ecológica das minhocas, principalmente na fertilização do solo. A experiência também contribuiu para o desenvolvimento de habilidades práticas em observação e dissecação de invertebrados, fundamentais para a formação na área biológica.