

Relatório Observação e Dissecção de Annelida (Oligochaeta)

Luiz Francisco dos Santos Mantovani - 174103

1. Objetivos:

O objetivo da aula foi observar a locomoção de espécimes de Oligochaetas, identificar suas estruturas externas e dissecá-las para identificar suas estruturas internas.

2. Material utilizado:

- Lupa
- Placa de Petri
- Bisturi de dissecção
- Alfinetes
- Pinça
- Pissete
- Placa de papelão
- Álcool 96% diluído
- Espécimes vivos de Oligochaeta

3. Procedimentos:

Inicialmente, para observar a movimentação das minhocas, dois espécimes vivos foram colocados em uma placa de Petri umedecida. Uma delas foi transferida para um pedaço de papel úmido e comparou-se a diferença de como as minhocas se movimentavam em cada superfície, notando também como o corpo de cada uma se comportava durante o deslocamento. Nessa etapa foi observado com clareza a movimentação por meio do esqueleto hidrostático, além de se notar a tendência desses seres de se afastarem de regiões sem umidade.

Após essa observação inicial, a Oligochaeta que estava no papel foi movida de volta para a placa de Petri, que foi levada para a lupa. Usando uma luz incidente e ajustando o foco e o aumento da lupa, foi possível identificar com clareza as regiões do prostômio, do peristômio e do pigídio. Com o auxílio de uma lâmina de vidro para microscopia colocada sobre o espécime, aplicou-se uma leve pressão, tornando possível a visualização do clitelo e de algumas das estruturas internas. Com o aumento maior da lupa, foi possível observar as cerdas presentes na superfície ventral desses seres.

Por fim, adicionou-se uma pequena quantidade de álcool diluído na placa de Petri onde estavam as minhocas para servir de anestesia e, após o movimento delas cessarem, as minhocas foram transportadas para um pedaço de papelão, onde foi retirado o excesso de álcool. Com o auxílio da lupa e de um bisturi, foi realizada uma incisão longitudinal na região ventral, iniciado a partir do terceiro segmento (Figura 1), evitando danificar as estruturas internas. A pele foi aberta e fixada com alfinetes de modo que permitia ver alguns dos principais órgãos: a faringe, os três pares de

espermateca, e o início da moela (Figura 2). Após o procedimento, os materiais foram devidamente descartados e limpos.



Figura 1: Oligochaeta dissecada presa por alfinetes.



Figura 2: Oligochaeta dissecada presa por alfinetes vista na lupa.