

Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Instituto de Oceanografia - IO



RELATÓRIO: AULA PRÁTICA DE ANNELIDA
DISCIPLINA DE BIODIVERSIDADE DE INVERTEBRADOS MARINHOS

Discente: Francielen San Martins Rodrigues – Matrícula: 163326, turma: C.
Docente: Maurício Garcia de Camargo

Rio Grande, 2025.

INTRODUÇÃO

Os anelídeos são animais invertebrados pertencentes ao filo Annelida, que inclui as minhocas, sanguessugas e poliquetas. Eles possuem corpo alongado, cilíndrico e segmentado (metamerizado), o que facilita sua locomoção e organização interna. Externamente, apresentam cerdas (em muitos grupos) que auxiliam na movimentação, e sua pele é recoberta por uma cutícula fina e úmida, importante para as trocas gasosas (ROUSE, PLEIJEL, TILIC, 2022).

Internamente, têm sistema digestório completo, sistema circulatório fechado e sistema nervoso ventral com gânglios segmentares. A locomoção ocorre por contrações coordenadas da musculatura circular e longitudinal, em conjunto com o fluido do celoma, funcionando como um esqueleto hidrostático, com essas combinações permitindo movimentos eficientes, principalmente no solo ou em ambientes aquáticos (ROUSE, PLEIJEL, TILIC, 2022).

Estudar os anelídeos é importante porque eles desempenham papéis ecológicos fundamentais, como aeração do solo e decomposição da matéria orgânica.

MATERIAIS

Para esta aula prática, os seguintes materiais foram utilizados conforme a necessidade: lupa, placa de Petri, bisturi de dissecação, alfinetes finos, pinça fina, pisseta com água destilada, bandeja de dissecação ou qualquer isopor, álcool 96% diluído em água destilada até a concentração de 20% e minhocas vivas de duas espécies (minhoca comum de jardim – *Urobenus brasiliensis* ou minhoca californiana – *Eisenia fetida*).

METODOLOGIA

Nesta atividade prática, foram analisadas características relacionadas à locomoção, morfologia externa e morfologia interna da minhoca. Para a observação da locomoção, o animal foi colocado sobre um papel úmido, permitindo que se movimentasse livremente. Observou-se, então, a variação na forma do corpo durante o deslocamento, as ondas peristálticas, a velocidade de movimento e a diferença de deslocamento entre uma superfície lisa de vidro e a do papel. A análise da morfologia externa foi realizada com o animal posicionado em uma placa de Petri umedecida. Utilizando uma lupa com baixa intensidade de luz, a fim de evitar a desidratação, foram identificadas as seguintes estruturas: boca na extremidade anterior, ânus na posterior, prostômio, peristômio, pigídio, clitelo, intestino visível por transparência e as cerdas. Já na etapa de observação da morfologia interna, exigiu-se a anestesia do organismo de maneira fundamental para minimizar seu sofrimento. Esse procedimento foi realizado com a aplicação de álcool diluído a 20% diretamente na placa de Petri contendo o animal, aguardando-se entre 5 a 10 minutos até a redução ou cessação dos movimentos. Em seguida, a minhoca foi cuidadosamente seca com papel toalha para remover o excesso de líquido e, então, posicionada com a face ventral voltada para cima sobre um suporte de papelão. Foi realizada uma incisão longitudinal, da região anterior até a metade do corpo, utilizando um bisturi com cautela para preservar as estruturas internas. Com a abertura das paredes corporais, foi possível observar os órgãos internos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Primeiramente, foi possível realizar a prática. A minhoca selecionada para este estudo era da espécie californiana — *Eisenia fetida* — de tamanho médio a pequeno, um indicativo de um indivíduo ainda juvenil. Seus aspectos de locomoção foram brevemente observados. Na etapa de identificação

da morfologia externa, todas as partes foram visíveis com o auxílio da lupa. Dessa forma, a boca na região anterior e o ânus na posterior foram facilmente percebidos, assim como o intestino, visível por transparência quando exposto à luz. As demais estruturas externas apresentaram maior dificuldade de identificação, como o prostômio, o peristômio, o pigídio, o clitelo e as cerdas, mas todas foram possíveis de ser observadas. A Figura 1, mostra uma minhoca com sua estrutura externa e a identificação da localização de algumas de suas características.




Figura 1: Annelida, organismo pertencente a classe das Oligoquetas e sua estrutura externa. Fonte: Adaptado de : <https://artropodeseanelideos.blogspot.com/>

A morfologia interna foi a etapa mais complexa devido à incisão. O organismo foi anestesiado com sucesso, sem apresentar rompimento das estruturas ou de partes dos órgãos internos, o que representou uma vantagem para a observação após sua abertura. Órgãos como os cinco corações laterais, o vaso dorsal, o vaso ventral e os gânglios nervosos não foram visíveis, muito provavelmente devido ao tamanho reduzido do animal e de suas estruturas. Os demais itens de interesse na observação foram identificados e estão devidamente assinalados na Figura 2, em uma fotografia real do experimento.




Figura 2: Morfologia interna de um anelídeo, (a)espermateca (b) (c) (d) : Fonte: Canal de comunicação de aula - Biodiversidade de invertebrados marinhos, foto por: Miguel, 2025.

CONCLUSÃO

O estudo foi realizado de forma satisfatória, com a observação da maior parte dos aspectos desejados. Por meio de uma atividade prática, foi possível consolidar os conceitos abordados em sala de aula, permitindo que futuras observações em organismos similares sejam mais facilmente realizadas. A atividade também contribuiu para o entendimento de mais uma classe pertencente aos invertebrados.

REFERÊNCIAS

Artropodes e anelídeos. Fonte: <https://artropodeseanelideos.blogspot.com/> . Acessado em: 11 de junho de 2025.

Canal de comunicação de aula - **Biodiversidade de invertebrados marinhos**, foto por: Miguel, 2025.

ROUSE, Greg; PLEIJEL, Fredrik; TILIC, Ekin. **Annelida**. Oxford University Press, 2022.