DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

$n = 20$

Sejam os seguintes dados brutos:

45, 41, 42, 41, 42, 43, 44, 41, 50, 46, 50, 46, 60, 54, 52, 58, 57, 58, 60, 46

ROL: ORDENAR → Nº DO SAPATO?

41, 41, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 46, 50, 50, 52, 54, 57, 58, 58, 60, 60

REGRA DE STURGES P/ CALCULAR Nº CLASSES

$i = 1 + 3{,}3 \cdot \log(n)$

$i = 1 + 3{,}3 \cdot \log(20) = 5{,}29$

$i = 5$

AMPLITUDE DE CADA CLASSE

$h = A_t / i = (60 - 41) / 5 = 3{,}8$

$\boxed{h = 4}$

TABELA DE FREQUÊNCIAS

20 — 100
7 — x
x = 35

i	Classes	FREQ. ABS.	FREQ. REL.	FREQ. A. Ac	F. REL. Ac
1	41 ⊢ 45	7	35	7	35
2	45 ⊢ 49	4	20	11	55
3	49 ⊢ 53	3	15	14	70
4	53 ⊢ 57	1	5	15	75
5	57 ⊢ 61	5	25	20	100
		$\Sigma = 20$	$\Sigma = 100$		

HISTOGRAMAS: GRÁFICOS DE BARRAS EXPRESSANDO FREQUÊNCIAS







EXEMPLOS DE MEDIDAS DE C.T. DE UMA SPP DE PEIXE



n = 20



n = 50



n = 200



n = 500

TEOREMA DO LIMITE CENTRAL

Quanto maior o n, mais próximo da distribuição normal.