

Práctico 5

- Hallar la aproximación lineal de $f(x, y) = \sqrt{20 - x^2 - 7y^2}$ en $(2, 1)$ y usarla para calcular de manera aproximada $f(1,95, 1,08)$.
- Calcular el campo gradiente de las siguientes funciones. Cuando sea posible, representar gráficamente.
 - $f(x, y) = x - y$,
 - $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$,
 - $f(x, y) = x \sin(y) + 1$,
 - $f(x, y) = \sin(x^2 - y^2)$
 - $f(x, y, z) = 2x + y - 3z$,
 - $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2$,
 - $f(x, y, z) = e^{x+y} - z$
 - $f(x, y, z) = x \cos(y)$,
 - $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \dots + x_n$
 - $f(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_n^2$.
- Hallar el espacio tangente, dando su dirección perpendicular, de los siguientes conjuntos de nivel en los puntos indicados:
 - $x - y = 1$ en $(1, 0)$,
 - $2x^2 + y^2 = 3$ en $(1, 1)$,
 - $\ln(x^2 + y^2) = 0$ en $(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$,
 - $x \sin(y) + 1 = 3$ en $(2, \frac{\pi}{2})$,
 - $1 = \sin(x^2 - y^2)$ en $(\sqrt{\frac{\pi}{2}}, 0)$,
 - $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ en $(1, 1, 2)$,
 - $x^2 - 3y^2 + z^2 = 2$ en $(1, 1, 2)$
 - $e^{xy} \cos(z) = 0$ en $(0, 1, \frac{\pi}{2})$,
 - $x_1^2 + \dots + x_n^2 = n$ en $(1, \dots, 1)$,
 - $x_1 x_4 - x_2 x_3 x_1 + x_3 x_2 = 1$ en $(1, 1, 1, 1)$.
- Si (x_0, y_0, z_0) es un punto de la superficie $z = xy$, las dos rectas $z = y_0 x$, $y = y_0$ y $z = x_0 y$, $x = x_0$, se cortan en (x_0, y_0, z_0) . Comprobar que el plano tangente a esta superficie en el punto (x_0, y_0, z_0) contiene a esas dos rectas.
- Hallar la ecuación de la recta que es tangente en el punto $(1, 1, 1)$ a las dos superficies $x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$ y $z = e^{x-y}$.
- Hallar un vector $V(x, y, z)$ normal a la superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2} + (x^2 + y^2)^{3/2}$ en un punto cualquiera $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ de la superficie.
 - Hallar el coseno del ángulo θ formado por el vector $V(x, y, z)$ y el eje z , y determinar el límite de $\cos \theta$ cuando $(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0)$.
- Calcular la derivada direccional de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ en $(3, 4, 5)$ a lo largo de la curva de intersección de las dos superficies $2x^2 + 2y^2 - z^2 = 25$ y $x^2 + y^2 = z^2$.
- Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase C^1 y $f(0) = 0$, probar que existen $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continuas tales que $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i g_i(x)$.
Sugerencia: si $h_x(t) = f(tx)$, entonces $f(x) = \int_0^1 h'_x(t) dt$.
- En cada caso, calcular la matriz Jacobiana de las funciones f y g en cada punto de sus respectivos dominios. Hallar la función compuesta $h = f \circ g$ y su matriz Jacobiana en los puntos indicados:
 - $f(x, y) = (e^{x+2y}, \sin(y + 2x))$, y $g(u, v, w) = (u + 2v^2 + 3w^3, 2v - u^2)$. Hallar $Jh(1, -1, 1)$.

b) $f(x, y, z) = (x^2 + y + z, 2x + y + z^2)$, y $g(u, v, w) = (uv^2w^2, w^2 \sin v, u^2e^v)$. Hallar $Jh(u, 0, w)$.

10. Determinar la solución de la ecuación en derivadas parciales $4f_x + 3f_y = 0$ que satisfaga la condición $f(x, 0) = \sin x$ para todo x .