



Javier Tardío

Cannabis sativa L.

Familia: Cannabaceae

cañamo, cànem, kalamu, cánabo

USOS PRINCIPALES



NOMBRES VULGARES

Castellano: cañamo (nombre generalizado), cáñamu (AS), cañimo (AR); marihuana (nombre generalizado), maría (AS, CM); cánnabis (nombre generalizado); kife, kifi (CN); rondillo (CM). *El fruto:* cañamón (nombre generalizado) [1–43].

Catalán: cànem (CT, IB, VC), cànim (AR), cànyem, cànyom (IB); marihuana (CT, VC), maria (CT, IB); cànnabis; bri (CT) [27,34,44–62].

Euskera: kalamu; marihuana (PV, NC) [63].

Gallego: cánabo, cannabis (GA) [64,65].

DESCRIPCIÓN

Planta anual, dioica, hasta de 3 m, con tallos erectos, ramificados, pelosos, con pelos de base glandulosa. Hojas de 4-8 cm, opuestas abajo y alternas arriba, palmatipartidas, con segmentos lanceolados, aserrados. Plantas masculinas con flores de unos 5 mm, colgantes, dispuestas en panícula laxa que nace en la parte superior del tallo; plantas femeninas con flores en racimos axilares con entre cinco y ocho flores. Fruto en aquenio de 3-5 mm, más o menos globoso, de color marrón claro.

INTRODUCCIÓN

El cañamo es uno de los cultivos más antiguos y polivalentes, cuyos origen y domesticación siguen discutiéndose. Se cree que tiene un origen múltiple, a partir de sus formas silvestres, en distintos puntos del este de Europa y de Asia [66], aunque la hipótesis clásica asume su origen en Asia Central [67,68]. Estudios recientes sugieren que cada uno de los grupos (a veces considerados subespecies) tiene una zona de distribución relativamente independiente, con poblaciones silvestres y domesticadas que comparten los haplotipos más comunes, lo que avala la hipótesis del origen multirregional del cultivo domesticado [69].

Es un cultivo de usos múltiples, ya que se utiliza para la producción de biomateriales (textiles, papel, construcción y aislamiento), como ali-

mento (frutos y aceite) y para otras aplicaciones, incluido su uso cosmético. Pero sin duda su mayor interés radica en su uso farmacéutico ya que de él se obtienen más de 100 sustancias farmacológicamente activas, principalmente cannabinoides, aunque su cultivo está estrictamente regulado [70]. Según los datos de FAO, en 2019 en el mundo se produjeron unas 174 mil toneladas de cañamo principalmente en Francia, seguida de Corea, China, Holanda y Polonia, y unas 76 mil toneladas de cañamones, principalmente en China [71]. En España en 2018 se produjeron 750 toneladas de fibra de cañamo y 233 toneladas de frutos, principalmente en Sevilla [72].

Se cultiva en zonas cálidas, ya que es muy sensible a las heladas. Se siembra en primavera (de marzo a junio) y requiere regadío. Para el aprovechamiento de su fibra, se recolecta trece o catorce semanas después de la siembra [73].

Aunque su taxonomía también es objeto de discusión, normalmente se consideran dos subespecies, la subespecie tipo (subsp. *sativa*), con plantas de gran tamaño y bajo contenido en sustancias psicoactivas (menos del 0,3% en THC), que se cultiva para la obtención de fibra y de frutos o aceite, y la subsp. *indica* (Lam.) E. Small & Cronquist, con plantas de menor tamaño y alto contenido en sustancias psicoactivas que se cultivan para la producción de drogas y medicamentos [68]. De ambas subespecies existen formas silvestres o asilvestradas que a veces son tratadas como variedades [67,68]. Algunos reconocen también la subsp. *ruderalis* (Janisch.) S.Z. Liou, con formas silvestres de la especie que podrían ser las antecesoras de las otras dos [67,68].

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES SOBRE USOS

ALIMENTACIÓN HUMANA

Comestibles-Frutos secos y oleaginosos

Sus frutos, los **cañamones**, se han consumido como alimento, siendo considerados un grato aperitivo a modo de entretenimiento, como las pipas o los pistachos, al menos en Castilla y León [12], Castilla-La Mancha [4,17,20,37,74], Andalucía [10] y la Comunidad Valenciana [39]. Se tomaban en invierno, tostados ligeramente en una sartén de fondo