

Información sobre la muestra del paciente


Información sobre el paciente

Nombre: DORIA ORTIZ, MAURICIO
Fecha de nacimiento: 7/26/1990
Género: M
ID de la muestra: 9314682_02802960029_Q
UANTO

Fecha de recolección:
Hora recolección:
Fecha de recepción: 11/5/2025
Fecha de notificación: 11/10/2025

Información sobre el médico

Nombre: A QUIEN CORRESPONDA
Dirección de la oficina:
Teléfono:



43
Puntuación

Metabolito	Resultado	Unidades	Intervalo de referencia
Insulina	3.50	µU/mL	3.13 - 21.3
AHB	4.33	µg/mL	1.92 - 7.37
LGPC ¹	15.0	µg/mL	7.60 - 25.4
Oleic Acid	36.0	µg/mL	25.9 - 114

Los intervalos de referencia se establecieron utilizando 456 no diabético con riesgo de diabetes (IFG, IGT, años ≥ 45, y / o de puntuación FINDRISC > 12)

Comentarios: _____

Quantose RI™ Test

Quantose RI es un análisis de sangre en ayunas que mide un panel de biomarcadores, que son reflejo de la resistencia a la insulina (RI). RI es una señal temprana del riesgo para el desarrollo de prediabetes, diabetes, presión arterial alta y otras condiciones cardiovasculares³. La prueba Quantose RI se basa en un panel de biomarcadores que comprenden un ácido orgánico (ácido alfa-hidroxi-bútrico (AHB)), 2 lípidos (ácido oleico y linoleoilglicerofosfolina (LGPC)) y la insulina. La puntuación en la prueba fue desarrollada para estimar el valor obtenido del clamp euglicémico hiperinsulinémico, el estándar de oro para determinar la sensibilidad a la insulina, en un estudio prospectivo, observacional de 1.277 personas clínicamente sanas, no diabéticas reclutadas en 13 países europeos². El punto de corte en 63 fue definido por el tercil superior de puntuaciones en el estudio. Los niveles de insulina son medidos por inmunoquimioluminiscencia, y los 3 metabolitos son detectados por espectrometría de masas/cromatografía líquida (UHPLC LC-MS / MS). Las concentraciones de los 4 biomarcadores se combinan y analizan en un algoritmo que genera la puntuación de Quantose RI (escala 1-120). Las especificaciones técnicas de Quantose RI están disponibles a su solicitud.

Resultados Autorizado Por: Dr. Jaime Frago Flores, Director de Centros de Proceso Laboratorios Ruiz

¹LGPC disminuye al aumentar la puntuación

²Cobb J et al. A novel fasting blood test for insulin resistance and prediabetes, J Diabetes Science and Technology, 2013

³Patti M et al, Coordinated reduction of genes of oxidative metabolism in humans with IR and diabetes; Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2003

Quantose RI™ is a trademark of Metabolon, Inc. All rights reserved.