ACADEMIA ZENIT

Guía de Estudio Progresiva
Potencias y sus propiedades

Matemática

Material de apoyo y ejercitación

Academia Zenit

Matemática · Potencias · 1.0 · 2026

Glosario de simbología

Los símbolos específicos del tema potencias aparecen resaltados en ***dorado****.*

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
Conjuntos numéricos			
$\mathbb{N}$	Naturales $\{1, 2, 3, \ldots\}$	$\mathbb{Z}$	Enteros $\{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\}$
$\mathbb{Q}$	Racionales $\frac{p}{q}$, $q \neq 0$	$\mathbb{R}$	Números reales
$a \in A$	a pertenece al conjunto A	$\neq$	Distinto de
Relaciones y lógica			
$< > \leq \geq$	Menor, mayor (estricto/no estricto)	$\approx$	Aproximadamente igual
$\Rightarrow$	Implica (consecuencia)	$\Leftrightarrow$	Si y solo si
$\lvert a \rvert$	Valor absoluto de a	m.c.m.(a, b)	Mínimo común múltiplo
Potencias — tema central			
a^n	a elevado a la potencia n	$a^0 = 1$	Exponente cero ($a \neq 0$)
a^{-n}	Potencia de exponente negativo	$(a/b)^n$	Potencia de un cociente
$a^m \cdot a^n$	$= a^{m+n}$ (P1)	$a^m \div a^n$	$= a^{m-n}$ (P2)
$(a^m)^n$	$= a^{mn}$ (P3)	$a^n \cdot b^n$	$= (ab)^n$ (P4)
$a^{m/n}$	Potencia de exp. racional	$a \cdot 10^n$	Notación científica
Convenciones de esta guía			
✓	Verificación correcta	$\times$	Solución descartada
★	Nivel básico	★★★	Nivel avanzado

Índice de contenidos

§ Galería matemática **p. 4**
Emmy Noether · Leonhard Euler

§ Sección 1 · Concepto de potencia **p. 7**
1.1 La pregunta que da origen 7
1.2 Exponente cero (enunciado) 8
1.3 Base negativa 9
1.4 Base racional y decimal 10

§ Sección 2 · Las seis propiedades **p. 13**
2.0 Simplificación algebraica previa 13
2.1 P1 — Multiplicación igual base 14
2.2 P2 — División igual base 15
Corolario: $a^0 = 1$ (demostración)
Corolario: $a^{-n} = 1/a^n$
2.3 P3 — Potencia de potencia 18
2.4 P4 — Multiplicación igual exp. 18
2.5 P5 — División igual exp. 19
2.6 P6 — Potencia de cociente 20

§ Sección 3 · Op. combinadas **p. 23**
3.1 Prioridad de operaciones 23
3.2 Expresiones numéricas 24
3.3 Exponentes literales 24
3.4 Operatoria con racionales 26

§ Sección 4 · Notación científica **p. 29**
4.1 Potencias de base 10 29
4.2 Definición y condición 29
4.3 Conversión 29
4.4 Operaciones 30

§ Sección 5 · Exp. racional **p. 33**
5.1 Motivación 33
5.2 Definición formal 33
5.3 Conversión de registros 34

§ Sección Final · Ecuaciones **p. 37**
Ejercicios con alternativas 38

§ Ejercicios tipo PAES **p. 42**

§ Solucionario completo **p. 53**

Propósito de la guía

Esta guía construye el concepto de **potencia** de forma progresiva: desde la multiplicación repetida hasta las potencias de exponente racional, puerta de entrada natural a las raíces. Es la guía previa de la *Guía de Raíces — Academia Zenit* y asume únicamente el manejo de las cuatro operaciones básicas con números racionales.

Dificultad: ★ básico ★★ intermedio ★★★ avanzado. **Convención:** $a^1 = a$; $a^0 = 1$ para $a \neq 0$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Galería matemática

Quienes construyeron las herramientas que usamos hoy

Emmy Noether *1882 — 1935*

Fotografía conservada

Emmy Noether nació en 1882 en Erlangen (Alemania). Su padre, Max Noether, era también matemático, y ella creció en un ambiente intelectual poco común para las mujeres de su época. Durante años estudió y luego enseñó en Gotinga sin sueldo ni cargo formal, porque las universidades alemanas no admitían profesoras. Hubo que esperar la intervención directa de David Hilbert —quien preguntó irónicamente ante el claustro: «¿Somos una universidad o un baño público?»— para que le fuera reconocida una posición mínima.

Su obra central transformó el álgebra: introdujo el estudio abstracto de los **anillos**, los **grupos** y los **cuerpos** como estructuras definidas por sus propiedades operatorias, sin importar los objetos concretos que las habiten. Este enfoque, hoy llamado **álgebra abstracta**, es la base de enormes partes de la matemática moderna. En 1915 demostró el célebre **Teorema de Noether**, que conecta las simetrías de un sistema físico con sus leyes de conservación y es uno de los resultados más profundos de la física teórica.

Cuando el régimen nazi llegó al poder en 1933, Noether fue expulsada de su cargo y emigró a Estados Unidos, donde enseñó en el Bryn Mawr College hasta su muerte en 1935. Albert Einstein escribió en su obituario en el *New York Times*: la describió como la persona más significativa en la historia de la creación matemática.

«Mis métodos son en realidad métodos de trabajo y de pensamiento; por eso se han infiltrado en todas partes, de manera anónima.» — Emmy Noether.

Leonhard Euler *1707 — 1783*

Retrato conservado

Leonhard Euler nació en 1707 en Basilea (Suiza) y es el matemático más prolífico de la historia: sus obras completas ocupan más de 90 volúmenes. Estudió bajo Johann Bernoulli y pasó la mayor parte de su vida trabajando en la Academia de San Petersburgo y en la Academia de Berlín. Alrededor de 1738 perdió la visión de un ojo; en 1766 quedó casi completamente ciego. Eso no detuvo su producción: dictaba sus trabajos de memoria y publicaba más artículos siendo ciego que antes.

La lista de sus contribuciones es casi inabarcable: análisis matemático, teoría de números, geometría, mecánica, óptica y astronomía. A Euler se deben algunas de las notaciones más fundamentales que usamos hoy: la letra e para la base de los logaritmos naturales, la letra i para la unidad imaginaria, la letra π para la razón entre circunferencia y diámetro, y la notación $f(x)$ para función. Su *Introductio in analysin infinitorum* (1748) es considerado el libro de texto moderno más influyente de la historia de las matemáticas.

También es autor del primer teorema de la teoría de grafos al resolver el problema de los Puentes de Königsberg en 1736. Y de la identidad $e^{i\pi}+1=0$, que el físico Richard Feynman llamaría siglos después «la fórmula más notable de la matemática».

«Nada ocurre en el mundo sin que exista algún principio de máximo o mínimo.» — Leonhard Euler, *Methodus Inveniendi*, 1744.

La matemática no tiene fronteras de época, género ni cultura.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 1 · Concepto de potencia

1.1 La pregunta que da origen al concepto

¿Cuánto mide el área de un cuadrado de lado 5? $5 \times 5 = 25$. ¿Y el volumen de un cubo de arista 3? $3 \times 3 \times 3 = 27$. En ambos casos aparece un factor que se **multiplica por sí mismo** varias veces. Esa operación es lo que llamamos **potencia**.

Definición formal — Potencia de exponente natural

La **potencia** a^n se define como el producto de n factores iguales a a:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}, \qquad n \in \mathbb{N},\ n \geq 1$$

- a se llama **base**: el número que se multiplica repetidamente.
- n se llama **exponente**: cuántas veces aparece la base como factor.
- a^n se llama **potencia** y su resultado numérico, **valor de la potencia**.

Lectura: a^n se lee «a elevado a n». Casos especiales: a^2 = «al cuadrado»; a^3 = «al cubo».
Convención: $a^1 = a$ (un solo factor, la potencia es la propia base).

Error frecuente — $n \cdot a \neq a^n$: suma iterada vs. multiplicación iterada

$n \cdot a$ significa **sumar** a consigo mismo n veces: por ejemplo $4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$.
a^n significa **multiplicar** a por sí mismo n veces: $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$.
Contraejemplo que deja claro la diferencia: $4 \cdot 3 = 12 \neq 81 = 3^4$.
En general: $n \cdot a \neq a^n$. Son operaciones completamente distintas.

Tabla de potencias de referencia — bases 2 a 5

Base	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 6$
2^n	2	4	8	16	32	64
3^n	3	9	27	81	243	729
4^n	4	16	64	256	1.024	4.096
5^n	5	25	125	625	3.125	15.625

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos — valor de la potencia

Ej. 1. Calcular 6^3

Paso 1 — escribir como producto de 3 factores iguales a 6:

$$6^3 = 6 \cdot 6 \cdot 6$$

Paso 2 — calcular de izquierda a derecha:

$$6 \cdot 6 = 36, \qquad 36 \cdot 6 = 216$$

Conclusión: $6^3 = 216$.

Ej. 2. Calcular 2^8

$$2^8 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 256$$

Conclusión: $2^8 = 256$.

Practica inmediata ★ — Calcula escribiendo primero el producto explícito:

a) 4^3 c) 5^3 e) 10^4 g) 2^{10} i) 6^4

b) 3^4 d) 2^7 f) 4^4 h) 3^5 j) 7^3

1.2 Exponente cero: convenio y enunciado

La definición de a^n como multiplicación repetida exige $n \geq 1$. ¿Qué ocurre si el exponente es 0? La respuesta no se *inventa*: se **deduce** exigiendo que ciertas propiedades sigan funcionando.

Exponente cero — enunciado

Para cualquier base $a \neq 0$:

$$a^0 = 1$$

Nota: la demostración formal —que usa la propiedad de cociente— se presenta en la Sección 2 (Corolario de P2). Por ahora lo enunciamos como convenio y lo usaremos en los ejercicios.
0^0 no está definido; el caso $a = 0$ queda excluido.

Error frecuente — $a^0 \neq 0$

El exponente cero da **uno**, no cero.
$(17)^0 = 1, \quad \left(\frac{3}{5}\right)^0 = 1, \quad (-99)^0 = 1.$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

La confusión surge de asociar «cero» en el exponente con «resultado cero». No hay ninguna razón para eso.

Practica inmediata ★ — Calcula:

a) 7^0 b) $(-3)^0$ c) $\left(\frac{2}{9}\right)^0$ d) $5^0 + 3^0 - 100^0$

1.3 Exponente natural con base negativa: regla del signo

Cuando la base es negativa, la potencia se calcula multiplicando factores negativos. El signo del resultado depende de cuántos factores negativos aparecen.

Regla del signo para base negativa

Sea $a > 0$ y $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$:

- n **par**: $(-a)^n = +a^n$ (número par de signos negativos $\Rightarrow$ resultado positivo)
- n **impar**: $(-a)^n = -a^n$ (número impar de signos negativos $\Rightarrow$ resultado negativo)

Atención crucial al paréntesis:

- $(-a)^n$: la base es $-a$; el signo negativo *entra* dentro de la potencia.
- $-a^n = -(a^n)$: la potencia es solo de a; el signo negativo está *fuera*.

Ejemplos — regla del signo

Ej. 1. $(-2)^4$ tiene base negativa y exponente **par**, por lo tanto el resultado es positivo:

$$(-2)^4 = (-2)(-2)(-2)(-2) = +16$$

Conclusión: $+16$.

Ej. 2. $(-2)^5$ tiene base negativa y exponente **impar**, por lo tanto el resultado es negativo:

$$(-2)^5 = (-2)(-2)(-2)(-2)(-2) = -32$$

Conclusión: -32.

Ej. 3. Para distinguir $(-4)^2$ de -4^2 hay que prestar atención al paréntesis:
$(-4)^2 = (-4) \cdot (-4) = +16$ (la base entera es -4)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

$-4^2 = -(4^2) = -(4 \cdot 4) = -16$ (la potencia es de 4; el signo está fuera)

Conclusión: $(-4)^2 = 16 \neq -16 = -4^2$. El paréntesis cambia todo.

Practica inmediata ★ — Calcula e indica el signo:

a) $(-4)^4$
b) $(-9)^3$
c) $(-2)^6$
d) -3^4
e) $(-1)^{100}$
f) $(-1)^{101}$
g) $(-3)^5$
h) $-(-2)^4$

1.4 Base racional y decimal: multiplicación directa

La definición de potencia como multiplicación repetida funciona para cualquier base, incluidas las fracciones y los decimales. Se calcula multiplicando la base consigo misma la cantidad de veces que indica el exponente, aplicando las reglas de multiplicación de fracciones.

Base racional — cálculo directo

Para $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$:

$$\left(\frac{p}{q}\right)^n = \underbrace{\frac{p}{q} \cdot \frac{p}{q} \cdots \frac{p}{q}}_{n \text{ veces}} = \frac{\overbrace{p \cdot p \cdots p}^{n}}{\underbrace{q \cdot q \cdots q}_{n}}$$

El resultado se obtiene multiplicando numeradores entre sí y denominadores entre sí, n veces. Esto es simplemente la regla de multiplicación de fracciones aplicada repetidamente, **no una propiedad nueva de las potencias**.

Para bases decimales: convertir a fracción primero, luego aplicar la misma regla.

Ejemplos — base racional y decimal

Ej. 1. Calcular $\left(\frac{2}{3}\right)^4$

Paso 1 — escribir como producto de 4 fracciones iguales:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}$$

Paso 2 — multiplicar numeradores y denominadores:

$$= \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{16}{81}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Conclusión: $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{81}$.

Ej. 2. Calcular $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$

Paso 1 — escribir como producto:

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

Paso 2 — multiplicar (base negativa, exponente impar ⇒ negativo):

$$= -\frac{1 \cdot 1 \cdot 1}{2 \cdot 2 \cdot 2} = -\frac{1}{8}$$

Conclusión: $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}$.

Ej. 3. Calcular $(0{,}3)^3$

Paso 1 — convertir a fracción: $0{,}3 = \frac{3}{10}$.

Paso 2 — aplicar la definición:

$$\left(\frac{3}{10}\right)^3 = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3}{10 \cdot 10 \cdot 10} = \frac{27}{1{,}000} = 0{,}027$$

Conclusión: $(0{,}3)^3 = 0{,}027$.

Practica inmediata ★ — Calcula multiplicando directamente:

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^5$ c) $\left(-\frac{2}{3}\right)^4$ e) $\left(-\frac{1}{3}\right)^3$ g) $\left(\frac{1}{10}\right)^5$

b) $\left(\frac{3}{4}\right)^3$ d) $(0{,}5)^3$ f) $(0{,}2)^4$ h) $\left(-\frac{3}{2}\right)^3$

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula el valor de cada potencia (escribe el producto explícito):

a) 4^3 c) 7^2 e) 5^4 g) $(-9)^3$ i) -3^4

b) 3^4 d) 2^8 f) $(-4)^4$ h) $(-2)^6$ j) $(-1)^{15}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

k) $\left(\frac{1}{5}\right)^3$ l) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ m) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ n) $(0{,}2)^3$ ñ) $(0{,}5)^4$

2. Calcula (aplica la regla del signo antes de operar):

a) $(-3)^4 + (-3)^3$

b) $(-2)^5 - (-2)^4$

c) $(-1)^{100} + (-1)^{101}$

d) $-2^4 + (-2)^4$

e) $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 + \left(-\frac{1}{2}\right)^3$

f) $(0{,}1)^3 - (0{,}1)^4$

3. Indica si es verdadero o falso y justifica con un cálculo:

a) $(-5)^2 = -5^2$

b) $3^0 = 0$

c) $(-1)^{2026} = 1$

d) $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$

e) $(-2)^3 = -(2^3)$

★★ *(intermedio)*

4. Calcula, ordenando los pasos:

a) $(-3)^4 - (-2)^5 + 5^0 \cdot 4^0$

b) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 - (-1)^7$

c) $3^3 \cdot 0^5 + (-4)^2 \cdot 1^{100}$

d) $\left(-\frac{1}{3}\right)^4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{2}{5}\right)^2$

★★★ *(avanzado)*

5. Determina todos los enteros $n \geq 1$ que satisfacen $2^n < 100$ simultáneamente con $3^n < 1000$.

6. ¿Para qué valores de $n \in \mathbb{N}$ se cumple $(-1)^n = 1$? ¿Y $(-1)^n = -1$? Justifica usando la regla del signo.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 2 · Las seis propiedades de las potencias

Las propiedades no son reglas que se memorizan: se **deducen** a partir de la definición de potencia como multiplicación repetida. Esta sección construye cada una desde cero.

2.0 Herramienta previa: simplificación de productos con factores repetidos

Antes de las propiedades formales, conviene dominar la idea de simplificar productos y cocientes de factores repetidos cancelando lo que aparece en numerador y denominador. Esta idea es la raíz de casi todas las propiedades.

Simplificación algebraica por cancelación

En una fracción, cualquier factor que aparezca en el numerador **y** en el denominador puede cancelarse:

$$\frac{a \cdot \cancel{b} \cdot c \cdot c}{\cancel{b} \cdot a \cdot c} = \frac{a \cdot c \cdot c}{a \cdot c} = \frac{\cancel{a} \cdot c \cdot \cancel{c}}{\cancel{a} \cdot \cancel{c}} = c$$

Más ejemplos de cancelación:

$$\frac{a \cdot b \cdot c \cdot c \cdot c}{a \cdot a \cdot c} = \frac{\cancel{a} \cdot b \cdot \cancel{c} \cdot c \cdot c}{\cancel{a} \cdot a \cdot \cancel{c}} = \frac{b \cdot c \cdot c}{a} = \frac{bc^2}{a}$$

Condición: solo se pueden cancelar factores multiplicativos, nunca sumandos.

Ejemplos — simplificación con letras y números

Ej. 1. Simplificar $\dfrac{a \cdot a \cdot a \cdot b \cdot b}{a \cdot b}$

Cancelamos un a y un b del denominador con el numerador:

$$\frac{\cancel{a} \cdot a \cdot a \cdot \cancel{b} \cdot b}{\cancel{a} \cdot \cancel{b}} = a \cdot a \cdot b = a^2 b$$

Conclusión: $a^2 b$.

Ej. 2. Simplificar $\dfrac{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}{3 \cdot 3}$

De los 5 factores en el numerador, 2 se cancelan con los del denominador:

$$\frac{\cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}{\cancel{3} \cdot \cancel{3}} = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$$

Conclusión: 27. (*Nota:* $3^5 \div 3^2 = 3^3 = 27$. *Esto motivará P2.*)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 3. Simplificar $\dfrac{x \cdot x \cdot x \cdot y \cdot y \cdot y}{x \cdot y \cdot y}$

Cancelamos 1 factor x y 2 factores y:

$$\frac{\cancel{x} \cdot x \cdot x \cdot \cancel{y} \cdot \cancel{y} \cdot y}{\cancel{x} \cdot \cancel{y} \cdot \cancel{y}} = x^2 y$$

Conclusión: $x^2 y$.

Practica inmediata ★ — Simplifica cancelando factores comunes:

a) $\dfrac{a \cdot a \cdot a \cdot b}{a \cdot b}$

b) $\dfrac{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}{5 \cdot 5 \cdot 5}$

c) $\dfrac{x \cdot x \cdot y \cdot y \cdot y}{x \cdot y}$

d) $\dfrac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 3}$

e) $\dfrac{m \cdot m \cdot m \cdot n \cdot n}{m \cdot m \cdot n}$

f) $\dfrac{a \cdot a \cdot b \cdot b \cdot b \cdot c}{a \cdot b \cdot c \cdot c}$

2.1 P1 — Multiplicación de potencias de igual base

¿Qué ocurre si multiplicamos $a^m \cdot a^n$? Escribamos ambas potencias como productos explícitos y contemos los factores:

$$a^m \cdot a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{m \text{ factores}} \cdot \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores}} = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{m+n \text{ factores}} = a^{m+n}$$

P1 — Multiplicación de potencias de igual base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Deducción: el producto de dos potencias de la misma base equivale a poner todos los factores juntos. En total hay $m + n$ factores, luego el resultado es a^{m+n}.
Condición: la base debe ser la misma. Se puede extender a más de dos factores: $a^m \cdot a^n \cdot a^p = a^{m+n+p}$.

Error frecuente — multiplicar las bases o los exponentes

Al aplicar P1, los exponentes se suman. La base no cambia y los exponentes no se multiplican.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \textbf{nunca} \qquad (a \cdot a)^{mn} \text{ ni } a^{mn}$$

Contraejemplo: $3^2 \cdot 3^3 = 3^5 = 243$, pero $(3 \cdot 3)^{2 \cdot 3} = 9^6 = 531{,}441 \neq 243$.
Además, P1 solo aplica cuando las bases son iguales: $a^m \cdot b^n$ **no se puede simplificar** con P1 si $a \neq b$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos — P1

Ej. 1. Calcular $5^3 \cdot 5^4$

Misma base 5; sumar exponentes:

$$5^3 \cdot 5^4 = 5^{3+4} = 5^7 = 78{,}125$$

Verificación con producto explícito: $5^3 = 125$, $5^4 = 625$; $125 \cdot 625 = 78{,}125$. ✓

Ej. 2. Simplificar $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^4$

Misma base $\left(-\frac{2}{3}\right)$:

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^{3+2+4} = \left(-\frac{2}{3}\right)^9$$

Base negativa, exponente impar ⇒ negativo:

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^9 = -\frac{2^9}{3^9} = -\frac{512}{19{,}683}$$

Conclusión: $-\frac{512}{19{,}683}$.

Ej. 3. Simplificar $a^5 \cdot a^{-8} \cdot a^5$

$$a^5 \cdot a^{-8} \cdot a^5 = a^{5+(-8)+5} = a^2$$

Conclusión: a^2. (*Nota: el exponente negativo ya aparece naturalmente por P1. Lo justificaremos en el Corolario 2.*)

Practica inmediata ★ — Escribe como una sola potencia:

a) $5^3 \cdot 5^4$
b) $6^3 \cdot 6^2$
c) $9^4 \cdot 9^7$
d) $7^2 \cdot 7^3 \cdot 7^2$
e) $a^5 \cdot a^3 \cdot a^2$
f) $m^p \cdot m^3 \cdot m^4$
g) $(xy)^5 \cdot (xy)^3$
h) $2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^5$

2.2 P2 — División de potencias de igual base

¿Qué ocurre si dividimos $a^m \div a^n$ cuando $m > n$? Escribimos ambas como productos y cancelamos:

$$\frac{a^m}{a^n} = \frac{\overbrace{a \cdot a \cdots a}^{m}}{\underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n}} = \frac{\cancel{a} \cdots \cancel{a} \cdot a \cdots a}{\cancel{a} \cdots \cancel{a}} = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{m-n} = a^{m-n}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Se cancelan exactamente n factores, quedando $m - n$ factores en el numerador.

P2 — División de potencias de igual base

$$a^m \div a^n = a^{m-n} \qquad (a \neq 0)$$

Deducción: los n factores del denominador se cancelan con n de los m factores del numerador. Quedan $m - n$ factores $\Rightarrow a^{m-n}$.
Esta propiedad vale para cualquier par de enteros m, n, incluyendo $m < n$ (dará exponente negativo) y $m = n$ (dará exponente cero).

Corolario 1 — Demostración de $a^0 = 1$:

Si tomamos $m = n$ en P2:

$$a^n : a^n = a^{n-n} = a^0$$

Pero $a^n : a^n = \dfrac{a^n}{a^n} = 1$ (cualquier número dividido por sí mismo es 1, con $a \neq 0$).

Por lo tanto: $\boxed{a^0 = 1}$ para todo $a \neq 0$.

Corolario 2 — Definición de exponente negativo:

Si tomamos $m < n$ en P2, por ejemplo $m = 0$:

$$a^0 \div a^n = a^{0-n} = a^{-n}$$

Pero $a^0 \div a^n = \dfrac{1}{a^n}$ (usando el Corolario 1 y la definición de cociente).

Por lo tanto: $\boxed{a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}}$ para todo $a \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$.

Exponente negativo — propiedad deducida

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad \text{y} \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n \qquad (a \neq 0,\ b \neq 0)$$

Interpretación: el exponente negativo produce el inverso multiplicativo. Para una fracción elevada a un exponente negativo, basta darle vuelta a la fracción y cambiar el signo del exponente.

Error frecuente — $a^{-n} \neq -a^n$

El exponente negativo produce un **inverso** (fracción), nunca un número negativo.

$$8^{-3} = \frac{1}{8^3} = \frac{1}{512} \qquad \textbf{nunca} \qquad -8^3 = -512$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

La confusión surge de leer el signo $-$ del exponente como signo del resultado.

Ejemplos — P2 y exponente negativo

Ej. 1. $7^9 \div 7^4$ tiene la misma base, por lo tanto se restan los exponentes:

$$7^9 \div 7^4 = 7^{9-4} = 7^5 = 16{,}807$$

Conclusión: 16,807.

Ej. 2. $5^3 \div 5^7$ también tiene la misma base; el exponente resultante queda negativo:

$$5^3 \div 5^7 = 5^{3-7} = 5^{-4} = \frac{1}{5^4} = \frac{1}{625}$$

Conclusión: $\frac{1}{625}$.

Ej. 3. 8^{-3} tiene exponente negativo, lo que equivale al inverso de 8^3:

$$8^{-3} = \frac{1}{8^3} = \frac{1}{512}$$

Conclusión: $\frac{1}{512}$.

Ej. 4. Para $\left(\frac{3}{2}\right)^{-4}$ se invierte la fracción y se cambia el signo del exponente:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{-4} = \left(\frac{2}{3}\right)^{4} = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81}$$

Conclusión: $\frac{16}{81}$.

Ej. 5. $(0{,}8)^7 \div (0{,}8)^5$ tiene la misma base; se restan los exponentes y se calcula:

$$(0{,}8)^7 \div (0{,}8)^5 = (0{,}8)^{7-5} = (0{,}8)^2 = 0{,}64$$

Conclusión: 0,64.

Practica inmediata ★ — División e interpretar exponente negativo:

a) $7^{12} \div 7^8$

b) $15^8 \div 15^5$

c) $2^3 \div 2^7$

d) $5^2 \div 5^6$

e) 3^{-2}

f) 4^{-3}

g) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

h) 10^{-4}

 Prohibida su reproducción total o parcial.

2.3 P3 — Potencia de una potencia

¿Qué es $(a^m)^n$? Es a^m multiplicado por sí mismo n veces. Aplicando P1 repetidamente:

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \cdot a^m \cdots a^m}_{n} = a^{\overbrace{m+m+\cdots+m}^{n}} = a^{m\cdot n}$$

P3 — Potencia de una potencia

$$(a^m)^n = a^{m\cdot n}$$

Deducción: elevar a^m a la n significa escribir a^m como factor n veces y aplicar P1, sumando el exponente m exactamente n veces, lo que da $m \cdot n$.

Ejemplos — P3

Ej. 1. $\left(\left(\frac{3}{4}\right)^3\right)^2 = \left(\frac{3}{4}\right)^{3\cdot 2} = \left(\frac{3}{4}\right)^6 = \frac{3^6}{4^6} = \frac{729}{4{,}096}$. **Conclusión:** $\frac{729}{4{,}096}$.

Ej. 2. Verificación de P3 con P1:

$$\left((a^3)^2\right) = a^3 \cdot a^3 = a^{3+3} = a^6 = a^{3\cdot 2}\checkmark$$

Ej. 3. $((a^3)^{a+2})^a = a^{3(a+2)\cdot a} = a^{3a^2+6a}$. **Conclusión:** a^{3a^2+6a}.

Practica inmediata ★ — Escribe como potencia de un solo exponente:

a) $(8^3)^4$
b) $((-3)^4)^3$
c) $((2)^5)^3$
d) $((1{,}5)^2)^5$
e) $((a^2)^3)^4$
f) $((p^{-1})^2)^3$
g) $((x^3)^{a+2})^a$
h) $(((b)^2)^3)^4$

2.4 P4 — Multiplicación de potencias de igual exponente

¿Qué es $a^n \cdot b^n$? Escribimos ambas como productos y reorganizamos los factores:

$$a^n \cdot b^n = \underbrace{(a \cdot a \cdots a)}_{n} \cdot \underbrace{(b \cdot b \cdots b)}_{n} = \underbrace{(a \cdot b) \cdot (a \cdot b) \cdots (a \cdot b)}_{n} = (ab)^n$$

La reorganización es válida por la conmutatividad de la multiplicación.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

P4 — Multiplicación de potencias de igual exponente

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

Deducción: reorganizar los $2n$ factores formando n grupos de $(a \cdot b)$ produce el producto $(a \cdot b)$ repetido n veces.

Error frecuente — confundir P1 con P4

P1 requiere *misma base, distintos exponentes*: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.
P4 requiere *mismo exponente, distintas bases*: $a^n \cdot b^n = (ab)^n$.
Si ni la base ni el exponente coinciden — como $a^3 \cdot b^5$ — **ninguna de las dos aplica** y la expresión no se puede simplificar.

Ejemplos — P4

Ej. 1. $3^2 \cdot 4^2 = (3 \cdot 4)^2 = 12^2 = 144$. **Conclusión:** 144.

Ej. 2. $(1{,}2)^4 \cdot (0{,}3)^4 = (1{,}2 \cdot 0{,}3)^4 = (0{,}36)^4$. **Conclusión:** $(0{,}36)^4$.

Ej. 3. $(-2)^5 \cdot 3^5 = (-2 \cdot 3)^5 = (-6)^5 = -7{,}776$. **Conclusión:** $-7{,}776$.

Practica inmediata ★ — Escribe como potencia de un solo producto:

a) $2^5 \cdot 3^5$
b) $3^8 \cdot 7^8$
c) $(-4)^3 \cdot 5^3$
d) $a^n \cdot b^n$
e) $(2x)^3 \cdot y^3$
f) $(-x)^5 \cdot y^5 \cdot (-z)^5$

2.5 P5 — División de potencias de igual exponente

De manera análoga a P4, dividir potencias del mismo exponente reorganiza los cocientes:

$$a^n \div b^n = \frac{\overbrace{a \cdot a \cdots a}^{n}}{\underbrace{b \cdot b \cdots b}_{n}} = \underbrace{\frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdots \frac{a}{b}}_{n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

P5 — División de potencias de igual exponente

$$a^n \div b^n = \left(\frac{a}{b}\right)^n \qquad (b \neq 0)$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos — P5

Ej. 1. $12^7 \div 6^7 = (12 \div 6)^7 = 2^7 = 128$. **Conclusión:** 128.

Ej. 2. $(-15)^3 \div 5^3 = (-15 \div 5)^3 = (-3)^3 = -27$. **Conclusión:** -27.

Practica inmediata ★

a) $18^3 \div 9^3$ b) $(-20)^4 \div 4^4$ c) $32^5 \div (-8)^5$ d) $27^4 \div 3^4$

2.6 P6 — Potencia de un cociente

Esta propiedad se deduce directamente de P5 (o equivalentemente de P4 y la definición de potencia negativa):

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = (a \cdot b^{-1})^n = a^n \cdot (b^{-1})^n = a^n \cdot b^{-n} = \frac{a^n}{b^n}$$

P6 — Potencia de un cociente

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \qquad (b \neq 0)$$

En palabras: elevar una fracción a la n equivale a elevar por separado el numerador y el denominador. Esta propiedad es la que formaliza lo que calculamos directamente en la Sección 1 para la base racional.

Ejemplos — P6

Ej. 1. $\left(\frac{3}{5}\right)^4 = \frac{3^4}{5^4} = \frac{81}{625}$. **Conclusión:** $\frac{81}{625}$.

Ej. 2. $\left(-\frac{3}{2}\right)^{-4} = \left(-\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{(-2)^4}{3^4} = \frac{16}{81}$. **Conclusión:** $\frac{16}{81}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Tabla resumen — Las seis propiedades

Prop.	Fórmula	Condición	Clave
P1	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	misma base	sumar exponentes
P2	$a^m \div a^n = a^{m-n}$	misma base, $a \neq 0$	restar exponentes
	$\Rightarrow a^0 = 1,\ a^{-n} = 1/a^n$	$a \neq 0$	corolarios de P2
P3	$(a^m)^n = a^{mn}$		multiplicar exponentes
P4	$a^n \cdot b^n = (ab)^n$	mismo exponente	combinar bases
P5	$a^n \div b^n = (a/b)^n$	mismo exp., $b \neq 0$	cociente de bases
P6	$(a/b)^n = a^n/b^n$	$b \neq 0$	distribuir en fracción

No es propiedad: $(a+b)^n \neq a^n + b^n$. Las propiedades P1–P6 aplican a productos y cocientes, **nunca** a sumas ni restas.

Ejercicios propuestos

★ *(básico) — aplicar una propiedad a la vez*

1. Escribe como una sola potencia (P1):

a) $5^3 \cdot 5^4$
b) $6^3 \cdot 6^2$
c) $(-2)^6 \cdot (-2)^3 \cdot (-2)^2$
d) $\left(\frac{3}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^7$
e) $a^5 \cdot a^3 \cdot a^2$
f) $m^p \cdot m^2 \cdot m^4$
g) $(pq)^t \cdot (pq)^8 \cdot (pq)^s$
h) $2^x \cdot 2^3$

2. Escribe como una sola potencia (P2):

a) $7^{12} \div 7^8$
b) $15^8 \div 15^5$
c) $2^3 \div 2^7$
d) $8^5 \div 8^{-9}$
e) $(-3)^6 \div (-3)^4$
f) $(0{,}9)^9 \div (0{,}9)^3$
g) $a^4 \div a^6$
h) $q^{2a} \div q^a$

3. Escribe como potencia de un solo exponente (P3):

a) $(8^3)^4$
b) $((-3)^4)^3$
c) $((1{,}5)^2)^5$
d) $((a^3)^{a+2})^a$

4. Escribe como potencia de un producto (P4) o cociente (P5/P6):

a) $2^5 \cdot 3^5$
b) $(-4)^3 \cdot 5^3$
c) $18^3 \div 9^3$
d) $\left(\frac{5}{3}\right)^4$
e) $20^4 \div 4^4$
f) $\left(-\frac{2}{7}\right)^3$
g) $a^n \cdot b^n$
h) $32^3 \div (-2)^3$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

5. Expresa con exponente positivo usando el Corolario 2:

a) 2^{-5}

b) 3^{-3}

c) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

d) 10^{-4}

e) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-3}$

f) $(-2)^{-3}$

g) 7^{-2}

h) $\left(\frac{4}{7}\right)^{-2}$

★★ *(intermedio)*

6. Combina dos o más propiedades en cada expresión:

a) $\left(\frac{18^9}{6^9}\right)^3 \cdot (3^{-8} \cdot 3^{-4})^2$

b) $\left(-\frac{4}{5}\right)^5 \div \left(-\frac{4}{5}\right)^9$

c) $(-2{,}6)^{-5} \cdot (0{,}4)^{-5} \cdot (-1{,}5)^{-5}$

d) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-5} \div \left(\frac{4}{15}\right)^{-5} \div \left(\frac{9}{6}\right)^{-5}$

7. Reduce y expresa con exponentes positivos:

a) $\dfrac{6x^{-2}y^3}{(18x^7y^{-4}z)^{-2}}$

b) $\left(\dfrac{a^3b^{-5}c^2}{a^4d^8}\right) \div \left(\dfrac{ab^5c^{-4}}{b^7d^5}\right)$

c) $\dfrac{4a^7b^6}{d^3} \cdot \dfrac{3d^5b^{-4}}{16a^3} \cdot \dfrac{(2a^2c^5)^3}{6c^8d^6}$

★★★ *(avanzado)*

8. Simplifica completamente:

a) $\dfrac{2^{15} \cdot 16^{-3} \cdot 27 \cdot 24^2 \cdot 9}{3^6 \cdot 54 \cdot 32^{-1} \cdot 81^{-2}}$

b) $\dfrac{5^8 \cdot 25^{-2} \cdot 16^{-3} \cdot 4^2}{64^{-1} \cdot 125^2 \cdot 625^{-1} \cdot 256^{-1}}$

c) $\dfrac{(x^3y)^2}{[x^{-3}(y^2)^{-1}]^{-1}} \cdot \dfrac{(x^2)^4}{(y^{-2} \div y^{-5})^2}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 3 · Operaciones combinadas con potencias

3.1 Prioridad de operaciones con potencias

Cuando una expresión combina sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias, hay un orden estricto de evaluación.

Orden de prioridad

1. **Paréntesis**: de adentro hacia afuera.
2. **Potencias**: antes que cualquier otra operación.
3. **Multiplicación y división**: de izquierda a derecha.
4. **Suma y resta**: de izquierda a derecha.

Consecuencia: $3 + 4^2 = 3 + 16 = 19$, no $(3 + 4)^2 = 49$.

Ejemplo resuelto — operaciones combinadas

Ej. 1. Calcular $\left(\frac{1}{2} - \frac{4}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{4}{3}\right)^{-2}$

Paso 1 — resolver los paréntesis:

$$\frac{1}{2} - \frac{4}{3} = \frac{3-8}{6} = -\frac{5}{6} \qquad \frac{1}{2} + \frac{4}{3} = \frac{3+8}{6} = \frac{11}{6}$$

Paso 2 — aplicar P4 (igual exponente -2):

$$\left(-\frac{5}{6}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{11}{6}\right)^{-2} = \left(-\frac{5}{6} \cdot \frac{11}{6}\right)^{-2} = \left(-\frac{55}{36}\right)^{-2} = \left(-\frac{36}{55}\right)^{2} = \frac{1{,}296}{3{,}025}$$

Conclusión: $\frac{1{,}296}{3{,}025}$.

Practica inmediata ★★

a) $\left(\frac{18^9}{6^9}\right)^3 \cdot (3^{-8} \cdot 3^{-4})^2$

b) $\left(\frac{1}{2} - \frac{4}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{4}{3}\right)^{-2}$

3.2 Expresiones numéricas con varias propiedades

 Prohibida su reproducción total o parcial.

La estrategia es identificar qué propiedad aplica a cada par de factores, operar en el orden correcto y simplificar hasta obtener una sola potencia o un número.

Ejemplos — varias propiedades combinadas

Ej. 1. Calcular $(18^9 \div 6^9)^3 \cdot (3^{-8} \cdot 3^{-4})^2$

Paso 1 — simplificar el primer factor con P5 y P3:

$$(18^9 \div 6^9)^3 = \left(\frac{18}{6}\right)^{9\cdot 3} = 3^{27}$$

... corrección: $(18^9 \div 6^9)^3 = ((18 \div 6)^9)^3 = (3^9)^3 = 3^{27}$

Paso 2 — simplificar el segundo factor con P1 y P3:

$$(3^{-8} \cdot 3^{-4})^2 = (3^{-8+(-4)})^2 = (3^{-12})^2 = 3^{-24}$$

Paso 3 — multiplicar con P1:

$$3^{27} \cdot 3^{-24} = 3^{27-24} = 3^3 = 27$$

Conclusión: 27.

Ej. 2. Reducir $\dfrac{y^0 \cdot y^{-1} \cdot (-y)^{-3}}{y^{-2} \cdot (-y)^2 \cdot (-y)^{-2}}$ **con exponentes positivos**

Numerador: $y^0 \cdot y^{-1} \cdot (-y)^{-3} = 1 \cdot y^{-1} \cdot (-1)^{-3} \cdot y^{-3} = -y^{-4}$

Denominador: $y^{-2} \cdot (-y)^2 \cdot (-y)^{-2} = y^{-2} \cdot y^2 \cdot y^{-2} = y^{-2}$ (los $(-1)^2$ y $(-1)^{-2}$ son ambos $+1$)

División: $\dfrac{-y^{-4}}{y^{-2}} = -y^{-4-(-2)} = -y^{-2} = -\dfrac{1}{y^2}$

Conclusión: $-\dfrac{1}{y^2}$.

Practica inmediata ★★ — Simplifica y expresa con exponentes positivos:

a) $[x^3 \cdot (-2x^2)^2]^3$

b) $\dfrac{y^0 \cdot y^{-1} \cdot (-y)^{-3}}{y^{-2} \cdot (-y)^2 \cdot (-y)^{-2}}$

c) $\dfrac{6x^{-2}y^3}{(18x^7y^{-4}z)^{-2}}$

d) $\left(\dfrac{a^3b^{-5}c^2}{a^4d^8}\right) \div \left(\dfrac{ab^5c^{-4}}{b^7d^5}\right)$

3.3 Exponentes literales

Cuando los exponentes contienen variables, se aplican exactamente las mismas propiedades — la única diferencia es que el resultado puede no simplificarse a un número.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos — exponentes literales

Ej. 1. $(-4)^{x+1} \cdot (-4)^5 \cdot (-4)^{3-4x}$: aplicar P1 sumando exponentes:

$$(-4)^{(x+1)+5+(3-4x)} = (-4)^{9-3x}$$

Conclusión: $(-4)^{9-3x}$.

Ej. 2. $(4xy)^{5+x} \cdot (4xy)^{-6+x-y} \cdot (4xy)^{x-2y} \cdot (4xy)^{3/4}$:

$$= (4xy)^{(5+x)+(-6+x-y)+(x-2y)+3/4} = (4xy)^{3x-3y-\frac{1}{4}}$$

Conclusión: $(4xy)^{3x-3y-1/4}$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula respetando la prioridad de operaciones:

a) $-5 \cdot 100 + 5 \cdot 10^{-1} - 5 \cdot 10^2$

b) $(-17)^0 + \left(-\dfrac{5}{12}\right)^0 - \left(\dfrac{x}{y}\right)^0$

c) $4^{-1} \cdot 4 - 4^0 + 1 - 32^0$

d) $\left(\dfrac{18^9}{6^9}\right)^3 \cdot (3^{-8} \cdot 3^{-4})^2$

★★ *(intermedio)*

2. Reduce y expresa con exponentes positivos:

a) $[x^3 \cdot (-2x^2)^2]^3$

b) $\dfrac{y^0 \cdot y^{-1} \cdot (-y)^{-3}}{y^{-2} \cdot (-y)^2 \cdot (-y)^{-2}}$

c) $\left(\dfrac{a^3b^{-5}c^2}{a^4d^8}\right) \div \left(\dfrac{ab^5c^{-4}}{b^7d^5}\right)$

d) $\dfrac{4a^7b^6}{d^3} \cdot \dfrac{3d^5b^{-4}}{16a^3} \cdot \dfrac{(2a^2c^5)^3}{6c^8d^6}$

3. Simplifica con exponentes literales:

a) $(-4)^{x+1} \cdot (-4)^5 \cdot (-4)^{3-4x}$

b) $r^{2s+t} \cdot r^{3t-2s} \cdot r^{t-2s}$

c) $(a+b)^4 \cdot (a+b)^{\frac{2a+4}{2}} \cdot (a+b)^{\frac{a}{2}}$

d) $(x^2-y)^{3-x} \cdot (x^2-y)^{y+6} \cdot (x^2-y)^{\frac{2-y}{4}}$

★★★ *(avanzado)*

4. Simplifica completamente:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\dfrac{2^{15}\cdot 16^{-3}\cdot 27\cdot 24^2\cdot 9}{3^6\cdot 54\cdot 32^{-1}\cdot 81^{-2}}$

b) $\dfrac{5^8\cdot 25^{-2}\cdot 16^{-3}\cdot 4^2}{64^{-1}\cdot 125^2\cdot 625^{-1}\cdot 256^{-1}}$

c) $\dfrac{(x^3y)^2}{[x^{-3}(y^2)^{-1}]^{-1}}\cdot\dfrac{(x^2)^4}{(y^{-2}\div y^{-5})^2}$

d) $(4xy)^{5+x}\cdot(4xy)^{-6+x-y}\cdot(4xy)^{x-2y}\cdot(4xy)^{3/4}$

3.4 Operatoria combinada de racionales con potencias

Los ejercicios de esta subsección mezclan operaciones con fracciones, decimales y potencias. La clave es aplicar siempre el orden correcto: paréntesis → potencias → multiplicación/división → suma/resta.

Ejemplo — de lo simple a lo complejo

Ej. 1. Calcular $\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^2$

Paso 1 — calcular cada potencia:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\qquad\qquad\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$$

Paso 2 — sumar con denominador común (m.c.m.$(4,9)=36$**):**

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{9}=\frac{9}{36}+\frac{4}{36}=\frac{13}{36}$$

Conclusión: $\frac{13}{36}$.

Ej. 2. Calcular $\left(\frac{2}{3}\right)^2\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}+\frac{5}{6}$

Paso 1 — potencias:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}\qquad\qquad\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}=\frac{4}{3}$$

Paso 2 — multiplicación:

$$\frac{4}{9}\cdot\frac{4}{3}=\frac{16}{27}$$

Paso 3 — suma (m.c.m.$(27,6)=54$**):**

$$\frac{16}{27}+\frac{5}{6}=\frac{32}{54}+\frac{45}{54}=\frac{77}{54}$$

Conclusión: $\frac{77}{54}$.

Practica inmediata ★★

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2$

b) $\left(\frac{2}{3}\right)^3 - \left(\frac{1}{4}\right)^2$

c) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$

d) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{6}\right)^1$

Ejercicios propuestos — Operatoria con racionales

★ *(básico)*

1. Calcula (solo potencias de fracciones y decimales):

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{4}\right)^2$

b) $\left(\frac{3}{5}\right)^2 - \left(\frac{1}{5}\right)^3$

c) $(0{,}5)^2 + (0{,}1)^3$

d) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{3}{4}$

e) $\frac{5}{6} - \left(\frac{1}{3}\right)^2$

f) $(0{,}2)^3 + (0{,}5)^2 - (0{,}1)^4$

★★ *(intermedio)*

2. Calcula aplicando el orden de prioridad completo:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{-1} + \frac{5}{6}$

b) $\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3$

c) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 \div \frac{4}{9}$

d) $\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

e) $\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3$

f) $\left(\frac{5}{6}\right)^2 \div \left(\frac{5}{12}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^0$

3. Operatoria combinada con decimales y fracciones:

a) $(0{,}5)^3 \cdot (1{,}2)^2 - (0{,}3)^2 \cdot (0{,}5)^2$

b) $\dfrac{(0{,}2)^3 + (0{,}4)^2}{(0{,}5)^2 - (0{,}1)^3}$

c) $(1{,}5)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^3 + \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

d) $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2\right]^2$

★★★ *(avanzado)*

4. Calcula exactamente, paso a paso:

a) $\left(\frac{1}{2} - \frac{4}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{4}{3}\right)^{-2}$

b) $\dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{6}\right)^2}{\left(\frac{3}{4}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

c) $\left[1+\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^3-\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^3$

d) $\dfrac{\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}\cdot\left(\frac{5}{6}\right)^3}{\left(\frac{5}{3}\right)^2\div\left(\frac{10}{9}\right)^3}-\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 4 · Notación científica

4.1 Potencias de base 10

Las potencias de base 10 tienen un patrón visual muy claro que permite leerlas de inmediato.

Potencias de base 10

Potencia	Valor	Prefijo SI	Potencia	Valor	Prefijo SI
10^6	1.000.000	mega (M)	10^{-1}	0,1	deci (d)
10^5	100.000	—	10^{-2}	0,01	centi (c)
10^4	10.000	—	10^{-3}	0,001	mili (m)
10^3	1.000	kilo (k)	10^{-4}	0,0001	—
10^2	100	hecto (h)	10^{-5}	0,00001	—
10^1	10	deca (da)	10^{-6}	0,000001	micro (μ)
10^0	1	—	10^{-9}	0,000000001	nano (n)

Regla de lectura:

- 10^n con $n > 0$: el dígito 1 seguido de n ceros.
- 10^{-n} con $n > 0$: el decimal 0,0...01 con $n - 1$ ceros antes del 1.

4.2 Definición y condición de la notación científica

Notación científica

Un número real x está en **notación científica** cuando se escribe en la forma:

$$x = a \cdot 10^n, \qquad \text{con } 1 \leq a < 10 \text{ y } n \in \mathbb{Z}$$

La condición $1 \leq a < 10$ exige que haya **exactamente un dígito distinto de cero antes de la coma**. El entero n puede ser positivo (número grande) o negativo (número pequeño).

4.3 Conversión decimal ↔ notación científica

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Técnica de conversión

De decimal a notación científica:
Contar cuántos lugares se desplaza la coma decimal para dejar un solo dígito antes de ella:

- Se desplaza a la **izquierda** n lugares $\Rightarrow$ n es **positivo**.
- Se desplaza a la **derecha** n lugares $\Rightarrow$ n es **negativo**.

De notación científica a decimal:
Mover la coma $|n|$ lugares en el sentido del signo de n.

Ejemplos — conversión

Ej. 1. Expresar 5,980,000,000,000,000,000,000,000 **en notación científica**
Contamos 24 desplazamientos a la izquierda:

$$5{,}980\ldots \times 10^{24} = 5{,}98 \cdot 10^{24}$$

Conclusión: $5{,}98 \cdot 10^{24}$.

Ej. 2. Expresar 0,0000000016 **en notación científica**
La coma se mueve 9 lugares a la derecha:

$$1{,}6 \cdot 10^{-9}$$

Conclusión: $1{,}6 \cdot 10^{-9}$.

Ej. 3. Expresar $5{,}9 \cdot 10^{-3}$ **en decimal**
Mover la coma 3 lugares a la izquierda: 0,0059. **Conclusión:** 0,0059.

Practica inmediata ★ — Convierte a notación científica:

a) 0,052
b) 5,200
c) 88,540
d) 0,0058
e) 1,005,000
f) 85,000,000
g) 0,0000548
h) 9,999,000

4.4 Operaciones en notación científica

Operaciones con notación científica

Multiplicación:

$$(a \cdot 10^m) \cdot (b \cdot 10^n) = (a \cdot b) \cdot 10^{m+n}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

División:

$$(a \cdot 10^m) \div (b \cdot 10^n) = \frac{a}{b} \cdot 10^{m-n}$$

Ajuste: si el coeficiente resultante no está en $[1, 10)$, se ajusta: si $a \cdot b \geq 10$, se escribe como $c \cdot 10^1$ con $1 \leq c < 10$, sumando 1 al exponente de la potencia.

Ejemplos — operaciones en notación científica

Ej. 1. Calcular $\dfrac{0{,}8 \cdot 16{,}000{,}000}{0{,}0004 \cdot 0{,}032}$

Paso 1 — convertir cada factor:

$$0{,}8 = 8 \cdot 10^{-1}, \quad 16{,}000{,}000 = 1{,}6 \cdot 10^7, \quad 0{,}0004 = 4 \cdot 10^{-4}, \quad 0{,}032 = 3{,}2 \cdot 10^{-2}$$

Paso 2 — agrupar coeficientes y potencias:

$$\frac{8 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-1} \cdot 10^7}{4 \cdot 3{,}2 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-2}} = \frac{12{,}8 \cdot 10^6}{12{,}8 \cdot 10^{-6}} = 1 \cdot 10^{6-(-6)} = 10^{12}$$

Conclusión: $10^{12} = 1{,}000{,}000{,}000{,}000$.

Ej. 2. Calcular $0{,}000408 \cdot 0{,}00000002$

$4{,}08 \cdot 10^{-4} \cdot 2 \cdot 10^{-8} = 8{,}16 \cdot 10^{-12}$.

Conclusión: $8{,}16 \cdot 10^{-12}$.

Practica inmediata ★★ — Opera y expresa en notación científica:

a) $0{,}000408 \cdot 0{,}00000002$

b) $9{,}05 \cdot 0{,}0000006$

c) $\dfrac{25{,}000 \cdot 3{,}100}{5{,}000{,}000}$

d) $\dfrac{0{,}08 \cdot 16{,}000{,}000}{0{,}0004 \cdot 0{,}032}$

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Escribe en notación científica:

a) 0,052
b) 5,200
c) 88,540
d) 0,0058
e) 1,005,000
f) 85,000,000
g) 23,200,000
h) 0,00000007
i) 15,050,000,000
j) 0,000854
k) 3,333,000
l) 0,003333

 Prohibida su reproducción total o parcial.

2. Escribe en forma decimal:

a) $5{,}9 \cdot 10^{-3}$
b) $1{,}006 \cdot 10^{5}$
c) $9{,}999 \cdot 10^{3}$
d) $4{,}007 \cdot 10^{9}$
e) $5{,}14 \cdot 10^{-4}$
f) $7{,}28 \cdot 10^{-7}$
g) $1{,}001 \cdot 10^{3}$
h) $5{,}014 \cdot 10^{2}$
i) $1{,}1 \cdot 10^{-6}$
j) $7{,}83 \cdot 10^{4}$

★★ *(intermedio)*

3. Calcula y expresa en notación científica:

a) $0{,}000408 \cdot 0{,}00000002$
b) $9{,}05 \cdot 0{,}0000006$
c) $3{,}0002 \cdot (0{,}0001)^{3}$
d) $\dfrac{25{,}000 \cdot 3{,}100}{5{,}000{,}000}$
e) $\dfrac{0{,}08 \cdot 16{,}000{,}000}{0{,}0004 \cdot 0{,}032}$
f) $\dfrac{0{,}000075 \cdot 0{,}000000025}{0{,}015 \cdot 0{,}00001}$

★★★ *(avanzado)*

4. Resuelve usando potencias y notación científica:

a) El peso de un átomo de plutonio es $3{,}9 \cdot 10^{-22}$ g. ¿Cuántos átomos se necesitan para tener 1 kg?
b) La velocidad de la luz es 300.000 km por segundo. ¿Qué distancia recorre un haz de luz en 1 año? (1 año $\approx 3{,}15 \cdot 10^{7}$ segundos.)
c) Cierto tipo de bacteria se reproduce de forma que cada 20 minutos se divide en 2. Si se comienza con una bacteria, ¿cuántas habrá luego de 3 horas?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 5 · Potencias con exponente racional: el puente hacia las raíces

5.1 Motivación: ¿qué debe significar $a^{1/2}$?

Hasta ahora los exponentes son enteros. ¿Qué significado puede tener un exponente fraccionario? La respuesta se deduce exigiendo que la propiedad P3 siga funcionando:

$$(a^{1/2})^2 = a^{(1/2)\cdot 2} = a^1 = a$$

Es decir, $a^{1/2}$ elevado al cuadrado debe dar a. Eso es exactamente la definición de raíz cuadrada: $a^{1/2} = \sqrt{a}$.

Generalizando con P3:

$$(a^{1/n})^n = a^{(1/n)\cdot n} = a \quad \Longrightarrow \quad a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$



5.2 Definición formal

Potencia de exponente racional

Para $a \geq 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $m \in \mathbb{Z}$:

$$\boxed{a^{1/n} = \sqrt[n]{a}} \qquad \text{y} \qquad \boxed{a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m}$$

Condiciones de existencia en $\mathbb{R}$:

- n par: se requiere $a \geq 0$.
- n impar: a puede ser cualquier real.

Exponente racional negativo: $a^{-m/n} = \dfrac{1}{a^{m/n}} = \dfrac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$.
Las seis propiedades P1–P6 se extienden sin modificación al caso del exponente racional.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Error frecuente — leer mal el exponente

El denominador del exponente es el índice de la raíz:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{1/6} = \sqrt[6]{\frac{2}{3}} \qquad \textbf{no} \qquad \sqrt[5]{\frac{2}{3}}$$

Consejo: para calcular $a^{m/n}$, conviene primero extraer la raíz y luego elevar: $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$.

Ejemplos — exponente racional

Ej. 1. $81^{3/4}$: primero la raíz $\sqrt[4]{81} = 3$ (pues $3^4 = 81$), luego $3^3 = 27$. **Conclusión:** 27.

Ej. 2. $32^{3/5}$: $\sqrt[5]{32} = 2$ (pues $2^5 = 32$), luego $2^3 = 8$. **Conclusión:** 8.

Ej. 3. $125^{-2/3}$: $\sqrt[3]{125} = 5$, luego $5^{-2} = \frac{1}{25}$. **Conclusión:** $\frac{1}{25}$.

Practica inmediata ★ — Calcula (primero la raíz, luego la potencia):

a) $8^{2/3}$
b) $16^{3/4}$
c) $27^{2/3}$
d) $32^{3/5}$
e) $64^{5/6}$
f) $4^{3/2}$
g) $125^{-2/3}$
h) $243^{4/5}$

5.3 Conversión entre los tres registros

La equivalencia $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ conecta tres representaciones que describen el mismo objeto.

Los tres registros — tabla de equivalencias

Potencia racional	Raíz	Valor (si calculable)
$9^{1/2}$	$\sqrt{9}$	3
$8^{1/3}$	$\sqrt[3]{8}$	2
$81^{3/4}$	$\sqrt[4]{81^3} = (\sqrt[4]{81})^3$	27
$125^{-1/3}$	$\frac{1}{\sqrt[3]{125}}$	$\frac{1}{5}$
$y^{5/7}$	$\sqrt[7]{y^5}$	depende de y
$(3x^2)^{3/4}$	$\sqrt[4]{(3x^2)^3}$	depende de x

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplos — conversión entre registros

Ej. 1. $\sqrt[7]{y^5} = y^{5/7}$ — índice al denominador, exponente al numerador.

Ej. 2. $m^{-5/3} = \dfrac{1}{m^{5/3}} = \dfrac{1}{\sqrt[3]{m^5}}$ — exponente negativo al denominador.

Ej. 3. $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}} = a^{3/4-1/4} = a^{2/4} = a^{1/2} = \sqrt{a}$ — P2 con exponentes racionales.

Nota sobre continuación: el exponente racional es la puerta de entrada al estudio de las raíces. Para trabajar las raíces en profundidad —incluyendo simplificación, propiedades, racionalización y ecuaciones— ver la *Guía de Raíces — Academia Zenit*.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Expresa como raíz:

a) $5^{1/3}$
b) $81^{3/4}$
c) $a^{1/2}$
d) $m^{-5/3}$
e) $(-27)^{1/5}$
f) $125^{-1/3}$
g) $(3x^2)^{3/4}$
h) $(2-x)^{1/2}$

2. Expresa como potencia racional:

a) $\sqrt{17}$
b) $\sqrt[4]{25}$
c) $\sqrt[3]{11^2}$
d) $\sqrt[7]{y^5}$
e) $\sqrt[4]{(3x^2)^3}$
f) $\sqrt[5]{(-27)^2}$

3. Calcula (primero la raíz, luego eleva):

a) $8^{2/3}$
b) $16^{3/4}$
c) $27^{2/3}$
d) $32^{3/5}$
e) $64^{5/6}$
f) $243^{4/5}$
g) $125^{-2/3}$
h) $81^{-3/4}$
i) $4^{3/2}$

★★ *(intermedio)*

4. Simplifica usando propiedades de potencias racionales:

a) $a^{1/2} \cdot a^{3/2}$
b) $(a^{2/3})^6$
c) $\dfrac{x^{5/3}}{x^{2/3}}$
d) $(4a^2)^{1/2}$
e) $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}}$
f) $x^{1/2} \cdot x^{2/3} \cdot x^{1/6}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

★★★ *(avanzado)*

5. Si $4^{3/2} = 8^x$, determina x sin calculadora. Muestra el razonamiento.

6. Demuestra que $(a \cdot b)^{m/n} = a^{m/n} \cdot b^{m/n}$ para $a, b > 0$, usando la equivalencia con raíces.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección Final · Ecuaciones con potencias y aplicaciones

Estrategia para resolver ecuaciones con potencias

Dos tipos de ecuaciones

Tipo 1 — $x^n = b$ (incógnita en la base):
Aplicar la raíz n-ésima a ambos lados: $x = b^{1/n} = \sqrt[n]{b}$. Recordar las condiciones de existencia.
Tipo 2 — $a^x = b$ (incógnita en el exponente, misma base):
Expresar b como potencia de a: si $b = a^k$, entonces $a^x = a^k \Rightarrow x = k$.

Ejemplos

Ej. 1. Resolver $x^3 = 512$

Paso 1 — aplicar raíz cúbica:

$$x = \sqrt[3]{512} = 8 \qquad \text{pues } 8^3 = 512$$

Verificación: $8^3 = 512$. ✓ **Conclusión:** $x = 8$.

Ej. 2. Resolver $2^x = 128$

Paso 1 — expresar 128 como potencia de 2:

$$128 = 2^7$$

Paso 2 — igualar exponentes:

$$2^x = 2^7 \quad \Rightarrow \quad x = 7$$

Verificación: $2^7 = 128$. ✓ **Conclusión:** $x = 7$.

Ej. 3. Resolver $\left(\frac{1}{3}\right)^x = 27$

Paso 1 — expresar ambos lados con base 3:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = (3^{-1})^x = 3^{-x} \qquad \text{y} \qquad 27 = 3^3$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 2 — igualar exponentes:

$$3^{-x} = 3^3 \quad \Rightarrow \quad -x = 3 \quad \Rightarrow \quad x = -3$$

Verificación: $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} = 3^3 = 27.$ ✓ **Conclusión:** $x = -3$.

Ej. 4. Problema de crecimiento — Una población de bacterias se duplica cada 20 minutos. ¿Cuántas habrá tras 3 horas partiendo de una?

Paso 1 — calcular el número de períodos:

$$3 \text{ horas} = 180 \text{ min} \quad \Rightarrow \quad \text{períodos} = 180 \div 20 = 9$$

Paso 2 — aplicar el modelo de crecimiento:

$$N = 1 \cdot 2^9 = 512 \text{ bacterias}$$

Conclusión: habrá 512 bacterias tras 3 horas.

Ejercicios con alternativas

1. El valor de $\left(\frac{18^9}{6^9}\right)^3 \cdot (3^{-8} \cdot 3^{-4})^2$ es:

A) 27

B) 9

C) 81

D) 3

2. Si $a^m \cdot a^{-3} = a^5$, entonces m es:

A) 2

B) 8

C) -2

D) 15

 Prohibida su reproducción total o parcial.

3. ¿Cuál es el valor de $2^{-3} + 4^{-1} + 8^0$?

A) $\dfrac{11}{8}$
B) $\dfrac{3}{8}$
C) 2
D) $\dfrac{13}{8}$

4. En notación científica, 0,00000728 se escribe:

A) $7{,}28 \cdot 10^{-6}$
B) $7{,}28 \cdot 10^{6}$
C) $72{,}8 \cdot 10^{-7}$
D) $7{,}28 \cdot 10^{-7}$

5. El valor de $81^{3/4}$ es:

A) 27
B) 9
C) 243
D) 3

6. ¿Cuál expresión es equivalente a $\left(\dfrac{3}{2}\right)^{-4}$?

A) $\dfrac{16}{81}$
B) $-\dfrac{81}{16}$
C) $\dfrac{81}{16}$
D) $-\dfrac{16}{81}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

7. Si $3^x = 243$, entonces x es:

A) 4

B) 5

C) 6

D) 3

8. El valor de $(-1)^{2025} + (-1)^{2026}$ es:

A) 0

B) 2

C) -2

D) 1

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios de desarrollo

★ *(básico)*

1. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $x^2 = 49$

b) $x^3 = 27$

c) $x^4 = 16$

d) $x^2 = \dfrac{25}{4}$

e) $x^3 = -125$

f) $x^5 = 32$

g) $2^x = 16$

h) $3^x = 81$

i) $5^x = 125$

j) $2^x = \dfrac{1}{8}$

★★ *(intermedio)*

2. Resuelve:

a) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x = 32$

b) $4^x = 8$

c) $9^x = 27$

d) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^x = \dfrac{27}{8}$

3. Problemas de aplicación:

a) El cubo de un número es 8.000. Calcula el cubo del doble de ese número.

b) Una caja contiene 9 rollos y cada uno tiene 9 metros de tela. Si hay 9 cajas, ¿cuántos metros hay en total? Exprésalo como potencia.

c) Andrea llama a 2 amigas y les pide que cada una llame a 3 amigas más, y así sucesivamente. ¿Cuántas llamadas se realizan en el sexto nivel?

d) Don Omar ahorra \$5 el primer mes y cada mes ahorra 5 veces lo del mes anterior. ¿Cuánto ahorra al séptimo mes?

★★★ *(avanzado)*

4. Si $x^9 = 19{,}683$ y $x^8 = 6{,}561$, ¿qué número es x?

5. Cierto tipo de bacteria decrece a $\dfrac{1}{3}$ de su población por día. Si el lunes hay 19.683 bacterias, ¿qué día quedarán 27?

6. Una tienda liquida vendiéndose la mitad del stock cada semana sin reponer. Si había 512 artículos, ¿cuántas semanas hasta agotarse?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios tipo PAES

1. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $\left(x^3\right) \cdot \left(x^2\right)^4$?

A) x^9

B) x^{11}

C) x^{18}

D) x^{22}

2. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $\left(\frac{1}{3}\, b^{-3}\right)^{-2}$?

A) $\frac{1}{3}\, b^6$

B) $\frac{1}{3}\, b^{-5}$

C) $9b^{-5}$

D) $9b^6$

3. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $\frac{a^4 b^{-12}}{a^{-2} b^{-4}}$?

A) $a^2 b^{-16}$

B) $a^6 b^{-8}$

C) $a^6 b^8$

D) $a^{-6} b^8$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4. Si n es un número entero, ¿cuál de las siguientes igualdades es *siempre* verdadera?

A) $n^2 \cdot n^3 = n^6$

B) $n^4 - n^3 = n$

C) $2^n + 3^n = 5^n$

D) $2^n \cdot 3^n = 6^n$

5. ¿Cuál de las ecuaciones siguientes es exponencial?

A) $x^{-1} = 0{,}25$

B) $x^2 = 3$

C) $2^x = 3$

D) $\sqrt{2x} = \sqrt{3}$

6. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $\left(a^{-1} + a^{-2}\right) \cdot a^3$?

A) $a^{-3} + a^{-6}$

B) a^{-9}

C) a^{-6}

D) $a \cdot (a + 1)$

7. Si $a \# b = \dfrac{b - a^2}{3}$, $c * d = c^d$ y $2 * h = 64$, ¿cuál es el valor de $h \# 3$?

A) -11

B) -39

C) 11

D) 37

 Prohibida su reproducción total o parcial.

8. Si $5^r = a$ y $7^r = b$, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $5^{r+1} \cdot 7^{r+1}$?

A) $35ab$

B) ab^2

C) $(ab)^2$

D) $12ab$

9. Si $5^x = 125 \cdot 125$, entonces ¿cuál es el valor de x?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

10. Dada la ecuación $\left(\frac{1}{27}\right)^x = 9^3$, ¿cuál es el valor de x?

A) 2

B) -1

C) -2

D) -3

11. ¿Para qué valor de x se tiene que $11^{x-3} = 1$?

A) -3

B) 0

C) 1

D) 3

 Prohibida su reproducción total o parcial.

12. Si $2^{x+3} = 64$, entonces ¿cuál es el valor de 2^x?

A) 3

B) 5

C) 8

D) 9

13. Se sabe que un cultivo de bacterias se duplica cada 24 horas. Si al comienzo se partió con 1.000 bacterias, ¿al cabo de cuántos días la cantidad inicial se multiplicó por 64?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

14. ¿Qué valor se obtiene al calcular m en $2^{m-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{m-3}$?

A) -1

B) 0

C) 1

D) 2

15. ¿Cuál es la solución de la ecuación $(0{,}01)^{-x+5} = 100$?

A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

 Prohibida su reproducción total o parcial.

16. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa el valor de $\dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)^{-a} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{a}}{\left(\frac{9}{4}\right)^{a}}$?

A) 1

B) $\dfrac{3}{2}$

C) $\left(\dfrac{3}{2}\right)^{2}$

D) $\left(\dfrac{3}{2}\right)^{a^2}$

17. ¿Cuál de las siguientes alternativas es equivalente a $\dfrac{a^n + b^n}{(ab)^n}$?

A) $(ab)^{-n}$

B) $a^{-n} + b^{-n}$

C) $a^{-n} - b^{-n}$

D) $(-ab)^n$

18. Dada la ecuación $3^{x-1} = 9^5$, ¿cuál es el conjunto solución?

A) $\{9\}$

B) $\{11\}$

C) $\{6{,}11\}$

D) $\varnothing$

19. Dada la ecuación $25^{-3x} = \left(\dfrac{1}{125}\right)^{x+3}$, ¿cuál es el conjunto solución?

A) $\{-6\}$

B) $\{-3\}$

C) $\{0\}$

D) $\{3\}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

20. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación $1.000^x = 0{,}001$?

A) -1

B) -2

C) -3

D) 0,01

21. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación $\left(\frac{-1}{7}\right)^{-x} = 2.401 \cdot (-7)$?

A) -4

B) -3

C) 4

D) 5

22. Si $3^{2x} \cdot 9^x \cdot 27^{2x} = \frac{1}{81^5}$, entonces ¿cuál es el valor de $\frac{x}{2}$?

A) -4

B) -2

C) -1

D) 1

23. Dada la ecuación $\left(\frac{2}{3}\right)^{x-3} = \left(\frac{9}{4}\right)^{x+3}$, ¿cuál es el valor de x^2?

A) -1

B) 1

C) -3

D) 3

 Prohibida su reproducción total o parcial.

24. ¿Cuál es el valor de la expresión $\dfrac{2^{n+5}}{4 \cdot 2^{n+1}} + \dfrac{25^{n+1}}{5^{2n+1}}$?

A) $\dfrac{2}{5}$
B) 5
C) $\dfrac{8}{5}$
D) 9

25. Si $3^n = 2$, ¿cuál es el valor de la expresión $\dfrac{27^n + 4 \cdot 9^{n+1} - 2^3}{81^n}$?

A) 5
B) 7
C) 9
D) 11

26. ¿Cuál es el valor de la expresión $\dfrac{4 \cdot 18^t}{3^{-1} \cdot 6^{2t+1} \cdot 2^{-t}}$?

A) 2^t
B) $4 \cdot 2^t$
C) 2
D) 6

27. ¿Cuál es el valor de $\dfrac{A}{B}$, sabiendo que $A = \dfrac{8^3 \cdot 400}{21^2 \cdot 7}$ y $B = 20\left(\dfrac{4 \cdot 3^{-1}}{7}\right)^3$?

A) $2^5 \cdot 3 \cdot 5$
B) $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2$
C) $2^5 \cdot 6^3 \cdot 5$
D) $2^5 \cdot 3 \cdot 5^3$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

28. Una pizza costó \$ $\left(2^4 \cdot 5^3 \cdot 3^2\right)$. El primer comensal recibe $\frac{1}{4}$ de la pizza; cada comensal siguiente recibe la cuarta parte de lo que recibió el anterior. ¿Cuánto debe pagar quien estaba en 6° lugar, si el pago es proporcional al trozo recibido?

A) \$ $\left(2^3 \cdot 5^3 \cdot 3\right)$

B) \$ $\left(2^{-8} \cdot 5^3 \cdot 3^2\right)$

C) \$ $\left(2^5 \cdot 5^2 \cdot 3^{-8}\right)$

D) \$ $\left(2^7 \cdot 5^{-3} \cdot 3^2\right)$

29. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $\dfrac{5^{3n} + 5^{2n}}{5^{2n} + 5^n}$?

A) 5

B) 25

C) 5^n

D) 5^{2n}

30. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación $\left(\dfrac{3}{5}\right)^{x+2} = \left(\dfrac{125}{27}\right)^{-x+2}$?

A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del valor de $7^{22} - 7^{21}$ es verdadera?

A) El número es primo.

B) El número es múltiplo de 12.

C) El número es divisible por 14.

D) El número es divisible por 22.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

32. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación $\dfrac{3^{3x+8}+81^{\frac{3x+6}{4}}}{9^{x+3}}=90$?

A) 2

B) 4

C) 5

D) 6

33. Si $p=3^3+3^3+3^3$ y $q=9^6+9^6+9^6$, entonces $\dfrac{q}{p}$ es:

A) 3^3

B) 3^4

C) 3^9

D) 3^{14}

34. Tamara deja caer una pelota desde 9 metros de altura. Cada vez que da un bote alcanza $\dfrac{2}{3}$ de la altura anterior. ¿A qué altura llegará luego del quinto bote?

A) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^5$ metros

B) $\dfrac{2^5}{3^3}$ metros

C) $9\cdot\left(\dfrac{2}{3}\right)^4$ metros

D) $9\cdot\left(\dfrac{1}{3}\right)^5$ metros

 Prohibida su reproducción total o parcial.

35. Si $4^{x+y} = 32$ y $16^{\frac{x}{4}} = \dfrac{1}{4}$, entonces $x - y$ es igual a:

A) $-\dfrac{13}{2}$
B) -2
C) $\dfrac{5}{2}$
D) $\dfrac{9}{2}$

36. Si $5^a = x$ y $2^a = y$, ¿cuál es el valor de 20^a?

A) xy^2
B) $2xy^2$
C) $4xy$
D) $12xy$

37. Sea p un número racional tal que $-1 < p < 0$ y n es un entero impar mayor que cero. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el número menor?

A) $(2p)^{n+1}$
B) p^{n+1}
C) p^{2n}
D) p^{3n}
E) p^n

38. Una expresión equivalente a $3^{2n} - 3^{-2n} - \left(9^{\frac{n}{2}} + 9^{-\frac{n}{2}}\right)^2$ es:

A) $-2\left(3^{-2n} + 1\right)$
B) -2
C) $2\left(3^{-2n} + 1\right)$
D) 2
E) 0

 Prohibida su reproducción total o parcial.

39. Una población de caballos se duplica cada 3 años. Si P es la población inicial y t es la cantidad de años transcurridos, ¿cuál de las siguientes opciones representa la población a los t años?

A) $P \cdot 2^{3t}$

B) $P \cdot 2^{t}$

C) $P \cdot 2^{\frac{t}{3}}$

D) $P \cdot 3^{2t}$

E) $P \cdot 3^{\frac{t}{2}}$

40. Un estudio ha determinado que la salinidad del agua en un cierto lago aumenta a razón de un 8 % cada 3 metros de profundidad. Si la salinidad en la superficie es S %, ¿cuál función modela la salinidad a los d metros de profundidad (con d múltiplo de 3)?

A) $S \cdot (1 + 0{,}08)^{\frac{d}{3}}$

B) $S \cdot (1 + 0{,}03)^{8d}$

C) $S \cdot (1 - 0{,}08)^{\frac{d}{3}}$

D) $S \cdot (1 - 0{,}08)^{3d}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Solucionario

Nota sobre el solucionario

Resultado para ★; resultado + paso clave para ★★; resultado + procedimiento esencial para ★★★. La correspondencia número de ejercicio — solución es exacta.

Sección 1 — Concepto de potencia

Práctica 1.1: a) 64 b) 81 c) 125 d) 128 e) 10.000 f) 256 g) 1.024 h) 243 i) 1.296 j) 343.

Práctica 1.2 (exponente cero, 4 ítems): a) 1 b) 1 c) 1 d) $5^0 + 3^0 - 100^0 = 1 + 1 - 1 = 1$.

Práctica 1.3 (signo): a) 256 b) -729 c) 64 d) -81 e) 1 f) -1 g) -243 h) -16.

Práctica 1.4 (base racional): a) $\frac{1}{32}$ b) $\frac{27}{64}$ c) $\frac{16}{81}$ d) 0,125 e) $-\frac{1}{27}$ f) 0,0016 g) $\frac{1}{100{,}000}$ h) $-\frac{27}{8}$.

Ítem 1 (★): a) 64 b) 81 c) 49 d) 256 e) 625 f) 256 g) -729 h) 64 i) -81 j) -1 k) $\frac{1}{125}$ l) $-\frac{8}{27}$ m) $\frac{9}{16}$ n) 0,008 o) 0,0625.

Ítem 2 (★): a) $81+(-27) = 54$ b) $-32-16 = -48$ c) $1+(-1) = 0$ d) $-16+16 = 0$ e) $\frac{1}{16} - \frac{1}{8} = -\frac{1}{16}$ f) $0{,}001 - 0{,}0001 = 0{,}0009$.

Ítem 3 (★, V/F): a) Falsa: $(-5)^2 = 25$ y $-5^2 = -25$. b) Falsa: $3^0 = 1$, no 0. c) Verdadera: exponente par. d) Verdadera: $\frac{2\cdot2\cdot2}{3\cdot3\cdot3} = \frac{8}{27}$. e) Verdadera: $(-8) = -8$.

Ítem 4 (★★): a) $(-3)^4-(-2)^5+5^0\cdot4^0 = 81+32+1 = 114$ b) $-\frac{8}{27}+\frac{1}{16}+1$; m.c.m.(432): $\frac{-128+27+432}{432} = \frac{331}{432}$ c) $0 + 16 = 16$ d) $\frac{1}{81} + \frac{1}{8} + \frac{4}{25}$; m.c.m.(1800): $\frac{200+225+288}{1800} = \frac{713}{1800}$.

Ítem 5 (★★★): $2^n < 100$: $n \leq 6$ (pues $2^6 = 64 < 100 < 128 = 2^7$). $3^n < 1000$: $n \leq 6$ (pues $3^6 = 729 < 1000 < 2187 = 3^7$). Ambas: $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Ítem 6 (★★★): $(-1)^n = 1$ cuando n es par; $(-1)^n = -1$ cuando n es impar.

Sección 2 — Las seis propiedades

Práctica 2.0 (simplificación): a) a^2 b) 5 c) xy^2 d) 4 e) mn f) $\frac{ab^2}{c}$.

Práctica 2.1 (P1): a) 5^7 b) 6^5 c) 9^{11} d) 7^7 e) a^{10} f) m^{p+7} g) $(xy)^8$ h) 2^{12}.

Práctica 2.2 (P2 + exp. neg.): a) 7^4 b) 15^3 c) $2^{-4} = \frac{1}{16}$ d) $5^{-4} = \frac{1}{625}$ e) $\frac{1}{9}$ f) $\frac{1}{64}$ g) $\frac{9}{4}$ h) $\frac{1}{10{,}000}$.

Práctica 2.3 (P3): a) 8^{12} b) $(-3)^{12}$ c) $2^{15} = 32{,}768$ d) $(1{,}5)^{15}$ e) a^{24} f) $p^{-6} = \frac{1}{p^6}$ g) a^{3a^2+6a} h) b^{24}.

Práctica 2.4 (P4): a) 6^5 b) 21^8 c) $(-20)^3 = -8{,}000$ d) $(ab)^n$ e) $(2xy)^3$ f) $(xyz)^5$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Práctica 2.5 (P5): a) $2^3 = 8$ b) $(-5)^4 = 625$ c) $(-4)^5 = -1{,}024$ d) $9^4 = 6{,}561$.

Ítem 1 (★, P1): a) 5^7 b) 6^5 c) $(-2)^{11}$ d) $\left(\frac{3}{5}\right)^9$ e) a^{10} f) m^{p+6} g) $(pq)^{t+8+s}$ h) 2^{x+3}.

Ítem 2 (★, P2): a) 7^4 b) 15^3 c) 2^{-4} d) 8^{14} e) $(-3)^2 = 9$ f) $(0{,}9)^6$ g) a^{-2} h) q^a.

Ítem 3 (★, P3): a) 8^{12} b) $(-3)^{12}$ c) $(1{,}5)^{15}$ d) a^{3a^2+6a}.

Ítem 4 (★, P4/P5/P6): a) 6^5 b) $(-20)^3$ c) 2^3 d) $\frac{3^4}{5^4} = \frac{81}{625}$ e) 5^4 f) $-\frac{8}{343}$ g) $(ab)^n$ h) $(-4)^3 = -64$.

Ítem 5 (★, exp. neg.): a) $\frac{1}{32}$ b) $\frac{1}{27}$ c) $\frac{9}{4}$ d) $\frac{1}{10{,}000}$ e) 125 f) $-\frac{1}{8}$ g) $\frac{1}{49}$ h) $\frac{49}{16}$.

Ítem 6 (★★): a) 27 b) $\left(-\frac{4}{5}\right)^{-4} = \left(\frac{5}{4}\right)^4 = \frac{625}{256}$ c) $(1{,}56)^{-5}$ d) $\left(\frac{15}{4}\right)^{-5}$.

Ítem 7 (★★): a) $\frac{c^6}{a^2b^3d^3}$ b) $\frac{a^{10}b^2c^7}{d^4}$ c) $\frac{a^{10}b^2c^7}{d^4}$.

Ítem 8 (★★★): a) $3^3 = 27$ b) $2^6 \cdot 5^2 = 3{,}200$ c) $\frac{x^{11}}{y^2}$.

Sección 3 — Operaciones combinadas

Práctica 3.1 (prioridad): a) 27 b) $\frac{1{,}296}{3{,}025}$.

Práctica 3.2: a) $64x^{21}$ b) $-\frac{1}{y^2}$ c) $\frac{y^5}{1{,}944x^{12}z^2}$ d) $\frac{c^6}{a^2b^3d^3}$.

Práctica 3.4 (racionales): a) $\frac{1}{4} + \frac{1}{9} = \frac{13}{36}$ b) $\frac{8}{27} - \frac{1}{16} = \frac{128-27}{432} = \frac{101}{432}$ ... m.c.m. c) $\frac{9}{16} \cdot \frac{3}{2} = \frac{27}{32}$ d) $\frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{6} = \frac{9+8-12}{72} = \frac{5}{72}$.

Ítem 1 (★, prioridad): a) $-1{,}499{,}5$ b) 1 c) 0 d) 27.

Ítem 2 (★★): a) $64x^{21}$ b) $-\frac{1}{y^2}$ c) $\frac{c^6}{a^2b^3d^3}$ d) $\frac{a^{10}b^2c^7}{d^4}$.

Ítem 3 (★★, literales): a) $(-4)^{9-3x}$ b) r^{5t-2s} c) $(a+b)^{6+3a/2}$ d) simplificar exponente.

Ítem 4 (★★★): a) 27 b) $2^6 \cdot 5^2$ c) $\frac{x^{11}}{y^2}$ d) $(4xy)^{3x-3y-1/4}$.

Ítem (racionales, ★): a) $\frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$ b) $\frac{9}{25} - \frac{1}{125} = \frac{45-1}{125} = \frac{44}{125}$ c) $0{,}25 + 0{,}001 = 0{,}251$ d) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{3}$ e) $\frac{5}{6} - \frac{1}{9} = \frac{15-2}{18} = \frac{13}{18}$ f) $0{,}008 + 0{,}25 - 0{,}0001 = 0{,}2579$.

Ítem (racionales, ★★): a) $\frac{77}{54}$ b) $\frac{1}{9} \cdot \frac{27}{8} + \frac{1}{2} = \frac{3}{8} + \frac{4}{8} = \frac{7}{8}$ c) $\frac{9}{16} - \frac{2}{3} = \frac{27-32}{48} = -\frac{5}{48}$ d) $\frac{3}{4} \cdot \frac{9}{4} = \frac{27}{16}$ e) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{16} + \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{27} = \frac{3}{8} + \frac{2}{27} = \frac{81+16}{216} = \frac{97}{216}$ f) $4 - 1 = 3$.

Ítem (racionales, ★★★): a) $\frac{1{,}296}{3{,}025}$ b) calcular con m.c.m. c) $(\frac{5}{4})^3 - (\frac{3}{4})^3 = \frac{125-27}{64} = \frac{98}{64} = \frac{49}{32}$.

Sección 4 — Notación científica

Práctica 4.3: a) $5{,}2 \cdot 10^{-2}$ b) $5{,}2 \cdot 10^3$ c) $8{,}854 \cdot 10^4$ d) $5{,}8 \cdot 10^{-3}$ e) $1{,}005 \cdot 10^6$ f) $8{,}5 \cdot 10^7$ g) $5{,}48 \cdot 10^{-5}$ h) $9{,}999 \cdot 10^6$.

Práctica 4.4: a) $8{,}16 \cdot 10^{-12}$ b) $5{,}43 \cdot 10^{-6}$ c) $1{,}55 \cdot 10^1$ d) 10^{12}.

Ítem 1 (★): a) $5{,}2 \cdot 10^{-2}$ b) $5{,}2 \cdot 10^3$ c) $8{,}854 \cdot 10^4$ d) $5{,}8 \cdot 10^{-3}$ e) $1{,}005 \cdot 10^6$ f) $8{,}5 \cdot 10^7$ g) $2{,}32 \cdot 10^7$ h) $7 \cdot 10^{-8}$ i) $1{,}505 \cdot 10^{10}$ j) $8{,}54 \cdot 10^{-4}$ k) $3{,}333 \cdot 10^6$ l) $3{,}333 \cdot 10^{-3}$.

Ítem 2 (★): a) 0,0059 b) 100,600 c) 9,999 d) 4,007,000,000 e) 0,000514 f) 0,000000728 g) 1,001

 Prohibida su reproducción total o parcial.

h) 501,4 i) 0,0000011 j) 78,300.

Ítem 3 (★★): a) $8{,}16 \cdot 10^{-12}$ b) $5{,}43 \cdot 10^{-6}$ c) $3{,}0002 \cdot 10^{-12}$ d) $1{,}55 \cdot 10^{1}$ e) 10^{12} f) $1{,}25 \cdot 10^{-5}$.

Ítem 4 (★★★): a) $\approx 2{,}56 \cdot 10^{21}$ átomos. b) $9{,}45 \cdot 10^{12}$ km. c) $2^9 = 512$ bacterias.

Sección 5 — Exponente racional

Práctica 5.2: a) 4 b) 8 c) 9 d) 8 e) 32 f) 8 g) $\frac{1}{25}$ h) 81.

Ítem 1 (★, raíz): a) $\sqrt[3]{5}$ b) $(\sqrt[4]{81})^3$ c) $\sqrt{a}$ d) $\frac{1}{\sqrt[3]{m^5}}$ e) $\sqrt[5]{-27}$ f) $\frac{1}{\sqrt[3]{125}} = \frac{1}{5}$ g) $\sqrt[4]{(3x^2)^3}$ h) $\sqrt{2-x}$.

Ítem 2 (★, potencia): a) $17^{1/2}$ b) $25^{1/4}$ c) $11^{2/3}$ d) $y^{5/7}$ e) $(3x^2)^{3/4}$ f) $(-27)^{2/5}$.

Ítem 3 (★, calcular): a) 4 b) 8 c) 9 d) 8 e) 32 f) 81 g) $\frac{1}{25}$ h) $\frac{1}{27}$ i) 8.

Ítem 4 (★★): a) a^2 b) a^4 c) x d) $2a$ e) $\sqrt{a}$ f) $x^{7/6} = \sqrt[6]{x^7} = x\sqrt[6]{x}$.

Ítem 5 (★★★): $4^{3/2} = 8$ y $8^x = 8^1 \Rightarrow x = 1$. *Alternativa:* $4^{3/2} = (2^2)^{3/2} = 2^3 = 8 = 8^1 \Rightarrow x = 1$.

Sección Final — Ecuaciones y alternativas

Alternativas: 1-A 2-B 3-D 4-A 5-A 6-A 7-B 8-A.

Ítem 1 (★, ecuaciones):

a: $x = \pm 7$ b: $x = 3$ c: $x = \pm 2$ d: $x = \pm\frac{5}{2}$ e: $x = -5$ f: $x = 2$
g: $x = 4$ h: $x = 4$ i: $x = 3$ j: $x = -3$

Ítem 2 (★★): a) $x = -5$ ($\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x} = 2^5$) b) $x = \frac{3}{2}$ ($4^{3/2} = 8$) c) $x = \frac{3}{2}$ ($9^{3/2} = 27$) d) $x = -3$ ($\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \frac{27}{8}$).

Ítem 3 (★★, aplicación): a) 64,000 (cubo del doble: $(2a)^3 = 8a^3 = 8 \cdot 8000$) b) $9^3 = 729$ metros c) $2 \cdot 3^5 = 486$ llamadas d) $5^7 = 78{,}125$.

Ítem 4 (★★★): $x = 3$ (pues $x = x^9/x^8 = 19683/6561 = 3$). Domingo. 10 semanas ($512 = 2^9$, $512/2^x = 1 \Rightarrow x = 9$).

Ejercicios tipo PAES

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.
1	B	9	B	17	B	25	C	33	E
2	D	10	C	18	B	26	C	34	A
3	B	11	D	19	D	27	A	35	A
4	D	12	C	20	A	28	C	36	E
5	C	13	C	21	B	29	C	37	C
6	D	14	D	22	C	30	A	38	A
7	A	15	A	23	D	31	D	39	C
8	A	16	A	24	D	32	B	40	A

Desarrollos clave:

1. $x^3 \cdot x^8 = x^{11}$. **2.** $3^2 \cdot b^6 = 9b^6$. **3.** $a^{4-(-2)}b^{-12-(-4)} = a^6b^{-8}$. **4.** $2^n \cdot 3^n = 6^n$ ✓. **5.** Variable en exponente: $2^x = 3$.

6. $a^2 + a = a(a+1)$. **7.** $h = 6$; $h\#3 = (3-36)/3 = -11$. **8.** $5 \cdot 5^r \cdot 7 \cdot 7^r = 35ab$. **9.** $5^x = 5^6 \Rightarrow x = 6$.

10. $3^{-3x} = 3^6 \Rightarrow x = -2$. **11.** $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$. **12.** $x = 3 \Rightarrow 2^3 = 8$. **13.** $2^t = 2^6 \Rightarrow t = 6$ días.

14. $m - 1 = 3 - m \Rightarrow m = 2$. **15.** $-2(-x+5) = 2 \Rightarrow x = 6$. **16.** $\left(\frac{3}{2}\right)^{2a} / \left(\frac{3}{2}\right)^{2a} = 1$. **17.** $a^{-n} + b^{-n}$.

18. $x = 11$. **19.** $x = 3$. **20.** $10^{3x} = 10^{-3} \Rightarrow x = -1$. **21.** $(-7)^x = (-7)^5 \Rightarrow x = 5$.

22. $3^{10x} = 3^{-20} \Rightarrow x = -2 \Rightarrow x/2 = -1$. **23.** $x = -1 \Rightarrow x^2 = 1$. **24.** $2^{n+5-n-3} + 5^{2n+2-2n-1} = 4 + 5 = 9$.

25. $(8 + 144 - 8)/16 = 9$. **26.** Cociente de potencias: 2. **27.** $A/B = 2^5 \cdot 3 \cdot 5$.

28. 6° recibe $(1/4)^5$ del total $\Rightarrow 2^{-10} \cdot 2^4 \cdot 5^3 \cdot 3^2 = 2^{-8} \cdot 5^3 \cdot 3^2$. **29.** 5^n. **30.** $x = 4$.

31. $7^{21} \cdot 6 = 7^{21} \cdot 2 \cdot 3$; divisible por 14. **32.** $3^x \cdot 10 = 90 \Rightarrow x = 2$. **33.** $q/p = 3^{13}/3^4 = 3^9$.

34. $9 \cdot (2/3)^5 = 2^5/3^3$. **35.** $x = -2$, $y = 9/2$; $x - y = -13/2$. **36.** $20^a = y^2 \cdot x = xy^2$.

37. p^n (negativo de mayor valor absoluto entre las opciones negativas). **38.** $-2(1 + 3^{-2n})$.

39. $P \cdot 2^{t/3}$. **40.** $S \cdot (1{,}08)^{d/3}$.

La constancia y la práctica son la clave del aprendizaje.

Academia Zenit · Matemática · Potencias · 1.0 · 2026

 Prohibida su reproducción total o parcial.