ACADEMIA ZENIT

CAPÍTULO 1 — NÚMEROS ENTEROS

Preuniversitario Zenit

Instrucciones. Este capítulo ha sido adaptado al formato institucional de Academia Zenit. La teoría se presenta intercalada con una sección de **Ejemplos** (primeros 20 ejercicios), seguida por los bloques **M1** (65 ejercicios) y **M2** (20 ejercicios). Las figuras del material original se han reemplazado por espacios reservados para su inserción posterior.

"Vive como si fueses a morir mañana. Aprende como si fueses a vivir siempre."
Mahatma Gandhi — abogado, pensador y político.

Contenidos del capítulo

1. Conjuntos numéricos
   a. Números enteros
   b. Valor absoluto
2. Orden en el conjunto de los números enteros
3. Las cuatro operaciones básicas en los enteros
   a. Adición y sustracción
   b. Multiplicación y división
4. Múltiplos y divisores
   a. Múltiplos
   b. Divisores
5. Paridad e imparidad
6. Propiedades de las operaciones en los números enteros
   a. Propiedad conmutativa
   b. Propiedad asociativa
   c. Propiedad distributiva
   d. Neutro aditivo y neutro multiplicativo
   e. Inverso aditivo
   f. Elemento absorbente
   g. Prioridad de las operaciones
7. Criterios de divisibilidad
8. Números primos, compuestos y teorema fundamental de la aritmética

9. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor
   a. Mínimo común múltiplo
   b. Máximo común divisor
   c. Problemas de aplicación
10. Evaluar expresiones
11. Enunciados frecuentes

Bloque A Teoría y ejemplos guiados

1. Conjuntos numéricos

Los conjuntos numéricos que estudiaremos son:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}, \qquad \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\},$$

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}, \qquad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Q}^*, \quad \mathbb{R}, \quad \mathbb{C}.$$

Ejemplos de racionales:

$$\left\{1, 0, 2, -\frac{4}{3}, 2, \overline{31}, \ldots\right\}$$

Ejemplos de irracionales:

$$\left\{\sqrt{2}, \pi, \sqrt[5]{3}, \ldots\right\}$$

Ejemplos de reales:

$$\left\{\sqrt{7}, 3\pi, \sqrt[4]{8}, \log 3, \ldots\right\}$$

Ejemplos de imaginarios puros:

$$\left\{i, 2i, \sqrt{3}i, \frac{2}{3}i, \ldots\right\}$$

Espacio reservado para figura

Diagrama de inclusión de conjuntos numéricos del material original.

Los números complejos se expresan como:

$$\mathbb{C} = \{1, -i, 3 + 2i, 1 - i, \ldots\}$$

a. Números enteros

Los números enteros, denotados por $\mathbb{Z}$, incluyen a los números naturales, a sus opuestos y al cero. En la recta numérica horizontal, los positivos se ubican a la derecha del cero y los negativos a la izquierda.

Espacio reservado para figura

Recta numérica de números enteros del material original.

El conjunto de los números enteros es ordenable; por ello, podemos comparar sus elementos y decidir si dos enteros son iguales o distintos, y en este último caso, cuál es mayor o menor.

b. Valor absoluto

El valor absoluto de un número x se escribe $|x|$ y corresponde a la distancia entre el número x y el 0 en la recta numérica. Por ello, siempre se cumple que:

$$|x| \geq 0.$$

Espacio reservado para figura

Figura del valor absoluto con los ejemplos $|-3| = 3$ y $|3| = 3$.

Tip. Para cualquier par de valores a y b, siempre se cumple que:

$$|a - b| = |b - a|.$$

Ejemplo: $|7 - 3| = |4| = 4$ y $|3 - 7| = |-4| = 4$.

i. Propiedades del valor absoluto

Para cualquier par de valores a y b:

$$\begin{aligned} |a| \cdot |b| &= |ab|, \\ \frac{|a|}{|b|} &= \left|\frac{a}{b}\right|, \qquad b \neq 0, \\ |a^n| &= |a|^n, \qquad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Ejemplos:

$$\begin{aligned} |5| \cdot |-3| &= |5 \cdot (-3)| = 15, \\ \frac{|6|}{|-2|} &= \left|\frac{6}{-2}\right| = 3, \\ |(-3)^2| &= |-3|^2 = 9. \end{aligned}$$

2. Orden en el conjunto de los números enteros

En los enteros existe una relación de orden. Dados dos números x e y, siempre ocurre exactamente una de estas posibilidades:

- $x < y$,
- $x = y$,
- $x > y$.

Esta idea corresponde a la **ley de tricotomía**.

La forma más simple de comparar dos enteros distintos es observar su ubicación en la recta numérica: será menor el que esté más a la izquierda. También podemos decidir el orden usando signo y valor absoluto:

- Si a y b son positivos y distintos, entonces $a < b$ cuando $|a| < |b|$.
- Si a y b son negativos y distintos, entonces $a < b$ cuando $|a| > |b|$.
- Si $a < 0$ y $b > 0$, entonces siempre $a < b$.

Ejemplos: $8 < 10$, $25 > 9$, $-3 > -7$, $-10 < -9$, $-8 < 10$, $1 > -190$.

3. Las cuatro operaciones básicas en los enteros

a. Adición y sustracción

Números de igual signo. Para adicionar números de igual signo, se suman sus valores absolutos y se conserva el signo común.

Números de distinto signo. Para adicionar números de distinto signo, se restan los valores absolutos y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto.

Ejemplos:

$$5 + 7 = 12, \qquad -5 - 7 = -12,$$
$$5 - 7 = -2, \qquad -5 + 7 = 2.$$

Restar un valor equivale a sumar su opuesto. Por ejemplo:

$$8 - 5 = 8 + (-5) = 3.$$

Tips para sustracción.

- Si a un número mayor le restamos uno menor, el resultado es positivo.
- Si a un número menor le restamos uno mayor, el resultado es negativo.

Ejemplos: $7 - 5 = 2$, $2 - (-6) = 8$, $-1 - (-8) = 7$, $3 - 6 = -3$, $-1 - 4 = -5$, $-5 - (-2) = -3$.

b. Multiplicación y división

Números de igual signo. Al multiplicar o dividir dos números de igual signo, el resultado es positivo.

Ejemplos:

- $5 \cdot 7 = 35$
- $(-5) \cdot (-7) = 35$
- $10 : 2 = 5$
- $(-10) : (-2) = 5$

Números de distinto signo. Al multiplicar o dividir dos números de distinto signo, el resultado es negativo.

Ejemplos:

$$5 \cdot (-7) = -35, \qquad (-5) \cdot 7 = -35, \qquad 10 : (-2) = -5, \qquad (-10) : 2 = -5.$$

$+ \cdot + = +$	$+ \cdot - = -$
$- \cdot - = +$	$- \cdot + = -$

$+ : + = +$	$+ : - = -$
$- : - = +$	$- : + = -$

4. Múltiplos y divisores

a. Múltiplos

Un número natural a es múltiplo de un número natural b si existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que:

$$a = k \cdot b.$$

Ejemplos:

- 12 es múltiplo de 3, porque $12 = 4 \cdot 3$.
- 28 es múltiplo de 4, porque $28 = 7 \cdot 4$.
- 35 no es múltiplo de 4.

Los múltiplos de un número natural son infinitos. Por ejemplo:

$$\text{Múltiplos de } 3 = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, \ldots\}$$

En los enteros, también consideramos múltiplos negativos y al cero:

$$\text{Múltiplos de } 3 = \{\ldots, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, \ldots\}$$

b. Divisores

Un número natural b es divisor de un número natural a si al dividir a entre b se obtiene un cociente natural y resto cero.

Ejemplos:

- 4 es divisor de 20, porque $20 : 4 = 5$ y el resto es 0.
- 7 es divisor de 14, porque $14 : 7 = 2$ y el resto es 0.
- 8 no es divisor de 15, porque $15 : 8 = 1$ y el resto es 7.

Ejemplos de conjuntos de divisores:

- Divisores de 10: $\{1, 2, 5, 10\}$.
- Divisores de 24: $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$.
- Divisores de 5: $\{1, 5\}$.

Todo número natural mayor que 1 tiene al menos dos divisores: el 1 y él mismo.

En los enteros también consideramos divisores negativos. Por ejemplo:

$$\text{Divisores negativos de } 8 = \{-8, -4, -2, -1\}$$

Además, 0 tiene infinitos divisores, pero 0 no es divisor de ningún número.

5. Paridad e imparidad

Un número entero es **par** si es múltiplo de 2; en caso contrario, es **impar**.

Ejemplos:

- Son pares: $28, -4, 16, -400$.
- Son impares: $17, -9, 113, 501$.

Tip. Aunque el 0 no es positivo ni negativo, sí es un número par.

Al operar números pares e impares se obtiene:

- par $\pm$ par $=$ par,
- impar $\pm$ impar $=$ par,
- par $\pm$ impar $=$ impar,
- par $\cdot$ par $=$ par,
- par $\cdot$ impar $=$ par,
- impar $\cdot$ impar $=$ impar.

6. Propiedades de las operaciones en los números enteros

a. Propiedad conmutativa

La adición y la multiplicación cumplen la propiedad conmutativa:

$$a + b = b + a, \qquad a \cdot b = b \cdot a.$$

Ejemplos: $5 + 6 = 6 + 5$ y $6 \cdot 7 = 7 \cdot 6$.

b. Propiedad asociativa

$$a + (b + c) = (a + b) + c, \qquad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c.$$

Ejemplo:

$$(2 + 1) + 6 = 2 + (1 + 6) = 9.$$

c. Propiedad distributiva

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \qquad a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c.$$

Ejemplos:

$$3 \cdot (5 + 7) = 3 \cdot 5 + 3 \cdot 7 = 36,$$
$$3 \cdot (2 - 7) = 3 \cdot 2 - 3 \cdot 7 = -15.$$

d. Neutro aditivo y neutro multiplicativo

$$a + 0 = a, \qquad a \cdot 1 = a.$$

Por ello, 0 es el neutro aditivo y 1 es el neutro multiplicativo.

e. Inverso aditivo

El inverso aditivo de a es el número $-a$, pues:

$$a + (-a) = 0.$$

Ejemplos: el inverso aditivo de 5 es -5; el de -8 es 8.

f. Elemento absorbente

$$a \cdot 0 = 0, \qquad 0 \cdot a = 0.$$

Por ello, 0 es absorbente en la multiplicación.

g. Prioridad de las operaciones

Cuando en una expresión aparecen varias operaciones, se sigue el orden:

1. paréntesis (de adentro hacia afuera),
2. potencias y raíces,
3. multiplicación y división,
4. adición y sustracción.

Ejemplo:

$$8 \cdot (7 - 4) : 12 - 1 + 6 : 3 \cdot 9 = 19.$$

Nota. Esta regla también se conoce como **PAPOMUDAS**: paréntesis, potencias y raíces, multiplicación y división, adición y sustracción.

7. Criterios de divisibilidad

Un número es divisible por:

- 2 si su último dígito es par.
- 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3.
- 4 si sus dos últimos dígitos forman un múltiplo de 4 o son ceros.
- 5 si termina en 0 o en 5.
- 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez.
- 7 si al multiplicar el dígito de las unidades por 2 y restarlo del número formado por los otros dígitos, el resultado es múltiplo de 7 o 0.
- 8 si sus tres últimos dígitos forman un múltiplo de 8 o son ceros.
- 9 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9.
- 10 si su último dígito es 0.

Ejemplos: 234 es divisible por 3; 1300 es divisible por 4; 385 es divisible por 5; 1350 es divisible por 6; 5643 es divisible por 9; 23140 es divisible por 10.

Bloque B Ejemplos — primeros 20 ejercicios

1. ¿Cuál es el valor de $1 - (-3)(-2 - 6)$?
Habilidad: Resolver problemas. (DEMRE 2026)
A) -32 B) -23 C) -16 D) -4

2. La temperatura en una cámara frigorífica es de 12°C. Se necesita variar esta temperatura hasta alcanzar los −36°C. Si la temperatura desciende 3°C cada cinco minutos, ¿cuánto tiempo se tardará en alcanzar dicha temperatura?

Habilidad: Resolver problemas. (DEMRE 2024)
A) 85 minutos B) 80 minutos C) 60 minutos D) 48 minutos

3. Si la suma de 3 números enteros consecutivos es igual a p, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera respecto del valor de p?
Habilidad: Argumentar. (DEMRE 2024)
A) Es un número impar. B) Es múltiplo de 3. C) Es positivo. D) Es distinto de cero.

4. Considera la siguiente recta numérica.

Espacio reservado para figura
Recta numérica correspondiente al ejercicio 4 de ejemplos.

¿Cuál de los siguientes procedimientos representa la operación $-5 + (-8)$ usando la recta numérica?
Habilidad: Representar. (DEMRE 2025)
A) Ubicarse en el -5 y desplazarse 8 unidades a la izquierda.
B) Ubicarse en el -5 y desplazarse 8 unidades a la derecha.
C) Ubicarse en el -8 y desplazarse 5 unidades a la derecha.
D) Ubicarse en el -8 y desplazarse 3 unidades a la derecha.

5. ¿Cuántos números enteros positivos son mayores o iguales que -4 y menores que 3?
Habilidad: Resolver problemas. (DEMRE 2025)
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

8. Números primos, compuestos y teorema fundamental de la aritmética

Los números primos son enteros positivos mayores que uno que tienen exactamente dos divisores positivos distintos: 1 y ellos mismos. Los primeros son:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, \ldots$$

Los números compuestos son los enteros positivos mayores que uno que no son primos.

El **teorema fundamental de la aritmética** establece que todo número natural mayor que uno puede escribirse de manera única como producto de potencias de números primos.

> Nota: la cantidad total de divisores positivos de un número se obtiene multiplicando los sucesores de los exponentes de su descomposición prima.

i. Tabla de descomposición

Consiste en dividir el número compuesto por números primos sucesivos hasta llegar a la unidad.

ii. Diagrama de árbol

Es un método más visual: se expresa el número como producto de dos factores y se siguen descomponiendo hasta obtener únicamente factores primos.

Espacio reservado para figura

Tabla de descomposición prima de 90 del material original.

Espacio reservado para figura

Diagrama de árbol para la descomposición prima de 90 del material original.

Ejemplo:

$$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Entonces, la cantidad de divisores positivos de 90 es:

$$(1+1)(2+1)(1+1) = 12.$$

Por tanto, sus divisores positivos son:

$$\{1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90\}.$$

Tips.

- El menor número primo es 2, y es el único primo par.
- El 1 no es primo ni compuesto.

9. Mínimo común múltiplo (m.c.m.) y máximo común divisor (M.C.D.)

a. Mínimo común múltiplo

El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor entero positivo que es múltiplo común de todos ellos.

Métodos:

I. tabla de descomposición,

II. descomposición prima.

Ejemplo, con $A = 90$ y $B = 24$:

$$A = 2 \cdot 3^2 \cdot 5, \qquad B = 2^3 \cdot 3.$$

Luego,

$$\text{m.c.m.}(90, 24) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Espacio reservado para figura

Tabla de descomposición para calcular el m.c.m. entre 90 y 24.

b. Máximo común divisor

El máximo común divisor de dos o más números es el mayor entero positivo que divide a todos ellos. Con los mismos valores:

$$A = 2 \cdot 3^2 \cdot 5, \qquad B = 2^3 \cdot 3.$$

Entonces,

$$\text{M.C.D.}(90, 24) = 2 \cdot 3.$$

Espacio reservado para figura

Tabla de descomposición para calcular el M.C.D. entre 90 y 24.

Nota. Si dos números no tienen factores primos comunes, se llaman **primos relativos**. En ese caso, su M.C.D. es 1 y su m.c.m. es el producto de ambos.

c. Problemas de aplicación

Las aplicaciones más frecuentes del m.c.m. y del M.C.D. aparecen cuando debemos sincronizar repeticiones o dividir cantidades en partes iguales lo más grandes posible.

Ejemplo 1. Tres llaves gotean cada 3, 5 y 8 segundos. Si coinciden ahora, volverán a coincidir en:

$$\text{m.c.m.}(3, 5, 8) = 120 \text{ segundos.}$$

Ejemplo 2. Dos terrenos de $21\,600\,\text{m}^2$ y $32\,000\,\text{m}^2$ se desean subdividir en parcelas de igual área y lo más grandes posible. El área máxima es:

$$\text{M.C.D.}(21600, 32000) = 800\,\text{m}^2.$$

10. Evaluar expresiones

Evaluar o valorizar una expresión algebraica consiste en sustituir las letras por valores numéricos y luego efectuar las operaciones indicadas.

Ejemplo: si $m = -4$ y $n = -1$,

$$mn - m^2 = (-4)(-1) - (-4)^2 = 4 - 16 = -12.$$

Tip. Al sustituir valores, conviene usar paréntesis para evitar errores de signo.

11. Enunciados frecuentes

Sean x e y números enteros. Algunas traducciones habituales son:

- El doble de x: $2x$.
- El triple de x: $3x$.
- La semisuma de x e y: $\dfrac{x+y}{2}$.
- El exceso de x sobre y: $x-y$.
- La mitad de x: $\dfrac{x}{2}$.
- El sucesor de x: $x+1$.
- El antecesor de x: $x-1$.
- Un número par: $2x$.
- Un número impar: $2x-1$ o $2x+1$.
- Dos pares consecutivos: $2x$ y $2x+2$.
- Dos impares consecutivos: $2x+1$ y $2x+3$.
- El cuadrado de x: x^2.

Ejemplos breves:

- El doble de 3 es 6.
- El triple de -8 es -24.
- La semisuma de 4 y 12 es 8.
- El exceso de 8 sobre 3 es 5.
- El sucesor de -12 es -11.
- El antecesor de -4 es -5.
- 14 es par y 19 es impar.

6. En la siguiente infografía se presenta el pronóstico del tiempo para cierto día, con la temperatura en grados Celsius.

Espacio reservado para figura

Infografía del pronóstico del tiempo correspondiente al ejercicio 6 de ejemplos.

¿Cuál será la variación de temperatura entre las 17:00 y las 21:00 horas?
Habilidad: Resolver problemas. (DEMRE 2025)
A) $-6°C$ B) $-5°C$ C) $4°C$ D) $6°C$

7. Si al quíntuplo de -10 se le resta el triple de -12, ¿qué número se obtiene?
Habilidad: Resolver problemas. (DEMRE 2024)
A) -86 B) -14 C) 2 D) 34

8. Una persona selecciona un número de dos dígitos, luego resta este número a 200 y, finalmente, duplica el resultado. ¿Cuál es el mayor número que puede obtener mediante esta serie de operaciones?
Habilidad: Resolver problemas. (DEMRE 2024)
A) 220 B) 301 C) 380 D) 398

9. La automotora *Mi auto* tiene cinco marcas de automóviles; cada marca tiene tres modelos y cada modelo está en tres colores distintos. La automotora *Viaje feliz* tiene cuatro marcas, cada marca tiene tres modelos y cada modelo está en cuatro colores distintos.
Si las marcas de ambas automotoras son distintas entre sí, ¿cuál afirmación es verdadera?
Habilidad: Argumentar. (DEMRE 2023)
A) *Viaje feliz* ofrece tres posibilidades más.
B) Ambas ofrecen la misma cantidad de posibilidades.
C) *Mi auto* ofrece más posibilidades.
D) El total se determina por la suma de marcas, modelos y colores.

10. Un diario tiene una colilla recortable para un concurso, la que se presenta a continuación.

Espacio reservado para figura
Cuadro mágico y recuadro de operación del ejercicio 10 de ejemplos.

¿Cuál es el resultado que permite entrar al concurso?
Habilidad: Resolver problemas. (DEMRE 2024)
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

11. Una empresa registra mensualmente la variación de la masa total de los metales almacenados en su bodega. El primer mes aumentó en 2 toneladas, el segundo disminuyó en 4 toneladas, el tercero aumentó en 3 toneladas y el cuarto aumentó en 1 tonelada. Al finalizar el cuarto mes, la masa total es de 70 toneladas. ¿Cuántas toneladas había inicialmente?
Habilidad: Resolver problemas. (DEMRE 2024)
A) 66 B) 68 C) 70 D) 74

12. En la figura se presenta un cartel con los precios de las impresiones en blanco y negro de un centro de impresión.

Cantidad de hojas	Precio por hoja
De 1 a 99 hojas	\$30
De 100 a 149 hojas	\$25
150 o más	\$20

Un libro tiene tres capítulos de 150, 130 y 85 hojas. Una persona imprimió primero solo el primer capítulo, luego el segundo y por último el tercero. ¿Cuánto dinero gastó?
Habilidad: Resolver problemas. (DEMRE 2024)
A) \$7.300 B) \$8.150 C) \$8.800 D) \$9.450

13. Consuelo y dos amigas comieron en un restaurante. A continuación se presenta la boleta de todo lo consumido.

Jugo	\$1.600
3 sándwiches	\$18.000
Promoción 2 sopaipillas + bebidas	\$4.800 + \$2.600
Total	\$27.000

Acordaron que cada una pagará lo que consumió y que la promoción de sopaipillas se dividirá en tres partes iguales. Si Consuelo consumió un sándwich y una bebida, ¿cuánto debe pagar?
Habilidad: Resolver problemas. (DEMRE 2026)
A) \$8.900 B) \$9.000 C) \$12.000 D) \$22.200

14. Una persona viaja al exterior con un saldo inicial de \$300.000 en su tarjeta. Realiza un pago de \$15.000 y otro de \$35.000. Por cada pago, el banco cobra una comisión de \$2.000. ¿Cuál es su saldo final?
Habilidad: Resolver problemas. (DEMRE 2024)
A) \$254.000 B) \$244.000 C) \$248.000 D) \$246.000

15. Dos personas realizan rutinas de ejercicio. La primera repite 8 veces una serie de 2 minutos de ejercicio y 30 segundos de descanso. La segunda repite 12 veces una serie de 1 minuto y 30 segundos de ejercicio y 15 segundos de descanso. ¿Qué argumento garantiza que una termina antes que la otra?
Habilidad: Argumentar. (DEMRE 2025)
A) Que la cantidad de repeticiones es distinta.
B) Que los tiempos de descanso son distintos.
C) Que la suma entre tiempo de ejercicio, descanso y repeticiones es distinta.
D) Que la suma entre ejercicio y descanso, multiplicada por la cantidad de repeticiones, es distinta.

16. Considera la siguiente secuencia de figuras.

Espacio reservado para figura
Secuencia de círculos correspondiente al ejercicio 16 de ejemplos.

Si el patrón se mantiene, ¿cuántos círculos forman la Figura 7?
Habilidad: Resolver problemas. (DEMRE 2025)
A) 18 B) 21 C) 28 D) 36

17. Considera la siguiente secuencia de figuras, formadas por cuadrados y triángulos con palitos de fósforo.

Espacio reservado para figura
Figuras 1, 2 y 3 con palitos de fósforo del ejercicio 17 de ejemplos.

¿Cuál es la cantidad de palitos que se utilizan en la figura 25?
Habilidad: Representar. (DEMRE 2025)
A) $7 \cdot 25$ B) $5 \cdot 25 + 2$ C) $3 \cdot 25 + 4$ D) $2 \cdot 25$

18. Un juego consiste en lanzar cinco bolitas hacia los agujeros de una caja, con distintos puntajes según el agujero por donde entra cada bolita.

Espacio reservado para figura
Caja con agujeros y puntajes del ejercicio 18 de ejemplos.

Se sabe que las bolitas ingresaron por los tres agujeros. ¿Cuál es el máximo puntaje posible?
Habilidad: Resolver problemas. (DEMRE 2025)
A) 5 B) 11 C) 19 D) 25

19. En el gráfico adjunto se representa la percepción ciudadana respecto de los atributos de un candidato.

Espacio reservado para figura
Gráfico de variación agosto-noviembre del ejercicio 19 de ejemplos.

¿Cuál atributo presentó la mayor variación entre agosto y noviembre?
Habilidad: Representar. (DEMRE 2026)
A) Liderazgo B) Cercanía C) Honestidad D) Capacidad de diálogo

20. La masa molar del ácido sulfúrico se calcula sumando las masas molares de todos los átomos que lo conforman.

Espacio reservado para figura
Esquema de H_2SO_4 y masas molares del ejercicio 20 de ejemplos.

¿Cuál expresión representa la masa molar del ácido sulfúrico?
Habilidad: Representar. (DEMRE 2026)
A) $(1 + 32 + 16)\ \frac{\text{g}}{\text{mol}}$
B) $(2 + 4) \cdot (32 + 16)\ \frac{\text{g}}{\text{mol}}$
C) $(2 \cdot 1 + 1 \cdot 32 + 4 \cdot 16)\ \frac{\text{g}}{\text{mol}}$
D) $(1 + 2 + 4) \cdot (1 + 32 + 16)\ \frac{\text{g}}{\text{mol}}$

Bloque C Ejercicios M1 — 65 ejercicios

1. $6 - 3 \cdot 8 - 32 : 4 =$
A) -26 B) -14 C) 0 D) 3

2. $[-5 + (-3) \cdot 7] : (-2) =$
A) 24 B) 13 C) -24 D) -13

3. $-3 \cdot |6 - 8| - |-2| =$
A) -8 B) -4 C) 0 D) 4

4. $(1 + 5) - 3^2 + 8 : 2 \cdot 2 =$
A) -1 B) 1 C) 5 D) 15

5. $76{,}606 - 29{,}878 =$
A) 45,728 B) 46,728 C) 45,738 D) 46,736

6. Si al entero -1 le restamos el entero -4, resulta:
A) 0 B) -3 C) 2 D) 3

7. $-(4-2\cdot(2-4)) =$
A) -15 B) -10 C) -8 D) 8

8. Si $M=-2$, entonces $-M\cdot M-M=$
A) -12 B) -4 C) -2 D) 2

9. La expresión $(9\cdot 4)$ es divisor de:
A) 4 B) 9 C) 18 D) 36

10. Si $P+3$ es el sucesor del número 10, entonces el sucesor de P es:
A) 7 B) 8 C) 9 D) 11

11. Si al número -8 se le resta el doble de -6 y al resultado se le agrega el cubo de -3, resulta:
A) 7 B) -7 C) -23 D) -31

12. Si $|P|$ representa el valor absoluto de P, ¿cuál de las siguientes alternativas es verdadera?
A) $|-7|>|-8|$ B) $-21>8$ C) $|-10|<|10|$ D) $-5<3$

13. Si $m=-1$ y $n=2$, ¿cuál es el valor de $m\cdot(n-m)\cdot(m-n)$?
A) 9 B) 3 C) 0 D) -3

14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
A) El número 2 es compuesto.
B) El número 1 es primo.
C) El m.c.m. entre 2, 3 y 11 es la suma entre 2, 3 y 11.
D) El M.C.D. entre 2, 11 y 19 es 1.

15. La temperatura mínima de un día fue de -1°C y la máxima de 9°C. ¿Cuál fue la variación de temperatura del día?
A) -10°C B) 6°C C) 10°C D) 11°C

16. Si un fontanero cobra \$500 por reparar cada fuga de agua en una tubería, ¿cuánto cobraría por reparar tres fugas en tuberías separadas?
A) \$1.000 B) \$1.500 C) \$2.000 D) \$2.500

17. ¿Cuál es el valor de $|-3|-|-3|^2-|-3|^3$?
A) -39 B) -33 C) -21 D) 33

18. ¿Qué resultado se obtiene si se disminuye en 2 unidades la suma entre el triple de 2 y el doble de 3?
A) 15 B) 12 C) 10 D) 8

19. Si N es divisor de 8 y N no es divisor de 4, entonces N es:
A) 1 B) 2 C) 4 D) 8

20. $-3-3\cdot 9:9+3=$
A) -6 B) -3 C) 0 D) 2

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
A) La suma de números naturales siempre es natural.

B) La sustracción es conmutativa en los naturales.
C) En los naturales, el inverso aditivo de 2 es -2.
D) En los enteros, el inverso multiplicativo de 1 es -1.

22. $-2 \cdot [3 - \{5 - 2 \cdot (8 - 16)\}] =$
A) -34 B) -20 C) 36 D) 54

23. Si x es un número primo, entonces x^2 es siempre:
A) Par. B) Primo. C) Compuesto. D) Par y compuesto.

24. El valor de la expresión $18 - (-30) : (-2) + (-2) \cdot (-1)$ es:
A) 9 B) -5 C) -9 D) 5

25. El doble de $(2 \cdot (4 + 3) - 2 \cdot (1 - 2)) =$
A) 8 B) 16 C) 32 D) 48

26. Si n es un número natural par, entonces el sucesor par del sucesor de $n + 1$ está representado por:
A) $n + 4$ B) $n + 2$ C) $2n + 2$ D) $2n + 4$

27. $(-2) \cdot 2 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot 2 =$
A) 16 B) -8 C) -16 D) -32

28. Si $a = 3$ y $b = -1$, entonces $-\{a - (-b - a)\} =$
A) -5 B) -1 C) 0 D) 1

29. Si $p = -6$ y $q = -2$, entonces $-\{p + q - (q - p)\}$ es:
A) -4 B) 0 C) 4 D) 12

30. El valor de $24 : 8 \cdot 6 : 3 - 45 : 9 \cdot 3 - 4 : (-2)$ es:
A) -11 B) -7 C) 7 D) 11

31. Si el sucesor de un número es $a + 4$, entonces el doble del número es:
A) $a + 3$ B) $2a + 2$ C) $2a + 3$ D) $2a + 6$

32. La suma de tres números pares consecutivos es siempre divisible por:
A) 4 B) 6 C) 9 D) 12

33. La edad de Lucas equivale al doble de la quinta parte de la semisuma entre 4 y 6. ¿Qué edad tiene Lucas?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

34. Javiera guarda monedas de \$100 en una alcancía. Si le faltan 3 monedas para tener \$5.000, ¿a cuántas monedas de \$50 equivale el dinero que tiene Javiera?
A) 47 B) 94 C) 100 D) 160

35. ¿Cuál de los siguientes números es primo?
A) 19 B) 51 C) 91 D) 141

36. Con 5 vasos de 250 ml cada uno se llena un jarro. ¿Cuántos vasos de 125 ml se necesitan para llenar dos jarros iguales?
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

37. ¿Cuál de los siguientes pares de dígitos podrían ponerse en los espacios vacíos para que el número 4□.□12 sea divisible por 6?
A) 0 y 1 B) 1 y 1 C) 1 y 2 D) 2 y 2

38. $M = 12C4$ representa a un número de 4 cifras divisible por 6. ¿Qué valores puede tener el dígito C?
A) $\{4, 6, 9\}$ B) $\{3, 6, 9\}$ C) $\{2, 5, 8\}$ D) $\{5, 6, 7\}$

39. Si $a + b + c = 2d$, donde $a = 5$, $b = 4$ y $c = -3$, entonces el valor de $d \cdot d \cdot (d - a) \cdot (d - b) \cdot (d - c)$ es:
A) 24 B) 84 C) 96 D) 108

40. La suma de tres impares consecutivos es siempre divisible por:
A) 15 B) 9 C) 6 D) 3

41. Tenemos cuatro sitios de 70, 56, 42 y 84 hectáreas. Si queremos subdividirlos en parcelas de igual superficie, la superficie máxima posible de cada parcela es:
A) 2 ha B) 7 ha C) 14 ha D) 28 ha

42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
A) En los enteros, la sustracción es conmutativa.
B) En los enteros, el inverso multiplicativo de 10 es 0,1.
C) En los enteros, el neutro aditivo es el cero.
D) En los enteros, la división es conmutativa.

43. Si el antecesor de un número es $c - 5$, entonces el cuádruple del número es:
A) $c - 4$ B) $4c - 4$ C) $4c - 16$ D) $4c - 20$

44. Si al cuadrado de -3 se le resta el doble de -4 y al resultado se le agrega el triple de 3, se obtiene:
A) 26 B) 20 C) 11 D) 10

45. Si 14 veces 2 es igual a M y 15 veces 3 es igual a N, entonces $M + N$ resulta:
A) 15 B) 28 C) 45 D) 73

46. Si a y b son números primos distintos, ¿cuál de las siguientes opciones podría ser el producto de a y b?
A) 4 B) 9 C) 10 D) 16

47. Si a y b son enteros, el antecesor de a es b y el sucesor de a es -9, entonces $a + b =$
A) -21 B) -20 C) -19 D) -17

48. El producto entre los divisores positivos de 12 es:
A) 12 B) 144 C) 1.728 D) 20.736

49. Se sabe que n es múltiplo de 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
A) El sucesor de n es múltiplo de 3.
B) n^3 es múltiplo de 3.
C) $12n$ es múltiplo de 2.
D) $n + 5$ es múltiplo de 2.

50. Si la suma entre el menor y el mayor de cinco números impares consecutivos es 1.854, ¿cuál es su diferencia positiva?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 182

51. Si la suma de tres números enteros consecutivos es 453, ¿cuál es el producto entre los dos mayores?
A) 21.952 B) 22.650 C) 22.952 D) 22.986

52. En un cumpleaños se deben armar cajitas sorpresa con chocolates, Guagüitas y Sunys. Se compra un paquete de cada uno con 100, 75 y 50 unidades, respectivamente. ¿Cuántas cajitas se pueden armar como máximo, todas con la misma cantidad de cada producto?
A) 75 B) 25 C) 20 D) 15

53. En un circuito de carreras de juguetes, tres autos parten al mismo tiempo desde la meta. El auto rojo tarda 120 s, el azul 140 s y el verde 180 s en dar una vuelta completa. ¿En cuántos segundos volverán a pasar juntos por la línea de partida?
A) 2.520 B) 1.260 C) 630 D) 330

54. Todo el líquido de una jarra se reparte en 14 vasos iguales llenos hasta su capacidad máxima. Se quiere verter la misma cantidad de líquido de otra jarra idéntica en vasos iguales, pero solo hasta la mitad de su capacidad. ¿Cuántos vasos más se necesitarán?
A) 7 B) 14 C) 21 D) 28

55. El reloj despertador de Antonio suena cada 30 minutos y su aplicación de noticias envía notificaciones cada 10 minutos. Si a las 8:00 AM ambos coinciden por primera vez en el día, ¿a qué hora coincidirán por quinta vez?
A) 8:50 AM B) 9:30 AM C) 10:00 AM D) 10:30 AM

56. Mila necesita vender 294 cajas de chocolates en 1 año. Si cada mes venderá 3 cajas más que el mes anterior, ¿cuántas cajas venderá el último mes?
A) 23 B) 40 C) 41 D) 44

57. Una aplicación informa la temperatura cada 40 minutos y el tiempo de llegada de un transporte público cada 12 minutos. Si a las 7:00 AM ambas informaciones coinciden por primera vez, ¿a qué hora coinciden por tercera vez?
A) 8 AM B) 9 AM C) 11 AM D) 12 PM

58. En un juego de cartas un jugador obtiene 27 puntos a favor y 4 en contra. Su puntaje final se obtiene restando a los puntos a favor el doble de los puntos en contra. ¿Cuál es su puntaje final?
A) 19 B) 23 C) 25 D) 29

59. ¿Cuál es la cifra de la unidad de 4^{55}?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

60. La suma de cuatro números enteros consecutivos es siempre:
A) divisible por 2 B) divisible por 3 C) divisible por 4 D) divisible por 6

61. Se necesita comprar un balde para vaciar tres estanques cuyas capacidades aparecen en la figura. Se desea hacer el menor número de extracciones y que el balde se llene al máximo cada vez. ¿Qué capacidad debe tener el balde?

Espacio reservado para figura
Tres recipientes del ejercicio 61 de M1.

A) 2 litros B) 3 litros C) 6 litros D) 12 litros

62. Si a es par y b es impar, ¿cuál de las siguientes expresiones representa un número par?
A) $a + b$ B) $2a - b$ C) $3a + 3b$ D) $5a + 4b$

63. Dos luces intermitentes se encienden con intervalos de 42 y 54 segundos. Si a las 10:15 ambas están encendidas, ¿a qué hora estarán nuevamente encendidas simultáneamente?
A) 10 h 21 min 18 s B) 10 h 21 min 36 s C) 10 h 21 min 42 s D) 10 h 15 min 54 s

64. Una habitación se encuentra a 7°C. Si una estufa aumenta la temperatura en 2°C cada 10 minutos, ¿en cuánto tiempo llegará a 21°C?
A) 14 minutos B) 35 minutos C) 1 h 10 min D) 2 h 20 min

65. Victoria tiene \$38.000 en efectivo, gasta \$4.500 en una entrada al cine, retira \$20.000 de su cuenta y compra un regalo de \$12.000. ¿Qué expresión permite calcular el dinero en efectivo que le queda?
A) $38{,}000 - 4{,}500 + 20{,}000$ B) $38{,}000 - 4{,}500 - 20{,}000 - 12{,}000$ C) $38{,}000 - 4{,}500 + 20{,}000 + 12{,}000$
D) $38{,}000 - 4{,}500 + 20{,}000 - 12{,}000$

Bloque D Ejercicios M2 — 20 ejercicios

1. Sean $a > b$ y $b > c$, siendo a, b y c números enteros. Si $b = 0$, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?
A) $a \cdot c > 0$ B) $a \cdot b > b$ C) $c^2 < 0$ D) $a - c > 0$

2. Se puede determinar que el número entero p es par si:
(1) El doble de p es par.
(2) El quíntuple de p es par.
A) (1) por sí sola.
B) (2) por sí sola.
C) Ambas juntas, (1) y (2).
D) Cada una por sí sola, (1) o (2).
E) Se requiere información adicional.

3. Si A, B, C y D son enteros tales que $A > B$, $C > D$, $B < D$ y $C < A$, el orden decreciente es:
A) $BDCA$ B) $ACDB$ C) $ACBD$ D) $BDAC$

4. En una competencia de ciclismo, un corredor gana A carreras y pierde B carreras. Su puntaje final se obtiene restando a las carreras ganadas el triple de las perdidas. ¿Cuál es su puntaje final?
A) $3A - 3B$ B) $3A - B$ C) $A - 3B$ D) $A - \frac{1}{3}B$

5. Si $A^* = A^2 + 1$, entonces $(3^* + 1)^* =$
A) 49 B) 50 C) 100 D) 121 E) 122

6. Si a y b son enteros y la suma de $a \cdot b$ y b es impar, ¿qué aseveración es verdadera?
A) a y b son pares.
B) a y b son impares.
C) a es par y b es impar.
D) a es impar y b es par.

7. Sea n un número entero. La expresión $3 \cdot (3 + n)$ representa un múltiplo de 6 si:
(1) n es impar.
(2) $n + 1$ es par.
A) (1) por sí sola.
B) (2) por sí sola.
C) Ambas juntas.
D) Cada una por sí sola.
E) Se requiere información adicional.

8. ¿Qué valor toma la expresión $-b^2 \cdot a^{-3}$ cuando $a = -3$ y $b = -2$?
A) $\frac{9}{8}$ B) $-\frac{7}{9}$ C) $\frac{4}{27}$ D) $-\frac{4}{27}$ E) Ninguna de las anteriores.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
A) El 1 es un número compuesto.
B) Todo número entero elevado a cero es 1.
C) El 1 es múltiplo de todos los enteros.
D) El 1 es divisor de todos los naturales.
E) El 1 es el neutro aditivo en los enteros.

10. Sean los enteros a, b y c. Se puede determinar cuál de ellos es el menor si:
(1) $a - b < 0$.
(2) $a - c > 0$.
A) (1) por sí sola.
B) (2) por sí sola.
C) Ambas juntas.
D) Cada una por sí sola.
E) Se requiere información adicional.

11. Si el sucesor de un número es $m + 3$, entonces el doble del antecesor del número es:
A) $m + 1$ B) $m + 2$ C) $2m + 1$ D) $2m + 2$

12. Si m y n son dos enteros consecutivos tales que $m < n$, entonces $n - m$ es:
A) 0 B) 1 C) $m^2 + m$ D) $2m + 1$

13. ¿Cuál es la cifra de la unidad de la operatoria $2^{42} + 3^{901}$?
A) 2 B) 5 C) 7 D) 9

14. Si N es un número entero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
A) $(N^2 - 1)$ es el entero antecesor del cuadrado de N.
B) $-(N - 1)$ es el antecesor de N.
C) $(N + 1)^2$ es el sucesor del cuadrado de N.
D) $2N - 2$ es el antecesor del doble de N.

15. Se puede asegurar que P es divisible por 8 si:
(1) Sus últimas cuatro cifras son ceros.

(2) Su última cifra es par.
A) (1) por sí sola.
B) (2) por sí sola.
C) Ambas juntas.
D) Cada una por sí sola.
E) Se requiere información adicional.

16. Sean a, b, c y d cuatro números primos distintos. El recíproco del cociente entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre ellos es:
A) $abcd$ B) $\frac{1}{abcd}$ C) $\frac{abcd}{4}$ D) $4abcd$

17. Una persona debe reunir A pesos. Primero reúne B pesos y luego gasta C pesos. ¿Cuánto le falta para completar el monto que necesita, si $A > B > C$?
A) $A + B - C$ B) $C + A - B$ C) $-A - (C - B)$ D) $A - (B - C)$

18. Benjamín tiene ahorradas 12 monedas de \$50, 25 monedas de \$100 y el resto en monedas de \$500, de manera que en total tiene \$7.100. Si cambia todas las monedas de \$500 por monedas de \$50, ¿cuántas monedas tendrá en total?
A) 8 B) 80 C) 105 D) 117

19. Los números siguientes ordenados de manera creciente son:

$$A = 20^{10}, \quad B = 3^{40}, \quad C = 12^{20}, \quad D = 2^{50}$$

A) A, D, B, C B) A, B, D, C C) D, B, C, A D) D, B, A, C E) C, B, D, A

20. Ana tiene X cantidad de dinero en efectivo, gasta A en un almuerzo, luego retira de su cuenta bancaria B y compra un libro por C. ¿Qué expresión calcula el dinero en efectivo que le queda?
A) $X - A + B - C$ B) $X - A - B - C$ C) $X + A - B + C$ D) $X + A + B + C$

Bloque E Respuestas

Observación. Se mantiene la tabla de respuestas del material entregado. La primera columna corresponde a **Ejemplos**, la segunda y tercera a **M1**, y la última a **M2**.

1. B		1.	A	21.	A	41.	C	61.	C	1.	D
2.	B	2.	B	22.	C	42.	C	62.	D	2.	B
3.	B	3.	A	23.	C	43.	C	63.	A	3.	B
4.	A	4.	C	24.	D	44.	A	64.	C	4.	C
5.	A	5.	B	25.	C	45.	D	65.	D	5.	E
6.	B	6.	D	26.	A	46.	C			6.	C
7.	B	7.	C	27.	D	47.	A			7.	D
8.	C	8.	C	28.	A	48.	C			8.	C
9.	A	9.	D	29.	D	49.	C			9.	D
10.	C	10.	C	30.	B	50.	C			10.	C
11.	B	11.	C	31.	D	51.	C			11.	D
12.	C	12.	D	32.	B	52.	B			12.	B
13.	A	13.	A	33.	B	53.	A			13.	C
14.	D	14.	D	34.	B	54.	B			14.	A
15.	D	15.	C	35.	A	55.	C			15.	A
16.	C	16.	B	36.	C	56.	C			16.	A
17.	B	17.	B	37.	B	57.	C			17.	B
18.	C	18.	C	38.	C	58.	A			18.	D
19.	B	19.	D	39.	D	59.	C			19.	A
20.	C	20.	B	40.	D	60.	A			20.	A