

# TASA DE CRIMINALIDAD EN USA



## MODELOS LÍNEALES TRABAJO FINAL

Ignacio Acosta - Sofía Itté - Mauro Loprete  
1er semestre 2021

# Índice

<b>1. Introducción</b>	<b>2</b>
<b>2. Análisis Exploratorio de datos</b>	<b>3</b>
2.1. Análisis Univariado . . . . .	3
2.1.1. Histogramas y Barplots . . . . .	4
2.1.2. Medidas de resumen . . . . .	6
2.1.3. Correlación entre variables . . . . .	6
<b>3. Introducción al Modelo Completo</b>	<b>7</b>
3.1. Modelo Completo . . . . .	8
<b>4. Diagnóstico</b>	<b>9</b>
4.1. Análisis de multicolinealidad . . . . .	9
4.2. Método Stepwise . . . . .	10
4.3. Búsqueda de observaciones influyentes . . . . .	11
4.4. Heterosedasticidad . . . . .	11
4.4.1. Test de Breusch-Pagan . . . . .	11
4.5. Normalidad . . . . .	12
<b>5. Anexo</b>	<b>13</b>
5.1. Selección de Modelos : StepWise . . . . .	13
5.2. Script de R . . . . .	17
<b>6. Bibliografía</b>	<b>17</b>

## Índice de figuras

1. Histograma de la Tasa de Criminalidad . . . . .	2
2. Histogramas (1) . . . . .	4
3. Histogramas (2) . . . . .	5
4. Mapa de correlación de variables incluidas . . . . .	6

# 1. Introducción

El objetivo de este informe es la construcción de un modelo de regresión lineal múltiple que explique la tasa de criminalidad en USA (número de ofensas reportadas a la policía por habitante).

Para ello se hará uso de una base de datos con un conjunto de variables que en principio se encuentran relacionadas con la variable a explicar.

Haciendo uso de las distintas técnicas estadísticas aprendidas en el curso se buscará descartar variables cuyo aporte no sea suficientemente significativo. Esto busca llegar a un modelo final eficiente (es decir, que explique la tasa de criminalidad de manera acertada haciendo uso de la menor cantidad de variables posibles).

En el transcurso del texto se pondrán a prueba las distintas hipótesis centrales del modelo, tales como la normalidad de los errores y la heteroscedasticidad.

También se trabajará con las observaciones y la existencia de algunas que aporten el mismo nivel de información.

El herramienta gráfico juega un rol fundamental al momento de transmitir la información de manera concisa y entendible. El mismo se encuentra respaldado por tablas que resumen la información de manera más detallada.

Cabe destacar que las observaciones se corresponden con los distintos estados de Estado Unidos.

De manera general se muestra el comportamiento de  $y$  de manera resumida:



**Figura 1:** Histograma de la Tasa de Criminalidad

Es claro que  $y$  cuenta con una distribución medianamente asimétrica, tiene un intervalo modal entre los valores de 500 y 800 ofensas (13 estados presentan una tasa de criminalidad comprendida entre esos valores).

## 2. Análisis Exploratorio de datos

El objetivo de esta sección es presentar las variables a estudiar y como las mismas se relacionan entre sí.

Para ello se hará uso de distintas medidas de resumen univariadas y bivariadas, así como también un herramental gráfico variado que simplificará el entendimiento de las mismas.

Es esta sección fundamental al momento de discutir el modelo final y como a partir de distintas técnicas estadísticas aprendidas en el curso se puede simplificar el *modelo completo* que se presentará en la sección siguiente.

### 2.1. Análisis Univariado

En esta primer sección se hará especial énfasis en las variables por sí mismas.

Se estudiarán medidas de resumen y a partir de histogramas tendremos un primer acercamiento a la distribución de las mismas y su comportamiento.

Nombre	Descripción	Clasificación
<b>Y</b>	Tasa de criminalidad, número de ofensas reportadas a la policía por habitante	Cuantitativa
<b>M</b>	Número de hombres entre 14 y 24 años cada 1000 habitantes	Cuantitativa
<b>So</b>	Variables indicadora de los estados del sur (0=No, 1=Si)	Cualitativa
<b>Ed</b>	Índice que refleja la escolaridad del estado	Cuantitativa
<b>Po1</b>	Gasto per cápita en policía realizado por el gobierno estatal o local en 1960	Cuantitativa
<b>Po2</b>	Gasto per cápita en policía realizado por el gobierno estatal o local en 1959	Cuantitativa
<b>LF</b>	Tasa de participación en la fuerza laboral civil de sexo masculino entre 14 y 24 años, cada 1000 habitantes	Cuantitativa
<b>M.F</b>	Número de hombres por cada 1000 mujeres	Cuantitativa
<b>Pop</b>	Tamaño de la población del estado cada 100000 habitantes	Cuantitativa
<b>NW</b>	Número de no caucásicos cada 1000 habitantes	Cuantitativa
<b>U1</b>	Tasa de desempleo urbana de hombres entre 14 y 24 años por 1000 habitantes	Cuantitativa
<b>U2</b>	Tasa de desempleo urbana de hombres entre 35 y 39 años por 1000 habitantes	Cuantitativa
<b>GDP</b>	Producto bruto interno per cápita	Cuantitativa
<b>Ineq</b>	Desigualdad del ingreso	Cuantitativa
<b>Prob</b>	Probabilidad de encarcelamiento	Cuantitativa
<b>Time</b>	Tiempo promedio de estadía en cárceles estatales	Cuantitativa

**Cuadro 1:** Variables a trabajar

### 2.1.1. Histogramas y Barplots



Figura 2: Histogramas (1)



**Figura 3:** Histogramas (2)

Como se verá en los histogramas presentados a continuación y haciendo uso de la tabla (más precisamente del **CV**) es claro que las variables, de manera generalizada, presentan una variabilidad baja.

De manera más específica, los histogramas de las variables M, Po1, Nw, Po2, M.F, Pop, U1, U2, Prob y Time cuentan con una distribución asimétrica. La variabilidad entre los valores comprendidos hasta la mediana (aunque baja, como ya se mencionó) es menor que en el resto de las observaciones.

En el caso de la variable GDP y LF, la distribución a diferencia del resto es aproximadamente simétrica. La mediana y la media difieren en un número despreciable.

La variable Ineq también cuenta con una distribución asimétrica pero a diferencia de las demás, cuenta con menor variabilidad entre las observaciones en el tramo central (primer cuartil a tercer cuartil).

### 2.1.2. Medidas de resumen


Se presenta en forma de tabla el resumen de las variables numéricas. En el mismo se presenta el valor mínimo y máximo de cada variable, medidas de tendencia central tales como lo son el primer y tercer cuartil, junto a la mediana.

A su vez, para estudiar la dispersión se incluye la media aritmética y una medida de variabilidad de la misma, el coeficiente de variación.

**Cuadro 2:** Medidas descriptivas para variables numéricas

Variable	Min	1er Qu.	Mediana	3er Qu.	Max	Media	CV*100
Número de Hombres 14-24 / 1.000	119.0	130.0	136.0	146.0	177.0	138.6	9.1
Índice Escolaridad	87	98	108	114	122	106	11
Gasto per cápita 1.960	45	62	78	104	166	85	35
Gasto per cápita 1.959	41	58	73	97	157	80	35
Tasa participación masculina 14-24 por 1.000	480.0	530.5	560.0	593.0	641.0	561.2	7.2
Hombres cada 1.000 mujeres	934	964	977	992	1071	983	3
Población cada 100.000	3	10	25	42	168	37	104
Número de no caucásicos cada 1.000 habitantes	2	24	76	132	423	101	102
Tasa desempleo urbana Hombres 14-24 por 1.000	70	80	92	104	142	95	19
Tasa desempleo urbana Hombres 35-39 por 1.000	20	28	34	38	58	34	25
Producto bruto interno per cápita	288	460	537	592	689	525	18
Desigualdad ingreso	126	166	176	228	276	194	21
Probabilidad Encarcelamiento	0.69	3.27	4.21	5.45	11.98	4.71	48.28
Tiempo de estadía en cárceles	12	22	26	30	44	27	27
Tasa de criminalidad	342	658	831	1058	1993	905	43

### 2.1.3. Correlación entre variables



**Figura 4:** Mapa de correlación de variables incluidas

### 3. Introducción al Modelo Completo

El objetivo de esta sección es la aplicación de las distintas técnicas estadísticas impartidas en el curso para así llegar a un modelo final que no solo sea significativo al momento de estimar a  $y$ , sino que también se adecúe a los supuestos y propiedades deseadas (ganando de esta manera fidelidad).

De manera resumida podría decirse que este informe seguirá fielmente el principio de *parsimonia*<sup>1</sup>. Respetando en todo momento el objetivo principal, la creación de un modelo lo más certero posible.

En una primer instancia se planteará el **Modelo completo** constituido por la totalidad de las variables de las cuales se poseen datos.

Claro está, se podría haber planteado en primera instancia un *modelo inicial* (es decir, que contenga parte de las variables). No es esto errado, sin embargo es este un procedimiento que requiere de cierta experiencia en el tema de criminología.

Como ya es sabido, variables que presentan una correlación muy alta no son (en general) marginalmente significativas al momento de definir la variable de respuesta.

Esto se evidencia en los tests de hipótesis en donde se analiza el aporte de cada variable dada las demás variables. Una correlación alta entre variables, podría indicar que parte de la información que aportan una de ellas está también presente en otra y esa cantidad de información se vió cuantificada de manera previa. Lo que tarde o temprano llevaría a descartar alguna de ellas.

Al comienzo de este trabajo jugó este principio de la correlación un rol monumental. Basándose en la alta correlación de variables 2 a 2, se procedió a retirar de la dupla a aquella que menor correlación mantenía con  $y$ .

Esto es en principio coherente, a pesar de ello y tras el análisis de disntitos panoramas, el caso particular de **Ineq** y **GDP** dejó en claro que esta técnica fue en un principio apresurada. Si bien las variables comparten gran nivel de información, tras la aplicación de las técnicas de **Forward, Backwards, Stepwise** ambas variables eran incluídas en el modelo en todo escenario.

Esta situación subyace de que incluso cuando ambas comparten un nivel elevado de información, el aporte único de las mismas es alto en comparación con el resto de las variables presentadas.

Lo último se vió claramente en el  $R_a^2$  de los modelos finales.

En principio, a partir del “arsenal” descriptivo es claro que:

- **Ineq** y **GDP** tienen una correlación negativa altísima (-0.884).
- **P01** y **P02** poseen una correlación negativa casi perfecta (0.994)
- **Ineq** y **Ed** tienen también una correlación negativa bastante alta (-0,794)
- **SO** y **NW** mantienen una correlación positiva y de nivel alto (0,767)

Como veremos en las siguientes secciones del documento, el caso de **Ineq** y **GDP** es particular. Como se pensó en un principio, en el resto de las duplas muy probablemente sobreviva una sola de las variables (si no es que ambas son descartadas).

---

<sup>1</sup>Frugalidad y moderación en los gastos.



### 3.1. Modelo Completo

Como una primera aproximación, se construye un modelo donde se incluyen todas las variables de la tabla de datos, en concreto el siguiente modelo de regresión:

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 Time + \beta_2 Prob + \dots \beta_M M$$

**Cuadro 3:** Test sobre el modelo completo

$R^2_{adj}$	RSE	F Obs.	P-valor*100	Regresión.gl	Residuos.gl
70.781	209.064	8.429	0	15	31

Recordando que el  $R^2_a$  hace referencia al porcentaje de variabilidad de  $\mathbf{y}$  que es explicada con el modelo estimado, se considera al mismo como *aceptable*. Por otro lado, haciendo referencia a la significación del modelo, se consideranda el siguiente test de hipótesis y el estadístico  $F$  :

$$H_0) \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1) \text{No } H_0$$

$$F_{obs} = \frac{SCE/Regresion.gl}{RSE^2} = \frac{SCE/Regresion.gl}{SCR/Residuos.gl} = \frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 / Regresion.gl}{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 / Residuos.gl}$$

Siendo  $SCE$  la suma de cuadrados explicados por la regresión y  $RSE^2$  el cuadrado del error estándar de los residuos, resulta para este caso particular  $SCE = 5.525.982$  y  $RSE^2 = 43707,766$ , de esta manera se obtiene el  $F_{obs}$  que permite rechazar  $H_0$  y así afirmar que el modelo es estadísticamente significativo para explicar a  $\mathbf{y}$ .

A continuación se testea la significación de cada variable en forma independiente, los resultados se muestran en el siguiente cuadro :

**Cuadro 4:** Estimación,error estandar y test individual del modelo completo

Variable	Estimación	Error estandar	Estadístico F	P valor	$(H_0^{\alpha=0.05}) \beta_i = 0$
Intercepto	-5984.288	1628.318	-3.675	0.001	Se rechaza H0
Número de Hombres 14-24 / 1.000	8.783	4.171	2.106	0.043	Se rechaza H0
Indicadora Estado Sur	-3.803	148.755	-0.026	0.980	No se rechaza H0
Índice Escolaridad	18.832	6.209	3.033	0.005	Se rechaza H0
Gasto per cápita 1.960	19.280	10.611	1.817	0.079	No se rechaza H0
Gasto per cápita 1.959	-10.942	11.748	-0.931	0.359	No se rechaza H0
Tasa participación masculina 14-24 por 1.000	-0.664	1.470	-0.452	0.655	No se rechaza H0
Hombres cada 1.000 mujeres	1.741	2.035	0.855	0.399	No se rechaza H0
Población cada 100.000	-0.733	1.290	-0.568	0.574	No se rechaza H0
Número de no caucásicos cada 1.000 habitantes	0.420	0.648	0.649	0.521	No se rechaza H0
Tasa desempleo urbana Hombres 14-24 por 1.000	-5.827	4.210	-1.384	0.176	No se rechaza H0
Tasa desempleo urbana Hombres 35-39 por 1.000	16.780	8.234	2.038	0.050	No se rechaza H0
Producto bruto interno per cápita	0.962	1.037	0.928	0.361	No se rechaza H0
Desigualdad ingreso	7.067	2.272	3.111	0.004	Se rechaza H0
Probabilidad Encarcelamiento	-48.553	22.724	-2.137	0.041	Se rechaza H0
Tiempo de estadía en carceles	-3.479	7.165	-0.486	0.631	No se rechaza H0

A partir del cuadro presentado y conforme a los tests realizados, se ve claramente que son tan solo 4 son las variables que de manera independiente (y **muy importante, en presencia de todas las demás**) logran un aporte significativo al momento de explicar el comportamiento de la tasa de criminalidad.

Ellas son **M,PO1,U2** y por último **Prob\*1000**.

¿Significa esto que se debe descartar el resto de las variables y plantear un modelo caracterizado por tan solo las 4?, la respuesta es **no**.

Como bien se menciona anteriormente, los tests analizan el aporte dada las demás variables. Una correlación alta entre variables, podría indicar que parte de la información que aportan una de ellas está también presente en otra y esa cantidad de información se vio cuantificada de manera previa.

Con base en esta última afirmación es que se promueve el uso de distintas técnicas que nos permitirán elegir las variables de manera más acertada (y teniendo en cuenta este panorama).

## 4. Diagnóstico

### 4.1. Análisis de multicolinealidad

Considerando el problema brevemente mencionado, se analizara la multicolinealidad (aproximada) de las variables independientes del modelo planteado, esto es relevante ya que si existe una relación lineal en la matriz de diseño, esto impactaría directamente en la varianza de los regresores  $\beta_k = (X^T X)^{-1} X^T$ , haciendo que las estimaciones varíen ante pequeñas variaciones en nuestras observaciones y las predicciones serían menos confiables.

Estamos en frente a un problema de multicolinealidad aproximada cuando es posible afirmar que existe una relación lineal entre las variables explicativas. El término aproximado refiere al hecho que en el caso que se cumpla el fenómeno de forma exacta, la matriz no sería invertible y no existirían estimaciones únicas de los regresores (Teorema de Gauss Markov) y no estaríamos frente a estimadores eficientes (insesgados y de mínima varianza)

Recordando que :

$$\hat{\beta}_k \sim N\left(\beta, \sigma^2 (X^T X)^{-1}\right)$$

Como se mencionó anteriormente, ante una posible relación lineal el determinante de la matriz  $X^T X$  sería próximo a cero, obteniendo un determinante de la matriz inversa demasiado grande. Es decir para un  $\sigma^2$  fijo la incertidumbre sería demasiado alta, considerando el hecho que en nuestra primera aproximación a un modelo de regresión es globalmente significativo pero salvo en una cantidad demasiado pequeña se puede afirmar que, de forma independiente existe una relación lineal con la tasa de criminalidad, es por esto que se cuantificara la intensidad de la multicolinealidad con el **Factor de inflación de varianza**.

El **VIF** nos indica en cuantas unidades se incrementa la varianza del estimador ante presencia de colinealidad y se define como :

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

Donde  $R_j^2$  hace referencia al coeficiente de determinación de una regresión que intenta establecer una relación lineal de  $X_j$  con las demás variables explicativas.

Pondremos a prueba las variables explicativas del modelo anteriormente mencionado y diremos que estamos frente a problemas de colinealidad con un  $VIF \geq 10$ , los resultados se muestran en el cuadro a continuación.

**Cuadro 5:** Prueba de multicolinealidad : Factor de incremento de Varianza **VIF**

Variable	VIF	Prueba
Número de Hombres 14-24 / 1.000	2.892	No hay problema de colinealidad
Indicadora Estado Sur	5.343	No hay problema de colinealidad
Índice Escolaridad	5.077	No hay problema de colinealidad
Gasto per cápita 1.960	104.659	Problema de colinealidad
Gasto per cápita 1.959	113.559	Problema de colinealidad
Tasa participación masculina 14-24 por 1.000	3.713	No hay problema de colinealidad
Hombres cada 1.000 mujeres	3.786	No hay problema de colinealidad
Población cada 100.000	2.537	No hay problema de colinealidad
Número de no caucásicos cada 1.000 habitantes	4.674	No hay problema de colinealidad
Tasa desempleo urbana Hombres 14-24 por 1.000	6.064	No hay problema de colinealidad
Tasa desempleo urbana Hombres 35-39 por 1.000	5.089	No hay problema de colinealidad
Producto bruto interno per cápita	10.530	Problema de colinealidad
Desigualdad ingreso	8.645	No hay problema de colinealidad
Probabilidad Encarcelamiento	2.809	No hay problema de colinealidad
Tiempo de estadía en cárceles	2.714	No hay problema de colinealidad

En base a esto, podemos afirmar que este modelo presenta problemas con la colinealidad y es por esto que se continuará con la selección a pasos por el método Stepwise.

## 4.2. Método Stepwise

El método de Stepwise (basado en el  $F$ -Test) inicia seleccionando aquella variable que tiene una mayor correlación con la variable  $y$ , la segunda en ingresar al modelo es aquella que mayor SCE( $X$ |demás variables).

**Cuadro 6:** Estimación, error estándar y test individual tras aplicar el método Stepwise

Variable	Estimación	Error estándar	Estadístico F	P valor	$(H_0^{\alpha=0.05}) \beta_i = 0$
Intercepto	-5040.505	899.843	-5.602	0.000	Se rechaza H0
Gasto per capita en policía 1960	11.502	1.375	8.363	0.000	Se rechaza H0
Desigualdad del ingreso	6.765	1.394	4.855	0.000	Se rechaza H0
Índice que refleja la escolaridad del estado	19.647	4.475	4.390	0.000	Se rechaza H0
Número de hombres entre 14 y 24 / 1000	10.502	3.330	3.154	0.003	Se rechaza H0
Probabilidad de encarcelamiento	-38.018	15.281	-2.488	0.017	Se rechaza H0
Tasa de desempleo urbana hombres 35-39 años x 1000	8.937	4.091	2.185	0.035	Se rechaza H0


### 4.3. Búsqueda de observaciones influyentes

En esta sección se buscará estudiar cuales de las observaciones presentan valores influyentes, para ello se hará uso de la Distancia de Cook.

Esta es una medida del nivel de influencia de la observación  $i$ -ésimas sobre la estimación de  $\hat{\beta}$ , es decir se busca medir si su presencia o ausencia en el modelo hace que el mismo cambie.

Una distancia de Cook elevada significa que una observación tiene mayor influencia al momento de determinar los  $\hat{\beta}$ .

$$D_i = \frac{(\hat{\beta} - \hat{\beta}(-i))' X' X (\hat{\beta} - \hat{\beta}(-i))}{(k + 1) \hat{\sigma}^2}$$



Tomando como regla empírica el valor de  $\frac{4}{n-k-1} = 4/40$  puede verse que las observaciones **11**, **29** (de manera excesiva) y **18** sobrepasan la regla estipulada.


Por ende, se decide retirarlas del modelo reducido ya que las mismas tienen una influencia preponderante en la estimación. Como se vió en clase, observaciones de este tipo pueden llevar a un modelo alejado de la realidad.

### 4.4. Heterosedasticidad

#### 4.4.1. Test de Breusch-Pagan

```
##
## studentized Breusch-Pagan test
##
## data: .
## BP = 4.0658, df = 6, p-value = 0.6678
```

## 4.5. Normalidad




Considerando los gráficos anteriormente mencionados podemos ver que la esperanza de los errores se mantiene cercana a cero, a diferencia de algunas observaciones, a su vez, no encontramos un patrón en la dispersión de los errores, en cambio en la gráfica QQ-plot podemos ver que en valores centrales de la distribución se asemeja a una distribución normal a excepción de la observación 40,11 y 6.

```
## Error: <text>:32:0: unexpected end of input
## 30:
## 31:
## ^
```

En base a los test puedo afirmtar que la distribución de los errores es normal.  
Me tranque en como presentar una tabla , lo miro luego

## 5. Anexo



### 5.1. Selección de Modelos : StepWise

```
## Stepwise regression (forward-backward), alpha-to-enter: 0.15, alpha-to-remove: 0.15
##
## Full model: y ~ M + So + Ed + Po1 + Po2 + LF + M.F + Pop + NW + U1 + U2 +
## GDP + Ineq + Prob + Time
```

```
## <environment: 0x0000000021996858>
##
## --- Step (forward) 1 ---
## Single term additions
##
## Model:
## y ~ 1
##      Df Sum of Sq      RSS      AIC F value      Pr(>F)
## <none>                6250417 524.01
## M      1      4106 6246310 525.99  0.0276  0.868824
## So      1     23206 6227211 525.85  0.1565  0.694390
## Ed      1     725865 5524551 520.58  5.5183  0.023597 *
## Po1     1    3337539 2912878 492.42 48.1231 1.788e-08 ***
## Po2     1    3096493 3153924 495.92 41.2352 9.828e-08 ***
## LF      1     227378 6023039 524.38  1.5856  0.214916
## M.F     1     471590 5778827 522.56  3.4275  0.071160 .
## Pop     1     555473 5694944 521.92  4.0966  0.049361 *
## NW      1       6196 6244221 525.97  0.0417  0.839228
## U1      1        39 6250377 526.01  0.0003  0.987098
## U2      1     198725 6051692 524.59  1.3792  0.246855
## GDP     1    1035651 5214766 518.04  8.3412  0.006102 **
## Ineq    1     144104 6106313 524.99  0.9912  0.325159
## Prob    1    1290740 4959676 515.84 10.9304  0.001943 **
## Time    1      17735 6232682 525.89  0.1195  0.731295
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## --- Step (forward) 2 ---
## Single term additions
##
## Model:
## y ~ Po1
##      Df Sum of Sq      RSS      AIC F value      Pr(>F)
## <none>                2912878 492.42
## M      1     686350 2226528 482.60 12.6387 0.0009689 ***
## So      1     444671 2468207 487.13  7.3865 0.0095849 **
## Ed      1      36496 2876382 493.87  0.5202 0.4748445
## Po2     1     160925 2751953 491.92  2.3975 0.1292107
## LF      1      6046 2906832 494.33  0.0853 0.7717476
## M.F     1     135020 2777858 492.33  1.9928 0.1655889
## Pop     1      3504 2909374 494.37  0.0494 0.8252479
## NW      1     336999 2575879 489.01  5.3640 0.0256344 *
## U1      1       616 2912262 494.41  0.0087 0.9262832
## U2      1      9482 2903396 494.28  0.1339 0.7163006
## GDP     1     421443 2491435 487.54  6.9354 0.0118648 *
## Ineq    1     931365 1981513 477.47 19.2711 7.779e-05 ***
## Prob    1       916 2911962 494.41  0.0129 0.9101458
## Time    1     24418 2888460 494.05  0.3466 0.5592728
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```

##
##
## --- Step (forward) 3 ---
## Single term additions
##
## Model:
## y ~ Po1 + Ineq
##      Df Sum of Sq      RSS      AIC F value   Pr(>F)
## <none>                1981513 477.47
## M      1      162014 1819500 475.71   3.5617 0.066398 .
## So     1       2446 1979068 479.41   0.0494 0.825193
## Ed     1      399620 1581893 469.56  10.1049 0.002852 **
## Po2    1       22716 1958797 478.96   0.4639 0.499737
## LF     1       91565 1889948 477.39   1.9379 0.171585
## M.F    1      266756 1714757 473.11   6.2226 0.016843 *
## Pop    1       48237 1933277 478.38   0.9980 0.323794
## NW     1       25754 1955759 478.89   0.5267 0.472206
## U1     1        6645 1974869 479.32   0.1346 0.715660
## U2     1        6907 1974606 479.31   0.1399 0.710334
## GDP    1       56175 1925339 478.20   1.1671 0.286477
## Prob   1       74359 1907155 477.79   1.5596 0.218988
## Time   1        1246 1980267 479.44   0.0252 0.874749
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## --- Step (forward) 4 ---
## Single term additions
##
## Model:
## y ~ Po1 + Ineq + Ed
##      Df Sum of Sq      RSS      AIC F value   Pr(>F)
## <none>                1581893 469.56
## M      1      232602 1349291 464.56   6.7232 0.01333 *
## So     1      23076 1558817 470.91   0.5773 0.45192
## Po2    1      39581 1542313 470.44   1.0009 0.32327
## LF     1       4129 1577764 471.44   0.1021 0.75108
## M.F    1      65074 1516819 469.71   1.6732 0.20345
## Pop    1      12861 1569032 471.20   0.3197 0.57504
## NW     1       1591 1580302 471.51   0.0393 0.84395
## U1     1      18306 1563588 471.05   0.4566 0.50321
## U2     1      26898 1554995 470.80   0.6746 0.41644
## GDP    1       4980 1576913 471.42   0.1232 0.72752
## Prob   1     103514 1478380 468.58   2.7307 0.10647
## Time   1      21233 1560660 470.96   0.5306 0.47071
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## --- Step (forward) 5 ---
## Single term additions

```



```

##
## Model:
## y ~ Po1 + Ineq + Ed + M
##      Df Sum of Sq      RSS      AIC F value  Pr(>F)
## <none>                1349291 464.56
## So      1         2303 1346988 466.48  0.0650 0.80017
## Po2     1        50071 1299220 464.90  1.4645 0.23369
## LF      1         9938 1339353 466.23  0.2820 0.59851
## M.F     1        40031 1309260 465.23  1.1618 0.28788
## Pop     1         1276 1348015 466.52  0.0360 0.85057
## NW      1        22201 1327090 465.83  0.6357 0.43022
## U1      1        87235 1262056 463.62  2.6266 0.11336
## U2      1       149794 1199497 461.38  4.7455 0.03565 *
## GDP     1        36869 1312422 465.34  1.0675 0.30804
## Prob    1       108374 1240917 462.88  3.3187 0.07637 .
## Time    1         4027 1345264 466.43  0.1138 0.73776
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## == Step (forward) 6 ==
## Single term additions
##
## Model:
## y ~ Po1 + Ineq + Ed + M + U2
##      Df Sum of Sq      RSS      AIC F value  Pr(>F)
## <none>                1199497 461.38
## So      1         1211 1198286 463.34  0.0374 0.84772
## Po2     1        42642 1156855 461.79  1.3638 0.25034
## LF      1         943 1198554 463.35  0.0291 0.86548
## M.F     1        11053 1188444 462.97  0.3441 0.56103
## Pop     1         6246 1193251 463.15  0.1937 0.66243
## NW      1        25736 1173761 462.43  0.8113 0.37357
## U1      1         2041 1197457 463.31  0.0631 0.80313
## GDP     1        20961 1178536 462.61  0.6581 0.42243
## Prob    1       126860 1072637 458.46  4.3760 0.04337 *
## Time    1         2658 1196839 463.28  0.0822 0.77597
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## == Step (forward) 7 ==
## Single term additions
##
## Model:
## y ~ Po1 + Ineq + Ed + M + U2 + Prob
##      Df Sum of Sq      RSS      AIC F value  Pr(>F)
## <none>                1072637 458.46
## So      1        10351 1062286 460.04  0.3508 0.5574
## Po2     1        31664 1040973 459.14  1.0950 0.3023
## LF      1         779 1071858 460.43  0.0262 0.8724

```

```
## M.F      1      11081 1061557 460.01  0.3758 0.5437
## Pop      1      22553 1050084 459.53  0.7732 0.3851
## NW       1       2971 1069666 460.34  0.1000 0.7537
## U1       1       3890 1068747 460.30  0.1310 0.7195
## GDP      1          0 1072637 460.46  0.0000 0.9979
## Time     1      31921 1040717 459.13  1.1042 0.3004
##
## Call:
## lm(formula = y ~ Po1 + Ineq + Ed + M + U2 + Prob, data = Datos)
##
## Coefficients:
## (Intercept)          Po1          Ineq          Ed          M          U2
##   -5171.280       12.108        7.016       19.835       10.575        8.743
##          Prob
##       -37.296
```

## 5.2. Script de R

## 6. Bibliografía