

A
B
Great tits Wytham Woods, UK
Great tits Hoge Veluwe, the Netherlands
Collared flycatchers Gotland, Sweden
Song sparrows Mandarte Island, Canada
Birds
Red deer Isle of Rum, UK
Soay sheep St. Kilda, UK
Bighorn sheep Ram Mountain, Canada
Rhesus macaques Cayo Santiago, Puerto Rico
Yellow baboons Amboseli National Park, Kenya
Mammals
10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^{0}
Effective size relative to census, N_e/N
cM/Mb
2.0
2.1
3.2
1.6
1.0
1.3
1.1
0.8
0.8
0.6 0.8 1.0
$\overline{\Omega}$, maps only
Unlinked: $1/(1+4\kappa\hat{V}_A)$, mode and 95% HPD
With linkage (total): $\overline{\Omega}/(1+4\kappa\hat{V}_A)$, over measured DFEs; faint: and over the HPD
Observed: δ, π of study species
Observed: δ, π from another population
C
Chromosome Ω_i
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}
Selective target per Morgan, f_i/M_i
chromosome ≥ 20 Mb
microchromosome < 20 Mb
Birds
Mammals