
$P(\hat{s}^* > \bar{s})$
Birds
Hihi (Tiritiri Matangi Island, New Zealand)
Hihi (Karori, New Zealand)
Blue tits (La Rouvière, France)
Blue tits (Pirio, France)
Blue tits (Muro, France)
Great tits (Wytham Woods, UK)
Great tits (Hoge Veluwe, the Netherlands)
Collared flycatchers (Gotland, Sweden)
Song sparrows (Mandarte Island, Canada)
0.99
0.99
0.99
1.00
1.00
1.00
0.99
0.98
0.99
Mammals
Snow voles (Graubünden, Switzerland)
Red squirrels (Kluane, Canada)
Spotted hyenas (Ngorongoro Crater, Tanzania)
Meerkats (Kalahari, South Africa)
Red deer (Isle of Rum, UK)
Soay sheep (St. Kilda, UK)
Bighorn sheep (Ram Mountain, Canada)
Rhesus macaques (Cayo Santiago, Puerto Rico)
Yellow baboons (Amboseli National Park, Kenya)
0.71
0.89
1.00
0.89
1.00
0.99
0.99
0.97
0.99
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
Mean heterozygous selection coefficient, s
Implied $\hat{s}^* = \hat{V}_A / \hat{U}_d$: mode, 50% and 95% HPD
Mean s of new nonsynonymous mutations, assigned empirical DFE
$\hat{s}^* > 1$: no selection coefficient maintains $\hat{V}_A$