## ※サンプルレポート 様

分析ID EM73584220


姿勢スコア
**80** 点 / 100

B 評価


今回の姿勢タイプ
**ニュートラル猫背型**

0 D　50 C　70 B　85 A　100

立位・正面



立位・側面



## 分析結果（総評）

50代女性の平均と比較して、姿勢の崩れが目立ち始めています。特に上半身の重心が前方へ移動し、猫背傾向にあるため、首や肩への負担が増大している状態です。今のうちに適切なケアを行うことで、将来的な関節の変形や慢性的な痛みを防ぐことができます。もし体に痛みを感じる場合は、エクササイズを中止し、専門の医師や理学療法士に相談してください。

## 気になるポイント

●＝今回の位置　緑の帯＝良好の範囲




### 重心のズレ

良好

● **ほぼ中央**

左右の重心バランスは整っていますが、上半身の前傾により、足裏の重心がやや前方（つま先側）に寄りやすい傾向があります。

左右　←右寄り　中央　左寄り→　● 中央

前後　←前寄り　中央　後ろ寄り→　● 中央




### 猫背・反り腰

注意

● **猫背ぎみ**

若干の猫背が認められます。

猫背　● やや

反り腰　● なし




### X脚・O脚

注意

● **O脚寄り**　O脚 8.61cm

軽度のO脚傾向があります。

X脚←　普通　→O脚

## これからのために

※サンプルレポート 様 ／ 2026年11月5日 Supported by 姿勢ナビ

### このままの姿勢が続くと AIによる将来の姿勢予測



予測イメージ

**ニュートラル猫背型**

| | |
|---|---|
| 正面から | 左右差はないが背中が丸まるでしょう。胸が閉じやすいです。 |
| 横から | ストレートネックや肩こり、呼吸の浅さにつながりやすいです。 |
| 負担が出やすい所 | 首、肩、肩甲骨まわり |
| いま意識すること | 胸を開くストレッチや肩甲骨を寄せる運動を取り入れると良いでしょう。 |

### 気をつけたいこと 姿勢を放っておいた場合に出やすい順

| | | |
|---|---|---|
| **変形性膝関節症** | 85 | O脚傾向を放置すると膝の内側に過度な荷重がかかり、軟骨がすり減って痛みが出るリスクがあります。 |
| **慢性肩こり・頭痛** | 75 | 頭部と上半身の前傾（猫背）により、首から肩にかけての筋肉が常に緊張し、血流が悪化します。 |
| **逆流性食道炎・呼吸機能低下** | 60 | 猫背による胸郭の圧迫は、内臓への負担や肺の膨らみを阻害し、消化不良や疲れやすさを引き起こします。 |

### おすすめエクササイズ 最大4件




**1 キャット&カウ**

■目的：
脊椎の柔軟性向上と骨盤の動きの意識向上
■方法： 1.
四つん這いになり、肩の下に手、腰の下に膝を…




**2 小胸筋マッサージ**

■目的：
肩甲骨を正しい位置に戻す（巻き肩・猫背の改善）肩こり・首こりの原因筋を緩める
胸郭の柔軟性を高め、肩の動きを良くする…




**3 クラムシェル**

■目的： 中臀筋・外旋筋の強化 ■方法： 1.
横向きに寝て、膝を 45 度に曲げ、足を重ねる。
2.
骨盤が前後に傾かないよう固定し、上の膝をゆ…




**4 大腿筋膜張筋ストレッチ**

■目的： O脚改善 反り腰改善 膝の負担軽減
■方法： 1.
左足を右足後ろにクロスする（＊何かにつかまりながら行うとよい） 2.…

### あなたへのおすすめ

**パーソナル姿勢矯正セッション**

ユーザー様の場合、上半身の前傾とO脚が連動している可能性があるため、専門家による徒手療法で関節の可動域を広げることが、セルフケアの効果を最大化させます。

**高機能オーダーインソール**

若干のO脚傾向があり、重心が不安定になりやすいため、足元からアーチを支えて膝への負担を軽減し、立ち姿勢を安定させるインソールが有効です。

次回の計測

＿＿＿月＿＿＿日ごろ

※ 変化は4週間ほどで見えはじめます。

担当スタッフから ひとこと