





Tendance binaire commune (≥2 pays avec données valides) — Période 30 ans
Valeur binaire
Année
Période 30 ans
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Kuwae (Vanuatu, S)
Huaynaputina (Pérou, S)
Komagatake (Japon, N)
Long Island (Papouasie-NG, S)
Laki (Islande, N)
Tambora (Indonésie, S)
Cosigüina (Nicaragua, N)
Krakatoa (Indonésie, S)
Pelée / Sta María (Martinique / Guatemala, N)
Novarupta (Alaska, N)
Agung (Bali, Indonésie, S)
El Chichón (Mexique, N)
Pinatubo (Philippines, N)


Tendance binaire commune (≥2 pays avec données valides) — Période 20 ans
Période 20 ans
Valeur binaire
Année
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Kuwae (Vanuatu, S)
Huaynaputina (Pérou, S)
Komagatake (Japon, N)
Long Island (Papouasie-NG, S)
Laki (Islande, N)
Tambora (Indonésie, S)
Cosigüina (Nicaragua, N)
Krakatoa (Indonésie, S)
Pelée / Sta María (Martinique / Guatemala, N)
Novarupta (Alaska, N)
Agung (Bali, Indonésie, S)
El Chichón (Mexique, N)
Pinatubo (Philippines, N)


Tendance binaire commune (≥2 pays avec données valides) — Période 30 ans
Valeur binaire
Année
Période 30 ans
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Kuwae (Vanuatu, S)
Huaynaputina (Pérou, S)
Komagatake (Japon, N)
Long Island (Papouasie-NG, S)
Laki (Islande, N)
Tambora (Indonésie, S)
Cosigüina (Nicaragua, N)
Krakatoa (Indonésie, S)
Pelée / Sta María (Martinique / Guatemala, N)
Novarupta (Alaska, N)
Agung (Bali, Indonésie, S)
El Chichón (Mexique, N)
Pinatubo (Philippines, N)


Tendance binaire commune (≥2 pays avec données valides) — Période 20 ans
Période 20 ans
Valeur binaire
Année
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Kuwae (Vanuatu, S)
Huaynaputina (Pérou, S)
Komagatake (Japon, N)
Long Island (Papouasie-NG, S)
Laki (Islande, N)
Tambora (Indonésie, S)
Cosigüina (Nicaragua, N)
Krakatoa (Indonésie, S)
Pelée / Sta María (Martinique / Guatemala, N)
Novarupta (Alaska, N)
Agung (Bali, Indonésie, S)
El Chichón (Mexique, N)
Pinatubo (Philippines, N)


Tendance binaire commune (≥2 pays avec données valides) — Période 10 ans
Période 10 ans
Valeur binaire
Année
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Kuwae (Vanuatu, S)
Huaynaputina (Pérou, S)
Komagatake (Japon, N)
Long Island (Papouasie-NG, S)
Laki (Islande, N)
Tambora (Indonésie, S)
Cosigüina (Nicaragua, N)
Krakatoa (Indonésie, S)
Pelée / Sta María (Martinique / Guatemala, N)
Novarupta (Alaska, N)
Agung (Bali, Indonésie, S)
El Chichón (Mexique, N)
Pinatubo (Philippines, N)