

FICHE CLIMATOLOGIQUE

Fiche synthétique contenant les normales et les records d'une station.

Définition

Le règlement technique de l'OMM définit les normales comme « les moyennes calculées pour une période uniforme et relativement longue comprenant au moins trois périodes consécutives de dix années ». Dans le cas des stations pour lesquelles on ne dispose pas de 30 années, on peut utiliser des normales «ajustées », c'est-à-dire des moyennes établies sur une période plus courte que celle de la normale. Ces moyennes de courte période doivent être fondées sur des observations portant sur 10 ans au moins.

Liste de postes

Les normales sont calculées pour toutes les stations de Métropole et d'Outre-Mer (synoptiques, automatiques et postes climatologiques) disposant d'au moins 10 ans de données à la fin de l'année 2020.

Période de calcul

Les normales 1991-2020 sont calculées sur la période la plus longue possible à condition qu'il y ait au moins 10 ans de données se terminant en 2020. Cette période est au maximum égale à 1991-2020.

Les périodes de calcul s'étalent du 1er janvier au 31 décembre

Méthode de calcul

Les normales sont calculées à partir des données quotidiennes. Les paramètres quotidiens moyens non présents sont recalculés à partir des données horaires sur la période 00h-23h.

Les normales mensuelles

Le calcul des normales mensuelles s'articule sur deux niveaux de traitement :

① Un traitement dit de premier niveau qui, à partir des données de base d'un mois, calcule une donnée mensuelle (cumul, moyenne, nombre de jours, ...) en respectant les règles de gestion des manques.

② Un traitement dit de deuxième niveau qui, à partir des 30 (ou moins suivant la période) données

mensuelles obtenues précédemment, calcule les valeurs statistiques normales (moyenne, minimum et maximum) en respectant les règles de gestion des manques.

Les normales annuelles

Les normales annuelles sont calculées à partir des 12 normales mensuelles : soit en les moyennant, soit en les cumulant suivant le paramètre.

Pour un paramètre donné, les normales sont renseignées si et seulement si on dispose d'au moins 6 normales mensuelles (au moins 6 mois de renseignés).

Gestion des manques

Le calcul des normales ne peut s'effectuer que si le nombre de données manquantes n'est pas

supérieur à celui préconisé par la norme OMM (sauf pour le calcul des minima et maxima absolus quotidiens).

On a donc :

- nombre de jours, cumul : aucun manque autorisé
- moyenne quotidienne à partir des 24 observations horaires :
 - si + de 2 manques consécutifs → recours aux 8 observations tri-horaires
 - si + de 4 manques en tout → recours aux 8 observations tri-horaires
- moyenne quotidienne à partir des 8 observations tri-horaires :
 - si + de 1 manque → moyenne manquante
- moyenne mensuelle au 1er niveau :
 - si + de 4 manques consécutifs → moyenne manquante
 - si + de 10 manques en tout → moyenne manquante
- moyenne, au 2ème niveau :
 - sur 30 ans :
 - si + de 6 manques en tout → normale manquante
 - sur moins de 30 ans :
 - si + de 1/5 de manques → normale manquante