ZYRO

REZEPTUR · VERTRAULICH

100 ml Konzentrat · 3 Versionen

Testansatz: 100 ml Konzentrat = 1 Liter Getränk · Stand 11.11.2026

Testansatz für ZYRO Peach × Maracuja in drei Versionen: **A Mild**, **B Ausgewogen** (V5b), **C Frisch & exotisch**. Je 100 ml Konzentrat ergeben mit 900 ml Wasser 1 Liter Getränk. Startwerte, noch nicht verkostet.

Vorbereitung: Stammlösungen

0,09 g lassen sich mit einer 0,01-g-Waage nicht genau einwiegen (± 11 %). Deshalb Süßstoffe einmal als Lösung ansetzen, im Kühlschrank lagern und innerhalb einer Woche verbrauchen. Reicht für ca. 10 Ansätze.

Stammlösung (einmal ansetzen)	Ansatz	Gehalt
S1 Sucralose	1,00 g Sucralose + Wasser auf 100 ml	10 mg pro ml
S2 Acesulfam K	1,00 g Acesulfam K + Wasser auf 100 ml	10 mg pro ml

100 ml Konzentrat

Zutat	A Mild	B Ausgewogen	C Frisch
Citronensäure, wasserfrei (E 330)	1,60 g	1,80 g	2,00 g
Natriumcitrat (E 331)	0,20 g	0,30 g	0,20 g
Ascorbinsäure (E 300)	0,20 g	0,20 g	0,20 g
S1 Sucralose-Lösung	9,0 ml	9,0 ml	10,0 ml
S2 Acesulfam-K-Lösung	10,0 ml	10,0 ml	10,0 ml
Aroma Pfirsich	22 Tropfen	20 Tropfen	18 Tropfen
Aroma Maracuja	12 Tropfen	14 Tropfen	18 Tropfen
Beta-Carotin (E 160a)	nach Farbe	nach Farbe	nach Farbe
Trinkwasser	auf 100 ml	auf 100 ml	auf 100 ml

So geht’s

Schritt	Arbeitsschritt
1	Ca. 40 ml Wasser in den Messbecher mit 100-ml-Marke geben.
2	Citronensäure, Natriumcitrat und Ascorbinsäure einwiegen und rühren, bis alles gelöst ist.
3	S1 und S2 mit einer Spritze oder Messpipette abmessen und zugeben.
4	Aroma Pfirsich, dann Aroma Maracuja zutropfen, dann Beta-Carotin nach Farbe.
5	Mit Wasser bis zur 100-ml-Marke auffüllen und umrühren. Becher mit A, B oder C beschriften.
6	0,25 g Kaliumsorbat in 900 ml kaltem Wasser lösen (nicht ins Konzentrat).
7	Konzentrat ins Wasser geben, auf 4 °C kühlen, pH messen (3,3 oder darunter), dann karbonisieren.

Karbonisieren

Kohlensäure	A Mild	B Ausgewogen	C Frisch
Ziel CO_2 im Getränk	5,0 g/l	5,25 g/l	5,5 g/l
Keg-Druck bei 4 °C	0,86 bar	0,95 bar	1,04 bar

Für die Verkostung alle drei Muster gleich lang und gleich kalt karbonisieren (Anleitung Keg, Methode A). Liegt der pH bei A über 3,3: Natriumcitrat weglassen.