ZYRO

REZEPTUR · VERTRAULICH

100 ml Konzentrat · 3 Versionen

Testansatz: 100 ml Konzentrat = 1 Liter Getränk · Stand 11.11.2026

Testansatz für ZYRO Peach × Maracuja in drei Versionen: **A Mild**, **B Ausgewogen** (V5b), **C Frisch & exotisch**. Je 100 ml Konzentrat ergeben mit 900 ml Wasser 1 Liter Getränk. Startwerte, noch nicht verkostet.

100 ml Konzentrat

Zutat	A Mild	B Ausgewogen	C Frisch
Citronensäure, wasserfrei (E 330)	1,60 g	1,80 g	2,00 g
Natriumcitrat (E 331)	0,20 g	0,30 g	0,20 g
Ascorbinsäure (E 300)	0,20 g	0,20 g	0,20 g
Sucralose (E 955)	0,09 g	0,09 g	0,10 g
Acesulfam K (E 950)	0,10 g	0,10 g	0,10 g
Aroma Pfirsich	22 Tropfen	20 Tropfen	18 Tropfen
Aroma Maracuja	12 Tropfen	14 Tropfen	18 Tropfen
Beta-Carotin (E 160a)	nach Farbe	nach Farbe	nach Farbe
Trinkwasser	auf 100 ml	auf 100 ml	auf 100 ml

Tipp zum Einwiegen der Süßstoffe: Kleines Stück Backpapier auf die Waage legen, tarieren, Pulver mit einer Messerspitze langsam aufstreuen. Die Waage zeigt nur 0,01 g genau – bei 0,09 g sind das ± 11 %. Für die Verkostung reicht das, wenn du alle Muster gleich sorgfältig wiegst. Für die endgültige Rezeptur besser 1 kg Konzentrat ansetzen (dann 0,90 g bzw. 1,00 g).

So geht’s

Schritt	Arbeitsschritt
1	Ca. 40 ml Wasser in den Messbecher mit 100-ml-Marke geben.
2	Citronensäure, Natriumcitrat und Ascorbinsäure einwiegen und rühren, bis alles gelöst ist.
3	Sucralose und Acesulfam K direkt einwiegen (siehe Tipp unten) und gut lösen.
4	Aroma Pfirsich, dann Aroma Maracuja zutropfen, dann Beta-Carotin nach Farbe.
5	Mit Wasser bis zur 100-ml-Marke auffüllen und umrühren. Becher mit A, B oder C beschriften.
6	0,25 g Kaliumsorbat in 900 ml kaltem Wasser lösen (nicht ins Konzentrat).
7	Konzentrat ins Wasser geben, auf 4 °C kühlen, pH messen (3,3 oder darunter), dann karbonisieren.

Karbonisieren

Kohlensäure	A Mild	B Ausgewogen	C Frisch
Ziel CO_2 im Getränk	5,0 g/l	5,25 g/l	5,5 g/l
Keg-Druck bei 4 °C	0,86 bar	0,95 bar	1,04 bar

Für die Verkostung alle drei Muster gleich lang und gleich kalt karbonisieren (Anleitung Keg, Methode A). Liegt der pH bei A über 3,3: Natriumcitrat weglassen.