ZYRO

REZEPTUR · VERTRAULICH

4 Konzentrate · Peach × Maracuja

K1 Mild · K2 Ausgewogen · K3 Maracuja-Kick · K4 Extra sauer · Stand 12.11.2026

Vier unterschiedliche Konzentrate von ZYRO Peach × Maracuja – alle mit deinen eigenen Aromen und Zutaten. Je 100 ml Konzentrat + 900 ml Wasser + 0,25 g Kaliumsorbat = 1 Liter Getränk. Startwerte, noch nicht verkostet.

K1
Mild

Wenig Säure, viel Pfirsich, weich. Für alle, denen Limo schnell zu sauer ist.

K2
Ausgewogen

Die Mitte aus Frucht, Säure und Süße. Entspricht Version B / V5b.

K3
Maracuja-Kick

Pfirsich und Maracuja gleich stark – exotischer, mehr Wow.

K4
Extra sauer

Mehr als doppelt so viel Säure wie K2, dazu mehr Süße als Ausgleich. Sauer-Kick wie bei sauren Süßigkeiten.

Konzentrate je 100 ml

Zutat (je 100 ml Konzentrat)	K1 Mild	K2 Ausgew.	K3 Maracuja	K4 Extra sauer
Citronensäure, wasserfrei (E 330)	1,60 g	1,80 g	1,80 g	4,00 g
Natriumcitrat (E 331)	0,20 g	0,30 g	0,30 g	0,20 g
Ascorbinsäure (E 300)	0,20 g	0,20 g	0,20 g	0,20 g
Sucralose (E 955)	0,09 g	0,09 g	0,09 g	0,10 g
Acesulfam K (E 950)	0,10 g	0,10 g	0,10 g	0,12 g
Aroma Pfirsich	22 Tropfen	20 Tropfen	18 Tropfen	22 Tropfen
Aroma Maracuja	12 Tropfen	14 Tropfen	18 Tropfen	18 Tropfen
Beta-Carotin (E 160a)	nach Farbe	nach Farbe	nach Farbe	nach Farbe
Trinkwasser	auf 100 ml	auf 100 ml	auf 100 ml	auf 100 ml

Für 1 kg Konzentrat (= 10 l Getränk) alle Grammwerte × 10 – dann lassen sich auch die Süßstoffe genau wiegen.

Profil im fertigen Getränk

Im fertigen Getränk (je 1 l)	K1 Mild	K2 Ausgew.	K3 Maracuja	K4 Extra sauer
Säure gesamt	1,6 g	1,8 g	1,8 g	4,0 g
Süße (im Vergleich zu K2)	gleich	100 %	gleich	ca. 115 %
Kohlensäure CO_2	5,0 g	5,25 g	5,25 g	5,5 g
Keg-Druck bei 4 °C	0,86 bar	0,95 bar	0,95 bar	1,04 bar

So geht’s

Schritt	Herstellung (für jedes Konzentrat gleich)
1	Ca. 40 ml Wasser in den Messbecher mit 100-ml-Marke geben.
2	Citronensäure, Natriumcitrat und Ascorbinsäure einwiegen, rühren bis klar.
3	Sucralose und Acesulfam K auf Backpapier einwiegen, zugeben, gut lösen.
4	Aroma Pfirsich, dann Aroma Maracuja zutropfen, dann Beta-Carotin nach Farbe.
5	Bis zur 100-ml-Marke auffüllen, umrühren, Becher mit K1–K4 beschriften.
6	Je 0,25 g Kaliumsorbat in 900 ml kaltem Wasser lösen, Konzentrat zugeben.
7	Auf 4 °C kühlen, pH messen (3,3 oder darunter), 24 h ruhen lassen, karbonisieren.

Verkostung

Blind verkosten (Becher nur mit 1–4 beschriften, Zuordnung separat notieren), alle bei 4 °C und gleich karbonisiert. Liegt der pH von K1 über 3,3: dort Natriumcitrat weglassen. K4 als Letztes probieren – die starke Säure überdeckt sonst die anderen.

Konzentrat	Gesamt (1–9)	Platz	Würde ich kaufen?	Notiz
K1 Mild			ja · vielleicht · nein	
K2 Ausgewogen			ja · vielleicht · nein	
K3 Maracuja-Kick			ja · vielleicht · nein	
K4 Extra sauer			ja · vielleicht · nein	