ZYRO

REZEPTUR · VERTRAULICH

Peach × Maracuja · Konzentrat V5

Konzentrat 1 + 9 · alle Mengen in Gramm · Stand 11.11.2026

Konzentrat für ZYRO Peach × Maracuja, Rezeptur V5 (modern und massentauglich). 100 g Konzentrat ergeben mit 900 g Wasser 1 Liter Getränk. Kaliumsorbat kommt nicht ins Konzentrat, sondern ins Verdünnungswasser – im sauren Konzentrat würde Sorbinsäure ausfallen. Alle Werte sind Startwerte für die Blindverkostung, noch nicht verkostet.

1 + 9
Konzentrat + Wasser
100 g → 1 l Getränk

100 kg
Konzentrat für
1.000 l Getränk

≤ 3,3
pH im fertigen Getränk
(Ziel 3,2)

5,0–5,5 g/l
CO_2 im Getränk

Konzentrat in Gramm

Zutat	E-Nr.	je 100 g (= 1 l)	je 1 kg (= 10 l)	je 100 kg (= 1.000 l)
Citronensäure, wasserfrei	E 330	1,40 g	14,0 g	1.400 g
Äpfelsäure	E 296	0,40 g	4,0 g	400 g
Natriumcitrat	E 331	0,30 g	3,0 g	300 g
Ascorbinsäure (Vitamin C)	E 300	0,20 g	2,0 g	200 g
Sucralose	E 955	0,09 g	0,90 g	90 g
Acesulfam K	E 950	0,10 g	1,00 g	100 g
Kochsalz	–	0,10 g	1,00 g	100 g
Aroma Pfirsich (flüssig) *	–	ca. 0,80 g	ca. 8,0 g	ca. 800 g
Aroma Maracuja (flüssig) *	–	ca. 0,56 g	ca. 5,6 g	ca. 560 g
Farbe: Beta-Carotin oder Karottenkonzentrat	E 160a / –	nach Farbe	nach Farbe	nach Farbe
Trinkwasser (auffüllen auf Gesamtgewicht)	–	ca. 96,0 g	ca. 960 g	ca. 96,0 kg
Konzentrat gesamt		**100,0 g**	**1.000 g**	**100,0 kg**

* Aromen bisher in Tropfen (Pfirsich 20, Maracuja 14 je Liter Getränk), umgerechnet mit der Annahme 1 Tropfen ≈ 0,04 g – ein Schätzwert. Vor der Freigabe 20 Tropfen jedes Aromas wiegen und die Werte ersetzen. Wasser = Rest bis zum Gesamtgewicht; die Farbmenge geht davon ab.

Verdünnung zum fertigen Getränk

Zutat	E-Nr.	je 1 l Getränk	je 10 l	je 1.000 l
Konzentrat V5		100 g	1,00 kg	100 kg
Trinkwasser	–	900 g	9,00 kg	900 kg
Kaliumsorbat (im Wasser lösen)	E 202	0,25 g	2,5 g	250 g
Kohlensäure	E 290	5,0–5,5 g	50–55 g	5,0–5,5 kg

Herstellung: 1 kg Konzentrat

Ab 1 kg Ansatzgröße alles direkt auf der 0,01-g-Waage einwiegen – Stammlösungen sind dann nicht nötig (0,90 g Sucralose ± 0,01 g = ± 1 %).

Schritt	Arbeitsschritt	Menge
1	Wasser in das tarierte Gefäß	ca. 600 g
2	Citronensäure, Äpfelsäure, Natriumcitrat einwiegen, rühren bis klar	14,0 / 4,0 / 3,0 g
3	Ascorbinsäure einwiegen und lösen	2,0 g
4	Sucralose, Acesulfam K, Kochsalz einwiegen und lösen	0,90 / 1,00 / 1,00 g
5	Aroma Pfirsich, dann Aroma Maracuja zugeben	ca. 8,0 / ca. 5,6 g
6	Farbe zugeben, Menge notieren	nach Farbe
7	Mit Wasser auffüllen, gut durchmischen	auf 1.000 g gesamt
8	In saubere, verschließbare Flasche abfüllen, kühl lagern (4–8 °C)	–
9	Für 10 l Getränk: 2,5 g Kaliumsorbat in 9,00 kg Wasser lösen, Konzentrat zugeben	1,00 kg + 9,00 kg
10	Auf 4 °C kühlen, pH messen, karbonisieren	CO_2 5,0–5,5 g/l

Hinweise

pH-Wert: Im fertigen Getränk messen, nicht im Konzentrat. Muss bei 3,3 oder darunter liegen, sonst wirkt Kaliumsorbat schlechter. Liegt er darüber: Natriumcitrat auf 2,0 g/kg Konzentrat senken, danach Citronensäure in 1,0-g/kg-Schritten erhöhen.

Haltbarkeit Konzentrat: Das Konzentrat enthält kein Konservierungsmittel. Kühl lagern und zügig verarbeiten; Lagerdauer erst nach Prüfung im Labor festlegen.

Etikett: Äpfelsäure in die Zutatenliste („Säuerungsmittel Citronensäure, Äpfelsäure“), Nährwert „Salz“ neu berechnen lassen.

Lohnabfüller: Für The Stillery gilt die Spalte „je 100 kg“ (= 1.000 l Getränk). Vorher die Aromen gewogen eintragen. CO_2 5,0–5,5 g/l weicht vom bisherigen Ziel 5,5–6,0 g/l ab.