ZYRO

REZEPTUR · VERTRAULICH

Peach × Maracuja · Rezeptur V5

Modern und massentauglich · alle Mengen in Gramm · Stand 11.11.2026

V5 macht ZYRO modern und massentauglich: mehr Frucht mit Maracuja-Kick, mildere Säure, weichere Kohlensäure und weniger Süßstoff-Nachgeschmack – ein Geschmack, den möglichst jeder kauft. Grundlage ist Rezeptur V4. Alle Werte sind Startwerte für die Blindverkostung, noch nicht verkostet.

1,8 g/l
Säure gesamt
(V4: 2,0 g/l)

5,0–5,5 g/l
CO_2, weicher
(V4: 5,5–6,0 g/l)

≤ 3,3
pH-Wert
(Ziel 3,2)

4 °C
Abfülltemperatur

Mengen in Gramm

1 Liter Getränk = 100 g Konzentrat + 900 g Wasser (Verdünnung 1 + 9). Die Spalte „1.000 l“ ist für die Lohnabfüllung.

Zutat	E-Nr.	V4 je 1 l	V5 je 1 l	V5 je 1.000 l
Trinkwasser	–	auffüllen	auffüllen	auffüllen
Citronensäure, wasserfrei	E 330	2,00 g	1,40 g	1.400 g
Äpfelsäure (neu)	E 296	–	0,40 g	400 g
Natriumcitrat	E 331	0,20 g	0,30 g	300 g
Ascorbinsäure (Vitamin C)	E 300	0,20 g	0,20 g	200 g
Kaliumsorbat	E 202	0,25 g	0,25 g	250 g
Sucralose	E 955	0,10 g	0,09 g	90 g
Acesulfam K	E 950	0,12 g	0,10 g	100 g
Kochsalz (neu)	–	–	0,10 g	100 g
Aroma Pfirsich (flüssig) *	–	ca. 0,80 g	ca. 0,80 g	ca. 800 g
Aroma Maracuja (flüssig) *	–	ca. 0,40 g	ca. 0,56 g	ca. 560 g
Farbe: Beta-Carotin oder Karottenkonzentrat	E 160a / –	nach Farbe	nach Farbe	nach Farbe
Kohlensäure	E 290	5,5–6,0 g	5,0–5,5 g	5,0–5,5 kg

* Aromen bisher in Tropfen (Pfirsich 20, Maracuja 14). Umgerechnet mit der Annahme 1 Tropfen ≈ 0,04 g – das ist ein Schätzwert. Vor der Freigabe einmal 20 Tropfen jedes Aromas auf der Feinwaage wiegen und die Gramm-Werte eintragen. Farbe: Menge beim ersten Ansatz wiegen und eintragen.

Was sich ändert – und warum

Stellschraube	V5	Wirkung
Frucht	Pfirsich gleich, Maracuja +40 %	Pfirsich mag fast jeder; Maracuja bringt den modernen, exotischen Kick
Säure	1,4 g Citronen- + 0,4 g Äpfelsäure	Frisch statt spitz – auch für Leute, denen Limo schnell zu sauer ist
Puffer	Natriumcitrat 0,30 g	Säure bleibt spürbar, sticht aber weniger
Süße	Sucralose 0,09 g, Acesulfam K 0,10 g	Weniger Nachgeschmack; durch mildere Säure gleich süß
Salz	0,10 g Kochsalz	Hebt die Frucht, deckt Süßstoff-Nachgeschmack – schmeckt nicht salzig
Kohlensäure	5,0–5,5 g/l	Spritzig, aber nicht kratzig; die Frucht kommt stärker durch
Zutatenliste (optional)	Karottenkonzentrat statt E 160a	„Ohne Farbstoffe“ und „mit Vitamin C“ auslobbar

Herstellung: 100 g Konzentrat für 1 Liter

Mengen unter 0,2 g sind mit einer 0,01-g-Waage zu ungenau. Süßstoffe und Salz deshalb als Stammlösungen ansetzen (je 1,00 g Pulver + Wasser auf 100,0 g = 10 mg pro Gramm Lösung), kühl lagern, innerhalb einer Woche verbrauchen.

Stammlösung	Ansatz	Einwaage je 100 g Konzentrat
S1 Sucralose	1,00 g + Wasser auf 100,0 g	9,0 g (= 0,09 g Sucralose)
S2 Acesulfam K	1,00 g + Wasser auf 100,0 g	10,0 g (= 0,10 g Acesulfam K)
S3 Kochsalz	1,00 g + Wasser auf 100,0 g	10,0 g (= 0,10 g Kochsalz)

Schritt	Arbeitsschritt	Menge
1	Wasser in das tarierte Gefäß	ca. 40 g
2	Citronensäure einwiegen und lösen	1,40 g
3	Äpfelsäure einwiegen und lösen	0,40 g
4	Natriumcitrat einwiegen und lösen	0,30 g
5	Ascorbinsäure einwiegen und lösen	0,20 g
6	Stammlösungen S1 / S2 / S3 zugeben	9,0 g / 10,0 g / 10,0 g
7	Aroma Pfirsich, dann Aroma Maracuja zugeben	ca. 0,80 g / ca. 0,56 g
8	Farbe zugeben	nach Farbe
9	Mit Wasser auffüllen	auf 100,0 g gesamt
10	Kaliumsorbat separat im Verdünnungswasser lösen (nicht ins saure Konzentrat)	0,25 g in 900 g

Schritt	Arbeitsschritt	Menge
11	Konzentrat + Verdünnungswasser mischen, auf 4 °C kühlen, karbonisieren	CO_2 5,0–5,5 g/l

Blindverkostung

Je Muster 1 Liter ansetzen, blind mit M1–M4 beschriften, 8–12 Tester mit dem Geschmacksprotokoll.

Muster	Inhalt	Was es zeigt
M1	V4 unverändert	Vergleichswert
M2	V5 komplett	Wirkt das Gesamtpaket?
M3	V5, aber 2,00 g Citronensäure, keine Äpfelsäure	Bringt die Äpfelsäure etwas?
M4	V5 mit Aroma Maracuja ca. 0,72 g	Darf es noch mehr Maracuja sein?

Entscheidung: Eine Variante ersetzt V4, wenn sie im Schnitt mindestens 7 von 9 beim Gesamteindruck erreicht, besser als M1 abschneidet und mindestens 7 von 10 Testern „ganze Dose austrinken: ja“ ankreuzen.

Hinweise

pH-Wert prüfen: Mit weniger Säure steigt der pH – der wichtigste Messwert dieser Version. Er muss bei 3,3 oder darunter bleiben, sonst wirkt Kaliumsorbat schlechter. Liegt er darüber: zuerst Natriumcitrat zurück auf 0,20 g, danach Citronensäure in 0,10-g-Schritten erhöhen.

Etikett: Äpfelsäure kommt in die Zutatenliste („Säuerungsmittel Citronensäure, Äpfelsäure“). Nährwert „Salz“ neu berechnen lassen.

Höchstmengen: Süßstoffe und Kaliumsorbat werden nur gesenkt oder gleich gelassen. Trotzdem im Laborauftrag mit prüfen lassen.

Lohnabfüller: Nach der Entscheidung die gewogenen Gramm-Werte (auch Aromen) an The Stillery geben. Der weichere CO_2-Wert weicht vom bisherigen Ziel 5,5–6,0 g/l ab.