Rezeptur V5 – ZYRO Peach × Maracuja (Geschmack)

Nov 11, 2026 · @max

Ausgangslage

V5 setzt bei der Rezeptur V4 aus dem Rezeptur-Tool an und macht ZYRO modern und massentauglich: mehr Frucht mit Maracuja-Kick, mildere Säure, weichere Kohlensäure und weniger Süßstoff-Nachgeschmack – ein Geschmack, den möglichst jeder kauft. Ziel bleibt: ein Erfrischungsgetränk, bei dem man denkt „das trink ich nochmal".

V4 pro Liter Getränk: Citronensäure 2,0 g, Natriumcitrat 0,2 g, Ascorbinsäure 0,2 g, Kaliumsorbat 0,25 g, Sucralose 0,10 g, Acesulfam K 0,12 g, Aroma Pfirsich 20 Tropfen, Aroma Maracuja 10 Tropfen, Beta-Carotin nach Farbe, CO_2 5,5–6,0 g/l.

Das Geschmacksprotokoll ist noch nicht ausgefüllt. Die Änderungen unten sind deshalb begründete Startwerte, keine gemessenen Ergebnisse – die Blindverkostung (weiter unten) entscheidet.

Die Stellschrauben: modern und für jeden

1. **Fruchtig für alle, mit Maracuja-Kick.** Pfirsich ist die Frucht, die fast jeder mag – sie bleibt die Basis (20 Tropfen). Maracuja kommt deutlich nach vorne (14 statt 10 Tropfen) und macht den modernen, exotischen Wow-Effekt, ohne zu polarisieren.
2. **Mildere, rundere Säure.** Gesamt-Säure von 2,0 auf 1,8 g/l: 1,4 g Citronensäure + 0,4 g Äpfelsäure (E 296). Äpfelsäure wirkt länger und „saftiger", Citronensäure kurz und spitz – frisch, aber nicht sauer. Damit trinken es auch Leute, denen Limo schnell zu sauer ist.
3. **Säurespitze abpuffern.** Natriumcitrat von 0,2 auf 0,3 g.
4. **Weniger Süßstoff-Nachgeschmack.** Sucralose 0,10 → 0,09 g, Acesulfam K 0,12 → 0,10 g. Durch die mildere Säure schmeckt es trotzdem gleich süß.
5. **Eine Prise Salz (0,10 g/l Kochsalz).** Hebt die Frucht und überdeckt Süßstoff-Nachgeschmack; schmeckt bei dieser Menge nicht salzig.
6. **Weichere Kohlensäure.** 5,0–5,5 statt 5,5–6,0 g/l: spritzig, aber nicht kratzig – lässt die Frucht stärker durch.
7. **Moderne, saubere Zutatenliste (optional).** Farbe aus Karotten- oder Kürbiskonzentrat statt Beta-Carotin (E 160a) – dann darf „ohne Farbstoffe" aufs Etikett. Ascorbinsäure als „Vitamin C" ausloben. Braucht einen neuen Lieferanten für die Farbe.

Unverändert bleiben Ascorbinsäure und Kaliumsorbat. Leitlinie: frisch und fruchtig statt extrem – nichts darf so stark sein, dass es jemanden abschreckt.

Rezeptur V5 pro Liter Getränk

Alle Mengen pro 1 Liter fertiges Getränk = 100 ml Konzentrat (Verdünnung 1 + 9).

Zutat	E-Nr.	V4	V5	Änderung
Trinkwasser	–	auffüllen	auffüllen	–
Citronensäure, wasserfrei	E 330	2,0 g	1,4 g	− 0,6 g
Äpfelsäure	E 296	–	0,4 g	neu
Natriumcitrat	E 331	0,2 g	0,3 g	+ 0,1 g
Ascorbinsäure (Vitamin C)	E 300	0,2 g	0,2 g	gleich
Kaliumsorbat	E 202	0,25 g	0,25 g	gleich
Sucralose	E 955	0,10 g	0,09 g	− 0,01 g
Acesulfam K	E 950	0,12 g	0,10 g	− 0,02 g
Kochsalz	–	–	0,10 g	neu
Aroma Pfirsich (flüssig)	–	20 Tropfen	20 Tropfen	gleich
Aroma Maracuja (flüssig)	–	10 Tropfen	14 Tropfen	+ 4
Farbe	E 160a / –	Beta-Carotin	Beta-Carotin oder Karottenkonzentrat	optional
Kohlensäure	E 290	5,5–6,0 g/l	5,0–5,5 g/l	weicher

Zielwerte: pH 3,0–3,3 (Ziel 3,2), CO_2 5,25 g/l, 4 °C beim Abfüllen. Äpfelsäure gibt es z. B. bei Dr. Lohmann Diaclean, deinem Lieferanten für die übrigen Säuren – Verfügbarkeit dort anfragen.

Herstellung des 100-ml-Konzentrats

Mengen unter 0,2 g sind mit einer 0,01-g-Waage zu ungenau (0,09 g ± 0,01 g = ± 11 %). Deshalb Süßstoffe und Salz als Stammlösungen ansetzen – einmal anmischen, für viele Ansätze nutzen, kühl lagern und innerhalb einer Woche verbrauchen.

Stammlösung	Ansatz	Gehalt	Menge pro 100 ml Konzentrat
S1 Sucralose	1,00 g auf 100 ml Wasser	10 mg/ml	9,0 ml
S2 Acesulfam K	1,00 g auf 100 ml Wasser	10 mg/ml	10,0 ml
S3 Kochsalz	1,00 g auf 100 ml Wasser	10 mg/ml	10,0 ml

1. Ca. 40 ml Wasser in den Messbecher geben.
2. Citronensäure 1,40 g, Äpfelsäure 0,40 g, Natriumcitrat 0,30 g und Ascorbinsäure 0,20 g einwiegen und vollständig lösen.
3. S1 9,0 ml, S2 10,0 ml und S3 10,0 ml zugeben.
4. Aroma Pfirsich 20 Tropfen und Aroma Maracuja 14 Tropfen zugeben, dann Beta-Carotin wie bei V4.
5. Mit Wasser auf 100 ml auffüllen und umrühren.
6. Kaliumsorbat 0,25 g separat in den 900 ml Verdünnungswasser lösen (wie in V4 – nicht ins saure Konzentrat).
7. Konzentrat und Verdünnungswasser mischen, auf 4 °C kühlen, auf 5,0–5,5 g/l CO_2 karbonisieren.

Wichtig für später: Tropfen sind für die Lohnabfüllung zu ungenau. Einmal 20 Tropfen jedes Aromas wiegen und in Gramm pro Liter umrechnen.

Blindverkostung

Vier Muster nebeneinander, so sieht man, welche Änderung wirklich wirkt. Jedes Muster als 1 Liter ansetzen, blind mit M1–M4 beschriften und mit dem Geschmacksprotokoll bewerten lassen (8–12 Tester).

Muster	Inhalt	Was es zeigt
M1	V4 unverändert	Vergleichswert
M2	V5 komplett	Wirkt das Gesamtpaket?
M3	V5, aber 2,0 g Citronensäure und keine Äpfelsäure	Bringt die Äpfelsäure etwas?

Muster	Inhalt	Was es zeigt
M4	V5 mit Maracuja 18 Tropfen	Darf es noch mehr Maracuja sein?

V5 (oder M3/M4) ersetzt V4, wenn es im Schnitt mindestens 7 von 9 beim Gesamteindruck bekommt, besser als M1 abschneidet und mindestens 7 von 10 Testern „ganze Dose austrinken: ja“ ankreuzen.

Hinweise

- **pH prüfen:** Mit weniger Säure (1,8 statt 2,0 g/l) und mehr Natriumcitrat steigt der pH – das ist der wichtigste Messwert dieser Version. Er muss bei 3,3 oder darunter bleiben, sonst wirkt Kaliumsorbat schlechter. Liegt er darüber, zuerst Natriumcitrat zurück auf 0,2 g, danach Citronensäure in 0,1-g-Schritten erhöhen.
- **Etikett:** Äpfelsäure kommt neu in die Zutatenliste („Säuerungsmittel Citronensäure, Äpfelsäure“). Das Salz ändert den Nährwert „Salz“ nur minimal, trotzdem neu berechnen lassen.
- **Höchstmengen:** Süßstoffe und Kaliumsorbat werden nicht erhöht, nur gesenkt bzw. gleich gelassen. Die Werte trotzdem im Laborauftrag mit prüfen lassen.
- **Lohnabfüller:** Nach der Entscheidung die Mengen in Gramm pro Liter (auch die Aromen) an The Stillery geben.